

MTS

WC
140
P228
1995b

Québec 

INSPO - Montréal



3 5567 00003 1689

Institut national de santé publique du Québec
4835, avenue Christophe-Colomb, bureau 200
Montréal (Québec) H2J 3G8
Tél.: (514) 597-0606

**ANALYSE DES CAS DE GONORRÉE, DE CHLAMYDIOSE,
D'INFECTION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE B ET DE SYPHILIS
DÉCLARÉS AU QUÉBEC PAR ANNÉE CIVILE**

1990-1993

MTS

Ce rapport s'inscrit dans le programme de surveillance des MTS du Centre québécois de coordination sur le sida. Il a été réalisé grâce à la collaboration des médecins traitants, des responsables des MTS dans les unités de santé publique et du Laboratoire de santé publique du Québec.

Auteurs:

Raymond Parent

- Centre de santé publique de Québec
- Centre de recherche, Hôpital du Saint-Sacrement de Québec

Michel Alary

- Centre de santé publique de Québec
- Centre de recherche, Hôpital du Saint-Sacrement de Québec
- Groupe de recherche en épidémiologie de l'Université Laval

AVRIL 1995



Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Centre de coordination sur le sida

Table des matières

	Pages
1. Remerciements	3
2. Liste des tableaux et figures	4
3. Notes techniques	10
4. Introduction et cadre d'analyse utilisé	11
5. Analyse générale	12
6. Les chlamydioses	14
7. Les gonorrhées	14
8. Les hépatites B	14
9. Les syphilis	15
10. Conclusion	17
11. Tableaux et graphiques	19
12. Annexe: Cadre d'analyse et de production utilisé	149

1. Remerciements

Nous aimerions remercier:

Le personnel de santé publique oeuvrant en maladies infectieuses sans qui le système MADO ne serait qu'une bonne idée.

M. Florian Gosselin qui nous a conseillé et qui s'est chargé de nous extraire et de nous transmettre les données brutes.

Mme Myrto Mondor, biostatisticienne au centre de recherche de l'hôpital du Saint-Sacrement pour toute l'aide apportée lors de la programmation des analyses. C'est à elle que revient le mérite de l'importation directe SAS/Excel.

Toutes les personnes qui nous ont gracieusement prodigué des conseils afin de faire parler les données.

Le Centre québécois de coordination sur le Sida pour son support financier et humain (Mme Sylvie Venne en particulier).

2. Liste des tableaux et figures

-Nombre total et pourcentage de cas déclarés par maladie et année d'épisode, Québec (1990-1993)	13
-Nombre total de cas déclarés d'infection syphilitique "ancienne" devenue symptomatique par type de syphilis et sexe, Québec (1990-1993)	16
-Nombre total de cas déclarés d'infection syphilitique "récente" et ancienne asymptomatique par type de syphilis et sexe, Québec (1990-1993)	16
-Mesures des tendances centrales de l'âge des cas déclarés en 1993, par sexe et type de maladie, Québec	19

Chlamydirose

-Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose par sexe et année d'épisode, Québec (1990-1993)	
. Province de Québec	20
. Chacune des régions	21
-Nombre de cas déclarés de chlamydirose par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)	38
-Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydirose par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)	39
-Nombre et taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydirose par ancien territoire de DSC montréalais, année d'épisode et sexe (1990-1993)	40
-Nombre de cas déclarés de chlamydirose par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)	41
-suite	
Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydirose par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)	43
-suite	
-Nombre de cas déclarés de chlamydirose chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)	45
-suite	

-Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydiose chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) 47
-suite

-Nombre de cas déclarés de chlamydiose chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) 49
-suite

-Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydiose chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) 51
-suite

-Taux d'incidence moyen des cas déclarés de chlamydiose par groupe d'âge, Québec (1990-1993) 53

-Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de chlamydiose, Québec (1990-1993) 53

-Taux d'incidence moyen des cas déclarés de chlamydiose chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1990-1993) 54

-Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de chlamydiose chez les femmes, Québec (1990-1993) 54

-Taux d'incidence moyen des cas déclarés de chlamydiose chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1990-1993) 55

-Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de chlamydiose chez les hommes, Québec (1990-1993) 55

Gonorrhée

-Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe et année d'épisode (1990-1993)
. Province de Québec 56
. Chacune des régions 57

-Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993) 74

-Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993) 75

	...6
-Nombre et taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par ancien territoire de DSC montréalais, année d'épisode et sexe (1990-1993)	76
-Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)	77
-suite	
-Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)	79
-suite	
-Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)	81
-suite	
-Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)	83
-suite	
-Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)	85
-suite	
-Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)	87
-suite	
-Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée par groupe d'âge, Québec (1990-1993)	89
-Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée, Québec (1990-1993)	89
-Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1990-1993)	90
-Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes, Québec (1990-1993)	90
-Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1990-1993)	91
-Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes, Québec (1990-1993)	91

-Nombre et pourcentage de cas déclarés de gonorrhée causée par un *Neisseria gonorrhoeae* producteur de pénicillinase (NGPP) par région, année d'épisode et sexe, Québec (1991-1993) 92

Hépatite B aiguë

-Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe et année d'épisode (1990-1993)

. Province de Québec 93
 . Chacune des régions 94

-Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993) 111

-Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993) 112

-Nombre et taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par ancien territoire de DSC montréalais, année d'épisode et sexe (1990-1993) 113

-Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) 114
 -suite

-Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) 116
 -suite

-Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) 118
 -suite

-Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) 120
 -suite

-Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) 122
 -suite

-Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) 124
 -suite

	...8
-Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë par groupe d'âge, Québec (1990-1993)	126
-Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë, Québec (1990-1993)	126
-Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1990-1993)	127
-Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes, Québec (1990-1993)	127
-Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1990-1993)	128
-Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes, Québec (1990-1993)	128
Hépatite B chronique	
-Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)	129
-Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par ancien territoire de DSC montréalais, année d'épisode et sexe (1990-1993)	130
-Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)	131
-suite	
-Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)	133
-suite	
-Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)	135
-suite	
Hépatite B de type non-précisé	
-Nombre de cas déclarés d'hépatite B de type non-précisé par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)	137

-Nombre de cas déclarés d'hépatite B de type non-précisé par ancien territoire de DSC montréalais, année d'épisode et sexe (1990-1993)	138
--	-----

Syphilis récente

-Taux d'incidence des cas déclarés de syphilis récente par sexe et année d'épisode (1990-1993)	
. Province de Québec	139
. Les régions suivantes:	
Québec, Montréal-centre, Montérégie	140
-Nombre de cas déclarés de syphilis récente par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)	143
-Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)	144
-Nombre et taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par ancien territoire de DSC montréalais, année d'épisode et sexe (1990-1993)	145
-Nombre et taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par sexe, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)	146
Syphilis ancienne	
-Nombre de cas déclarés de syphilis ancienne par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)	147
-Nombre de cas déclarés de syphilis ancienne par ancien territoire de DSC montréalais, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)	148

3. Notes techniques

- NT1: Tel que déjà expliqué dans le rapport précédent¹, les quatre CLSC qu'on retrouve dans la région Nord du Québec déclaraient leur cas, jusqu'en 1994, en Abitibi et au Lac St-Jean. Ce seul ajustement géographique qui restait à faire sur les banques MADO a été fait récemment. Le prochain rapport contiendra donc les données de la région 10 nouvellement définie dans le système de déclaration ainsi que les données rétrospectives de cette région. Ces données seront obtenues sur la base des territoires des CLSC et des anciens DSC.
- NT2: Plusieurs histogrammes n'ont pas été tracés. En effet, seules les régions de Québec, de Montréal et de la Montérégie ont le nombre minimal de cas de syphilis pour qu'il soit possible de produire un histogramme.
- NT3: Il n'est pas pertinent de calculer des taux d'incidence pour les hépatites B chroniques ou pour les syphilis anciennes. On parlerait ici d'incidence de détection et non pas d'incidence de transmission de maladie. A la base, on parle toutefois ici d'incidence de déclaration. Dans le cas des autres infections dont nous traitons ici, l'incidence de déclaration pourrait, sous certaines conditions, être le reflet des tendances de transmission.
- NT4: Tous les tableaux préparés contiennent aussi les cas pour lesquels la variable d'intérêt n'a pas été catégorisée. Ces cas sont ventilés dans la colonne "Manquant" (âge ou sexe). De plus, dans le but de faciliter les comparaisons, des taux ont été générés à partir de ces cas. Le dénominateur est toujours ici la population de référence à laquelle peut s'appliquer le numérateur observé. Un exemple: Dans la région de Montréal-centre, 18 cas de chlamydie ont été déclarés en 1990 sans que le sexe du patient ne soit précisé dans les informations disponibles. Ces 18 cas, rapportés sur l'ensemble de la population montréalaise, résultent en un taux de 1,0 par 100 000. Ce taux en soi n'indique pas grand chose. Il est quand même intéressant de remarquer qu'il a constamment baissé et est, en 1993 de 0,1 par 100 000. L'évolution de l'exhaustivité des données transmises lors de la déclaration de cas peut ainsi être évaluée depuis l'implantation du système.
- NT5: Afin de détecter les erreurs commises dans le rapport précédent, nous avons confronté celui-ci aux résultats présentés ici. Les incohérences détectées, somme toute peu nombreuses, sont presque toutes attribuables aux 10 cas de MTS déclarés entre 1990 et 1992 chez des non-résidents du Québec, cas que nous n'avions erronément pas exclus de l'analyse précédente (3 chlamydioses par année et une gonorrhée en 1991). Les autres erreurs sont des fautes de frappe et sont signalées par des notes de bas de page dans le texte qui suit.

¹: Nous avons déjà procédé à l'analyse rétrospective des cas déclarés entre 1990 et 1992. Les résultats de cette analyse sont disponibles au QCS (514-873-9890).

4. Introduction et cadre d'analyse utilisé

Le Québec est doté d'un système informatique centralisé quant à l'enregistrement des cas de maladies dont la déclaration est légalement obligatoire. Chaque région socio-sanitaire de la province est électroniquement reliée par le biais de sa Direction de Santé Publique à l'ordinateur central situé au Laboratoire de Santé Publique du Québec (LSPQ) à Sainte-Anne de Bellevue. Le système, étendu à tout le territoire québécois en 1990, est conçu de manière à générer une banque de données renfermant toutes les informations non-nominales contenues dans les banques MADO.

Le Centre Québécois de Coordination sur le Sida (CQCS) nous a confié le mandat de décrire l'évolution de la situation épidémiologique de certaines maladies transmissibles sexuellement (MTS) déclarées dans ce système. L'analyse qui suit est annuelle et est complétée d'une analyse intérimaire plus brève préparée à tous les six mois et dont le premier exemplaire (cas déclarés entre le 1^{er} janvier et le 30 juin 1994) est disponible sur demande (514 873-9890).

Nous ne traiterons ici que des cas déclarés entre le 1^{er} janvier 1990 et le 31 décembre 1993. Les variables d'intérêt que nous retenons dans l'analyse spécifique à chaque maladie sont les mêmes qu'au rapport précédent: celles d'âge, de sexe et de lieu de résidence. Les analyses effectuées présentent les résultats pour l'ensemble de la province ainsi que par région socio-sanitaire. Nous avons aussi ventilé par territoire des anciens DSC les cas déclarés dans la région de Montréal. Cette ventilation sera toutefois abandonnée dans les rapports à venir. Certaines variables particulières à chaque maladie sont encore ici considérées (p.e. type d'infection syphilitique, résistance aux antibiotiques des *Neisseria gonorrhoeae*).

A la suite de données générales décrivant les caractéristiques d'ensemble de tous les cas déclarés, le rapport se subdivise en quatre sections distinctes: L'analyse des cas déclarés de chlamydie, de gonorrhée, d'hépatite B et de syphilis. Une discussion suit.

Les données de population utilisées aux dénominateurs sont celles du recensement de 1991 (Recensement Canada, fichier J-36) telles que validées par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux et obtenues du projet SISC (Système d'Information en Santé Communautaire) du Centre de santé publique de Québec.

Les outils informatiques préparés dans le cadre d'analyse utilisé ici sont détaillés en annexe.

5. Analyse générale

L'interprétation des données doit tenir compte des notes techniques qui font partie intégrale du rapport ainsi que des mises en garde qui suivent. Ces mises en garde sont les mêmes que celles faites au premier rapport; tant qu'elles demeureront pertinentes, elles feront l'objet d'une section des rapports à venir. Les répétitions que cela implique nous semblent justifiées. Ces mises en garde doivent être présentes à l'esprit avant d'interpréter les données du rapport.

- i. Le système MADO permet un raffinement continu de l'information générée. Cela fait en sorte que la validité et la définition même des informations disponibles grâce à ce système sont également dynamiques. On peut par exemple penser que les utilisateurs du système de déclaration ont acquis de l'expérience au fil des mois. Il est donc possible que certaines pratiques de saisie aient changé, ce qui aurait un impact sur les tendances observées.
- ii. En plus des variations observées dans le temps il peut aussi y avoir d'importantes variations d'un lieu géographique à l'autre. Les réalités différentes des régions peuvent invalider une partie des comparaisons qu'on voudrait faire. Il est par exemple important de savoir qu'un territoire de déclaration est en pleine campagne de sensibilisation de la population envers une maladie avant de conclure qu'on y observe une hausse d'incidence. Toute interprétation géographique fine des données devrait donc reposer sur une connaissance minimale du contexte dont elles proviennent. La collaboration des individus de chacun des territoires concernés devient alors essentielle.
- iii. La gonorrhée ainsi que la syphilis sont déclarées anonymement au Québec ce qui rend difficile la détection des cas ayant fait l'objet de plus d'une déclaration. Pour les gonorrhées, le personnel du LSPQ fait toutefois certaines vérifications quant aux "doublons démographiques". On est en effet en mesure de vérifier la possibilité de doublons puisque tous les laboratoires du Québec doivent transmettre régulièrement au LSPQ le nombre de souches isolées. Si le nombre de cas enregistrés dans la banque MADO et dont la validation est de type laboratoire est supérieur aux nombres de souches rapportées par les laboratoires, le LSPQ contacte le responsable local de la région d'origine des "doublons potentiels" (même âge, sexe, région de résidence et période de déclaration) afin que celui-ci vérifie si les déclarations correspondent à un seul et même cas. Ce type de vérification n'est pas fait dans les cas d'infections syphilitiques. Les cas de doublons pour les chlamydioses et les infections par le virus de l'hépatite B sont plus facilement identifiables puisque les déclarations sont habituellement faites de façon nominale.

Un total de 64 633 cas des MTS analysées dans ce rapport ont été déclarés de 1990 à 1993. Dans l'ensemble, l'âge des individus était précisé pour 62 071 de ces cas (96,0 %) tandis que le sexe l'était pour 64 364 (99,6 %). L'âge était connu pour 21 078 des 21 928 cas déclarés chez des hommes (96,1 %) et 40 873 des 42 436 cas déclarés chez des femmes (96,3 %). Il était inconnu pour 149 (55,4 %) des 269 individus dont le sexe était manquant. Chez les femmes, l'âge moyen était de 23,3 ans (médiane à 21 ans), tandis que la valeur correspondante chez les hommes était de 29,7 ans (médiane à 27 ans).

L'âge moyen et l'âge médian correspondant sont présentés, par sexe et type de maladie, au début de la section des tableaux et graphiques. Comme à l'analyse précédente, on y constate que pour toutes les maladies, sauf les syphilis anciennes, les cas déclarés touchent des femmes dont l'âge moyen est toujours significativement inférieur de quelques années à celui des hommes. Le phénomène inverse est observé pour les syphilis anciennes. Dans ce dernier cas, il faut toutefois tenir compte des réserves émises dans la section qui présente les résultats de l'analyse des syphilis. Nous avons également testé si les médianes d'âge des cas déclarés chez les hommes étaient significativement différentes de celles des cas déclarés chez les femmes. En effet, la médiane et non la moyenne est ici la mesure de tendance centrale à retenir étant donné la très large étendue dans laquelle sont contenues les données. L'étendue du 1^{er} au 99^e percentile est probablement ici beaucoup plus fiable que l'étendue totale qui contient des enregistrements dont la validité peut être mise en doute (tel qu'un cas de chlamydie déclaré chez un individu de 95 ans). Les tests de médiane effectués vont tous dans le même sens que les tests de Student faits sur les moyennes d'âge.

Le tableau qui suit donne la répartition des cas par sexe et maladie. On y constate la proportion importante des infections causées par *Chlamydia trachomatis*.

Nombre total et pourcentage de cas déclarés par maladie et année d'épisode, Québec (1990-1993)

	Nombre de cas (pourcentage)				Total
	Chlamydia	Gonorrhée	Hépatite B	Syphilis	
1990	15 437 (78,5)	1 889 (9,6)	2 134 (10,9)	203 (1,0)	19 663 (100,0)
1991	13 345 (78,6)	1 387 (8,2)	2 061 (12,1)	194 (1,1)	16 987 (100,0)
1992	11 697 (77,6)	971 (6,4)	2 227 (14,8)	186 (1,2)	15 081 (100,0)
1993	9 996 (77,5)	755 (5,9)	2 034 (15,8)	117 (1,0)	12 902 (100,0)
Total	50 475 (78,1)	5002 (7,7)	8 456 (13,1)	700 (1,1)	64 633 (100,0)

Les autres MTS à déclaration obligatoire sont très rares au Québec. En effet, entre 1990 et 1993, seulement 5 cas (3 masculins et 2 féminins) de lymphogranulomatose vénérienne ont été rapportés dont 3 en 1990 (2 en Montérégie et 1 dans le Bas St-Laurent), 1 en 1991 (dans la région de Montréal) et 1 en 1992 (au Saguenay/Lac St-Jean). Aucun cas n'a été rapporté en 1993. Pendant ces mêmes années, un seul cas (masculin) de chancre mou a été déclaré (dans la région de Laval, en 1992). Aucun cas de granulome inguinal n'a été rapporté.

6. Les chlamydioses

Parmi les chlamydioses déclarées, 50 329 ont été rapportées comme étant génitales (118 infections oculaires et 28 infections pulmonaires s'y ajoutent). Le trois quart des épisodes touche des femmes (74,1 %). On remarque également que depuis 1990, 96,3 % des diagnostics ont été validés par des tests de laboratoire. Les tableaux et graphiques des pages 20 à 55 décrivent la distribution des cas déclarés de chlamydirose.

7. Les gonorrhées

Parmi les 5 002 gonorrhées rapportées, 13 (0,3 %) ont été déclarées comme affectant le système oculaire tandis que 387 (7,7 %) concernaient un site autre que celui du système génito-urinaire. Les pages 56 à 92 présentent la distribution des gonorrhées déclarées.

Par ailleurs, dans le cadre de son programme de surveillance des *Neisseria gonorrhoeae* producteurs de pénicillinase (NGPP) mis en place en 1987, le personnel du LSPQ a commencé, en 1991, à vérifier la concordance entre les souches de NGPP reçues à leur laboratoire et celles déclarées dans les banques MADO. En effet, une fois le caractère d'antibio-résistance de ces souches confirmé, le personnel du LSPQ vérifie systématiquement la conformité de la déclaration correspondante. Cette vérification n'ayant pas été faite antérieurement, seules les données de 1991 à 1993 sont tabulées à la page 92. Il convient par ailleurs de signaler ici que des résistances à d'autres antibiotiques sont observées, principalement à la tétracycline et, beaucoup plus rarement, à la spectinomycine. L'émergence de résistances aux quinolones est aussi à surveiller.

Nous avons analysé les gonorrhées rectales et pharyngées. Le formulaire de déclaration actuel classe les gonorrhées en épisodes génito-urinaires, oculaires ou "autres". Parmi les 387 gonorrhées "autres" qui ont été rapportées entre 1990 et 1993, 293 touchaient un site d'infection connu: 157 étaient rectales, 130 étaient pharyngées tandis que 6 autres affectaient les deux sites à la fois. Ces infections sont majoritairement déclarées chez les hommes (160 des 163 cas rectaux et 116 des 136 cas pharyngés). Chez ceux-ci, la proportion des cas rectaux et pharyngés, par rapport au nombre total de cas rapportés, a augmenté jusqu'en 1992. Elle était en effet de 6,7 % (77/143) en 1990, de 8,6 % (82/953) en 1991, de 10,2 % (67/658) en 1992, et de 9,1 % (45/494) en 1993. Même si le nombre de cas rectaux ou pharyngés reste sensiblement stable d'une année à l'autre, leur proportion augmente puisque le nombre total de gonorrhée déclarée diminue. Pourtant, la proportion du nombre de gonorrhées "autres" reste stable d'une année à l'autre (8,2 % en 1990, 7,3 % en 1991, 8,3 % en 1992 et 6,6 % en 1993). Nous croyons, que cette hausse apparente pourrait ne refléter que l'amélioration de la caractérisation du site d'infection touché par les gonorrhées "autres". En effet, la proportion d'épisodes "autres" dont le site n'était pas précisé a diminué de 42,8 % (66/154) qu'elle était en 1990, à 15,7 % (16/102) en 1991, à 11,1 % (9/81) en 1992, à 6,0 % (3/50) en 1993².

²: Il y a deux fautes de frappe à la page 14 du rapport précédent: Il faudrait y lire qu'il y avait, en 1990 15,7 % (et non 17,7 %) d'épisodes de gonorrhée "autre" dont le site n'était pas précisé et 9 (et non 6) de ces mêmes cas en 1992.

8. Les hépatites B

Le type de validation est disponible pour 8 036 des 8 456 cas d'infection par le virus de l'hépatite B déclarés entre 1990 et 1993. Pour 80,2 % de ces cas, la validation du cas s'est faite par des épreuves de laboratoire. La validation des 1 246 autres cas est de type clinique. En 1993, la proportion des cas déclarés sur la base des indices cliniques était de 23,9 %. Elle était de 16,9 % en 1992 et de 10 % en 1990 et 1991. Nous croyons que les définitions nosologiques sont peut-être un peu trop larges quant à la distinction clinique entre un cas aigu ou chronique. La sérologie et la symptomatologie des hépatites sont complexes et font courir le risque d'une mauvaise classification des cas. Il est préoccupant de constater que la proportion de cas validés sur la seule base des indices cliniques augmente au fil des ans.

De plus, un nombre non-négligeable (1 305³ "type inconnu" et 562 "valeurs manquantes") d'hépatites B sont déclarés sans qu'en soit précisée la nature aiguë ou chronique. Encore ici, les pratiques locales de déclaration jouent un rôle considérable.

Les tableaux et graphiques des pages 93 à 138 ventilent la distribution des hépatites B déclarées.

9. Les syphilis

Les infections syphilitiques peuvent être déclarées selon 9 catégories différentes au Québec. La présentation clinique de ces infections étant très complexe, il y a un fort potentiel d'erreur de classification des cas déclarés. Ces erreurs ne sont que rarement corrigées puisque aucun effort systématique de validation des cas enregistrés n'est fait. Elles ont un impact important puisque les nombres de cas déclarés sont relativement petits. Il est donc difficile d'interpréter les tendances observées.

Nous avons catégorisé les cas de syphilis déclarés en cas "récents" ou en "anciens":

Infections "récentes":	infections primaires, secondaires et latentes vieilles de moins d'un an.
Infections "anciennes":	infections asymptomatiques: latentes de plus d'un an et neurologiques et infections devenues symptomatiques: symptomatiques tardives, neurologiques et cardiovasculaires.

Les infections anciennes devenues symptomatiques sont très peu nombreuses et ne peuvent donc pas être analysées selon le cadre utilisé pour les cas de gonorrhée ou de chlamydioses. Le tableau qui suit décrit la répartition de ces cas.

³: Il y a une faute de frappe à la page 15 du rapport précédent. On aurait dû y lire qu'il y avait, entre 1990 et 1992, 982 cas de type "inconnu" (et non pas 1 982).

Nombre total de cas déclarés d'infection syphilitique "ancienne" devenue symptomatique par type de syphilis et sexe, Québec (1990-1993)

Type de syphilis	Sexe manquant	Hommes	Femmes	Total
Cardio-vasculaire	0	3	1	4
Neurologique symptomatique	0	11	3	14
Symptomatique tardive	0	5	3	8
Sous-total	0	19	7	26
Type non-précisé	6	38	33	77
Total	6	57	40	83

La répartition des cas dont le type n'a pas été précisé pourrait encore ici complètement changer l'allure du tableau. Les numérateurs sont trop petits pour permettre l'analyse de ces cas. Il en va autrement des cas d'infections récentes et "anciennes asymptomatiques" dont la ventilation est présentée ci-bas ainsi que dans les tableaux et graphiques des pages 139 à 148.

Nombre total de cas déclarés d'infection syphilitique "récente" et ancienne asymptomatique par type de syphilis et sexe, Québec (1990-1993)

	Type de syphilis					Total
	Primaire	Secondaire	Latente (≤ 1 an)	Latente (+ d'un an)	Neuro. asympto.	
Sexe manquant	0	0	1	3	0	4
Hommes	53 ⁽¹⁾	29	41	213 ⁽²⁾	16	352
Femmes	23 ⁽³⁾	14	23	164 ⁽⁴⁾	8	232
Total	76	43	65	380	24	568

(1): 49 % des cas chez les 15-34 ans

(2): 56 % des cas chez les 40 ans et plus

(3): 78 % chez les 15-34 ans

(4): 70 % chez les 40 ans et plus

10. Conclusion

L'implantation du réseau provincial d'enregistrement des maladies dont la déclaration est obligatoire remonte maintenant à près de cinq ans. Le système a constamment évolué depuis, ce qui se poursuivra en 1995. En effet, le LSPQ est à planifier une mise à jour majeure de l'infrastructure informatique qui supporte les banques MADO. Cette mise à jour sera faite dans le courant de l'année et résultera en un système plus puissant et plus rapide avec un courrier électronique amélioré.

La complexité du système et l'étendue du territoire géographique qu'il couvre font qu'il est hasardeux de vouloir interpréter les données sans être familier avec le système de déclaration et avec la façon dont il est utilisé dans chaque région. Certaines tendances provinciales valent toutefois la peine d'être soulignées.

La chute des taux d'incidence des chlamydioses se poursuit en 1993. Comme à l'analyse précédente, nous croyons que la baisse observée chez les hommes, plutôt que chez les femmes, est un meilleur reflet de la transmission du *Chlamydia trachomatis* dans la population. Nous tenons ici le même raisonnement que précédemment: La chlamydie est plus souvent asymptomatique chez la femme que chez l'homme. De plus, les femmes sont plus souvent soumises au test de dépistage que les hommes. L'ensemble des cas diagnostiqués voici quelques années chez les femmes contenaient donc un mélange de nouveaux cas et de cas silencieux moins récents. Au fil des campagnes de dépistage, les cas silencieux détectés se font moins nombreux ce qui résulte, dans l'ensemble de la période d'observation, en une plus forte baisse des taux d'incidence que celle observée chez les hommes.

Les taux d'incidence des cas de gonorrhée déclarés ont également chuté. Le rythme de cette baisse d'incidence est maintenant moins prononcé tant chez les femmes que chez les hommes. Les syphilis (cas primaires, secondaires et latents de moins d'un an seulement) sont également déclarées moins souvent (mais ici depuis 1991 seulement) et cela autant chez les femmes que chez les hommes. La déclaration des hépatites B se fait quant à elle à un rythme constant depuis 1990. Comme dans le cas des chlamydioses, certains facteurs internes et externes au système de déclaration doivent être considérés avant de conclure que ces baisses résultent bien d'un ralentissement dans la transmission de la maladie. L'interprétation doit être particulièrement prudente dans le cas des hépatites B et des syphilis. En effet, les hépatites B ont fait et font parler d'elles régulièrement. Il est possible, surtout depuis 1993, que la population accède plus souvent aux tests de dépistage et qu'on détecte donc plus de cas aigus qu'auparavant. Par ailleurs, et tel que nous l'avons déjà mentionné, il ne se fait toujours aucune validation systématique des cas de syphilis déclarés au Québec. Cela laisse beaucoup de place aux erreurs de classification des cas déclarés. Les syphilis étant de surcroît détectées en faible nombre, il est difficile de juger de la validité des tendances observées.

Le présent rapport sera diffusé aux quatre coins de la province. Le rapport traitant des cas déclarés pendant les six premiers mois de 1994 sera moins largement diffusé. Il est toutefois disponible au CQCS (514 873 9890). Le prochain rapport annuel ajoutera aux données présentées ici celles des cas déclarés en 1994 (les utilisateurs du système MADO ont jusqu'au 31 mars 1995 pour valider et éditer les cas saisis en 1994). Les rapports annuels subséquents contiendront toujours les données des cinq années de déclaration les plus récentes.

L'exploitation statutaire des données des banques MADO est en voie de transformer le système de déclaration actuel en un véritable système de surveillance. L'une des facettes les plus importantes d'un tel système est celle de la rétroaction vers les utilisateurs. Le présent document est un outil de travail qui ne deviendra vraiment utile que si les régions se l'approprient. Malgré une sollicitation active, nous n'avons malheureusement reçu que très peu de commentaires ou critiques quant au rapport précédent. Il est pourtant certain que la présente analyse en bénéficierait. Les personnes qui auraient le temps de nous contacter sont priées d'appeler M. Raymond Parent au (418) 682-7969.

Mesures des tendances centrales de l'âge des cas déclarés par sexe et type de maladie, Québec (1993)

	Chlamydirose	Gonorrhée	Hépatite B (1)	Hépatite B aiguë	Hépatite B Chronique	Syphilis récente (2)	Syphilis ancienne (3)	Total des cas
Femmes								
Nombre de cas (4)	7 209	256	703	127	438	6	29	8 210
Age (années)								
médian	20	22	32	30	33	37	60	21
moyen	22,1	23,4	34,1	31,6	34,4	32,3	56,1	23,3
écart-type	6,5	7,2	14,0	12,1	14,1	11,7	17,0	8,5
étendue totale	<1-73	<1-53	<1-85	2-70	<1-85	22-52	20-78	<1-85
étendue 1er-99e percentile	14-45	12-46	2-71	12-62	1-70	22-52	20-78	13-57
Hommes								
Nombre de cas (4)	2 582	485	1 309	312	705	13	55	4 450
Age (années)								
médian	24	28	36	34	37	44	38	27
moyen	25,5	28,8	37,1	35,7	38,0	42,8	43,2	29,7
écart-type	8,3	8,6	13,4	12,2	13,8	10,6	18,1	11,6
étendue totale	<1-83	<14-67	<1-95	<1-67	<1-86	25-66	22-87	<1-95
étendue 1er-99e percentile	9-51	16-59	5-73	14-66	4-74	25-66	22-87	6-67
Valeurs-p								
vs moyennes (5)	<0,0001	<0,0001	<0,0001	0,0015	<0,0001	0,0675	0,0021	<0,0001
vs médianes (6)	0,0001	0,0001	0,0001	0,0006	0,0001	0,0592	0,0031	0,0001

(1): Total de tous les cas

(2): Syphilis primaire, secondaire et latente de moins d'un an


(3): Syphilis latente de plus d'un an et cérébrale asymptomatique

(4): Nombre de cas pour lesquels les données étaient disponibles pour les calculs

(5): Test de Student comparant la moyenne d'âge des cas déclarés chez les femmes à celle des cas déclarés chez les hommes

(6): Test de Wilcoxon comparant la médiane d'âge des cas déclarés chez les femmes à celle des cas déclarés chez les hommes


**Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose par sexe (1990-1993)
Province de Québec**



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	40	3746	11651	15437
1991	39	3466	9840	13345
1992	33	3111	8553	11697
1993	5	2637	7354	9996


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose par sexe (1990-1993)
Région du Bas-St-Laurent



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	2	97	246	345
1991	2	136	272	410
1992	2	117	217	336
1993	0	104	193	297

Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1990-1993)
Région du Saguenay/Lac St-Jean



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	2	198	496	696
1991	17	172	531	720
1992	21	173	469	663
1993	2	134	450	586



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	3	418	1047	1468
1991	1	369	1022	1392
1992	1	279	721	1001
1993	0	242	662	904

**Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydose par sexe (1990-1993)
Région de la Mauricie/Bois-Francs**



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	195	583	778
1991	0	204	548	752
1992	0	195	491	686
1993	0	139	408	547



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	206	462	668
1991	0	185	467	652
1992	0	142	464	606
1993	0	107	301	408


**Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose par sexe (1990-1993)
Région de Montréal centre**



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	18	941	3598	4557
1991	14	878	2264	3156
1992	2	726	1968	2696
1993	2	648	1647	2297


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1990-1993)
Région de l'Abitibi/Témiscamingue



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	1	162	515	678
1991	0	166	478	644
1992	1	121	376	498
1993	0	127	352	479


Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose par sexe (1990-1993)
Région de la Côte-Nord



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	157	397	554
1991	0	130	358	488
1992	0	110	298	408
1993	0	103	260	363

Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1990-1993)
Région de la Gaspésie/Îles de la Madeleine



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	48	194	242
1991	2	38	178	218
1992	0	59	150	209
1993	1	63	132	196



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	1	143	389	533
1991	1	108	334	443
1992	0	94	261	355
1993	0	82	201	283

**Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1990-1993)
Région de Laval**



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	6	211	473	690
1991	2	191	374	567
1992	0	205	356	561
1993	0	162	313	475



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	1	117	375	493
1991	0	137	359	496
1992	0	120	341	461
1993	0	94	264	358

**Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose par sexe (1990-1993)
Région des Laurentides**



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	206	651	857
1991	0	184	605	789
1992	0	167	494	661
1993	0	161	493	654



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	5	435	1292	1732
1991	0	394	1161	1555
1992	2	417	1180	1599
1993	0	301	924	1225

Taux d'incidence des cas déclarés de chlamydie par sexe (1990-1993)
Région Kativik



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	1	49	223	273
1991	0	63	278	341
1992	4	64	287	355
1993	0	67	254	321



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	10	109	119
1991	0	8	101	109
1992	0	12	85	97
1993	0	2	85	87

Nombre de cas déclarés de chlamydie par région socio-santaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)

Région socio-santaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Bas St-Laurent	1990	2	97	246	345
	1991	2	136	272	410
	1992	2	117	217	336
	1993	0	104	193	297
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	2	198	496	696
	1991	17	172	531	720
	1992	21	173	469	663
	1993	2	134	450	586
Québec	1990	3	418	1047	1468
	1991	1	369	1022	1392
	1992	1	279	721	1001
	1993	0	242	662	904
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0	195	583	778
	1991	0	204	548	752
	1992	0	195	491	686
	1993	0	139	408	547
Estrie	1990	0	206	462	668
	1991	0	185	467	652
	1992	0	142	464	606
	1993	0	107	301	408
Montréal centre	1990	18	941	3598	4557
	1991	14	878	2264	3156
	1992	2	726	1968	2696
	1993	2	648	1647	2297
Outaouais	1990	0	153	601	754
	1991	0	103	510	613
	1992	0	110	395	505
	1993	0	101	415	516
Abitibi/ Témiscamingue	1990	1	162	515	678
	1991	0	166	478	644
	1992	1	121	376	498
	1993	0	127	352	479
Côte-Nord	1990	0	157	397	554
	1991	0	130	358	488
	1992	0	110	298	408
	1993	0	103	260	363

Région socio-santaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Gaspésie/ Iles de la madeleine	1990	0	48	194	242
	1991	2	38	178	218
	1992	0	59	150	209
	1993	1	63	132	196
Chaudière/ Appalaches	1990	1	143	389	533
	1991	1	108	334	443
	1992	0	94	261	355
	1993	0	82	201	283
Laval	1990	6	211	473	690
	1991	2	191	374	567
	1992	0	205	356	561
	1993	0	162	313	475
Lanaudière	1990	1	117	375	493
	1991	0	137	359	496
	1992	0	120	341	461
	1993	0	94	264	358
Laurentides	1990	0	206	651	857
	1991	0	184	605	789
	1992	0	167	494	661
	1993	0	161	493	654
Montréal est	1990	5	435	1292	1732
	1991	0	394	1161	1555
	1992	2	417	1180	1599
	1993	0	301	924	1225
Kativik	1990	1	49	223	273
	1991	0	63	278	341
	1992	4	64	287	355
	1993	0	67	254	321
Terres Cries/ Baie-James	1990	0	10	109	119
	1991	0	8	101	109
	1992	0	12	85	97
	1993	0	2	85	87
Province de Québec	1990	40	3746	11651	15437
	1991	39	3466	9840	13345
	1992	33	3111	8553	11697
	1993	5	2637	7354	9996

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Bas St-Laurent	1990	1,0	96,0	236,6	168,3
	1991	1,0	134,6	261,6	200,0
	1992	1,0	115,8	208,7	163,9
	1993	0,0	103,0	185,6	144,9
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0,7	133,6	332,9	234,2
	1991	5,7	116,1	356,4	242,3
	1992	7,1	116,7	314,8	223,1
	1993	0,7	90,4	302,1	197,2
Québec	1990	0,5	140,6	329,2	238,5
	1991	0,2	124,1	321,4	226,2
	1992	0,2	93,9	226,7	162,7
	1993	0,0	81,4	208,2	146,9
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0,0	85,4	245,6	167,0
	1991	0,0	89,3	230,8	161,4
	1992	0,0	85,4	206,8	147,3
	1993	0,0	60,9	171,9	117,4
Estrie	1990	0,0	156,9	337,9	249,2
	1991	0,0	140,9	341,5	243,2
	1992	0,0	108,2	339,3	226,1
	1993	0,0	81,5	220,1	152,2
Montréal centre	1990	1,0	111,2	387,3	256,7
	1991	0,8	103,8	243,7	177,8
	1992	0,1	85,8	211,8	151,9
	1993	0,1	76,6	177,3	129,4
Outaouais	1990	0,0	109,0	420,0	266,0
	1991	0,0	73,4	356,4	216,2
	1992	0,0	78,4	276,1	178,1
	1993	0,0	72,0	290,0	182,0
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0,6	198,7	651,7	422,1
	1991	0,0	203,6	604,8	401,0
	1992	0,6	148,4	475,8	310,1
	1993	0,0	155,7	445,4	298,2
Côte-Nord	1990	0,0	297,8	787,5	537,3
	1991	0,0	246,6	710,1	473,3
	1992	0,0	208,7	591,1	395,7
	1993	0,0	195,4	515,7	352,1

Région socio-sanitaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Gaspésie/ Iles de la madeleine	1990	0,0	90,7	366,5	228,4
	1991	1,9	71,8	336,3	205,8
	1992	0,0	111,5	283,4	197,3
	1993	0,9	119,1	249,4	185,0
Chaudière/ Appalaches	1990	0,3	78,1	210,5	144,9
	1991	0,3	59,0	180,7	120,5
	1992	0,0	51,4	141,2	96,5
	1993	0,0	44,8	108,7	76,9
Laval	1990	1,9	136,2	296,7	219,5
	1991	0,6	123,3	234,6	180,4
	1992	0,0	132,3	223,3	178,5
	1993	0,0	104,6	196,3	151,1
Lanaudière	1990	0,3	69,7	224,0	147,0
	1991	0,0	81,6	214,5	147,9
	1992	0,0	71,5	203,7	137,5
	1993	0,0	56,0	157,7	106,8
Laurentides	1990	0,0	108,7	341,1	225,2
	1991	0,0	97,1	317,0	207,4
	1992	0,0	88,1	258,8	173,7
	1993	0,0	84,9	258,3	171,9
Montérégie	1990	0,4	73,5	213,3	144,6
	1991	0,0	66,6	191,7	129,8
	1992	0,2	70,4	194,8	133,5
	1993	0,0	50,9	152,5	102,3
Kativik	1990	13,0	1228,1	6002,7	3550,1
	1991	0,0	1578,9	7483,2	4434,3
	1992	52,0	1604,0	7725,4	4616,4
	1993	0,0	1679,2	6837,1	4174,3
Terres Cries/ Baie-James	1990	0,0	238,7	2639,2	1428,6
	1991	0,0	190,9	2445,5	1308,5
	1992	0,0	286,4	2058,1	1164,5
	1993	0,0	47,7	2058,1	1044,4
Province de Québec	1990	0,6	111,0	331,4	224,0
	1991	0,6	102,7	279,9	193,6
	1992	0,5	92,2	243,3	169,7
	1993	0,1	78,1	209,2	145,0

Nombre et taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie par ancien territoire de DSC montréalais, année d'épisode et sexe (1990-1993)

DSC		Nombre de cas			
		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Lakeshore	1990	0	28	125	153
	1991	0	24	107	131
	1992	0	40	119	159
	1993	0	36	122	158
Verdun	1990	4	113	256	373
	1991	0	97	253	350
	1992	0	98	280	378
	1993	0	94	238	332
Maisonneuve-Rosemont	1990	2	101	362	465
	1991	5	200	511	716
	1992	2	154	430	586
	1993	2	127	336	465
Sainte-Justine	1990	1	55	203	259
	1991	0	59	163	222
	1992	0	56	117	173
	1993	0	41	101	142
Hôpital général de Montréal	1990	5	125	663	793
	1991	7	87	219	313
	1992	0	67	195	262
	1993	0	59	149	208
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1990	0	84	306	390
	1991	1	102	337	440
	1992	0	107	298	405
	1993	0	97	255	352
Saint-Luc	1990	6	435	1683	2124
	1991	1	309	674	984
	1992	0	204	529	733
	1993	0	193	445	638

DSC		Taux d'incidence			
		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Lakeshore	1990	0,0	23,2	98,7	61,9
	1991	0,0	19,9	84,5	53,0
	1992	0,0	33,2	93,9	64,3
	1993	0,0	29,9	96,3	63,9
Verdun	1990	2,2	133,1	269,2	207,3
	1991	0,0	114,3	266,1	194,5
	1992	0,0	115,5	294,5	210,0
	1993	0,0	110,8	250,3	184,5
Maisonneuve-Rosemont	1990	0,5	50,5	163,5	110,3
	1991	1,2	99,9	230,7	169,8
	1992	0,5	76,9	194,2	139,0
	1993	0,5	63,5	151,7	110,3
Sainte-Justine	1990	0,6	70,4	222,1	152,7
	1991	0,0	75,5	178,3	130,9
	1992	0,0	71,7	128,0	102,0
	1993	0,0	52,5	110,5	83,7
Hôpital général de Montréal	1990	2,7	138,0	680,0	421,6
	1991	3,7	96,0	224,6	166,4
	1992	0,0	74,0	200,0	139,3
	1993	0,0	65,1	152,8	110,6
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1990	0,0	53,4	169,8	115,6
	1991	3,4	64,9	187,0	130,4
	1992	0,0	68,0	165,4	120,0
	1993	0,0	61,7	141,5	104,3
Saint-Luc	1990	2,6	380,1	1441,7	918,5
	1991	0,4	270,0	577,4	425,5
	1992	0,0	178,3	453,2	317,0
	1993	0,0	168,6	381,2	275,9

Nombre de cas déclarés de chlamydie par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Bas St-laurent	1990	8	1	1	88	126	71	30	12	7	1	0	345
	1991	7	0	3	121	135	76	37	19	9	2	1	410
	1992	5	0	2	110	121	49	22	12	12	1	2	336
	1993	2	1	2	101	95	48	26	12	9	1	0	297
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	44	3	5	191	213	145	53	33	6	3	0	696
	1991	36	0	11	228	234	120	46	32	10	3	0	720
	1992	29	1	11	233	228	79	32	31	15	2	2	663
	1993	26	3	4	211	206	73	33	17	11	1	1	586
Québec	1990	40	3	16	356	533	272	136	61	41	8	2	1468
	1991	12	2	13	356	533	240	116	66	46	5	3	1392
	1992	6	0	6	294	383	169	84	29	23	4	3	1001
	1993	9	1	5	265	356	138	75	29	24	2	0	904
Mauricie/ Bois-Francs	1990	13	1	4	220	254	149	80	39	12	4	2	778
	1991	7	1	14	245	230	130	60	38	24	3	0	752
	1992	11	2	7	245	233	104	44	24	11	4	1	686
	1993	7	5	10	179	191	88	29	21	12	4	1	547
Estrie	1990	7	1	8	210	262	107	49	6	17	1	0	668
	1991	14	4	9	201	251	91	47	23	10	2	0	652
	1992	17	4	4	215	210	80	33	23	16	3	1	606
	1993	10	0	9	167	132	57	17	6	7	2	1	408
Montréal centre	1990	495	23	38	1013	1273	869	456	200	148	27	15	4557
	1991	214	11	56	898	1036	517	215	99	88	16	6	3156
	1992	93	9	30	864	903	411	229	85	57	10	5	2696
	1993	99	10	33	682	726	362	206	82	82	12	3	2297
Outaouais	1990	28	3	13	253	234	106	66	29	16	3	3	754
	1991	13	2	10	205	207	98	41	25	9	0	3	613
	1992	7	5	13	174	179	69	20	20	13	4	1	505
	1993	3	5	4	181	162	84	46	17	14	0	0	516
Abitibi/ Témiscamingue	1990	23	3	20	240	202	112	45	22	7	4	0	678
	1991	10	1	20	238	190	104	44	24	7	4	2	644
	1992	1	2	8	166	177	69	38	15	18	3	1	498
	1993	0	3	11	167	126	77	31	31	23	8	2	479
Côte-Nord	1990	0	0	13	184	164	111	52	18	8	3	1	554
	1991	0	2	12	158	155	76	56	14	11	4	0	488
	1992	1	1	8	155	129	65	25	14	5	5	0	408
	1993	5	1	11	151	109	47	23	10	3	2	1	363

Nombre de cas déclarés de chlamydie par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	5	1	6	61	86	36	21	13	10	2	1	242
	1991	7	5	2	75	54	50	13	8	4	0	0	218
	1992	4	0	2	62	64	36	21	12	5	3	0	209
	1993	1	0	4	63	62	29	20	5	10	2	0	196
Chaudière/Appalaches	1990	7	1	9	136	188	104	44	18	21	4	1	533
	1991	4	3	6	118	162	70	43	23	13	1	0	443
	1992	10	3	2	118	106	61	32	12	9	1	1	355
	1993	6	0	0	76	112	45	23	11	9	1	0	283
Laval	1990	96	2	14	191	187	103	53	28	14	1	1	690
	1991	55	3	10	186	156	73	31	28	21	2	2	567
	1992	30	1	10	164	173	93	46	19	22	2	1	561
	1993	12	4	2	164	155	80	26	11	14	3	4	475
Lanaudière	1990	22	3	6	151	158	85	38	18	11	1	0	493
	1991	9	3	11	149	176	81	35	12	17	2	1	496
	1992	6	2	3	166	141	65	43	21	12	2	0	461
	1993	5	2	7	142	106	59	15	10	8	4	0	358
Laurentides	1990	260	1	12	212	191	90	48	31	8	3	1	857
	1991	6	2	9	283	249	135	45	43	11	6	0	789
	1992	1	6	11	215	233	107	42	30	9	5	2	661
	1993	2	4	10	241	211	102	32	26	17	8	1	654
Montérégie	1990	57	8	26	607	541	286	119	45	32	9	2	1732
	1991	39	4	18	565	580	197	70	39	32	10	1	1555
	1992	22	5	21	612	519	222	92	57	34	13	2	1599
	1993	19	3	17	424	423	180	97	30	25	6	1	1225
Kativik	1990	2	0	8	80	93	58	18	11	3	0	0	273
	1991	8	0	9	111	98	40	39	6	17	7	6	341
	1992	10	0	7	118	99	76	26	7	7	4	1	355
	1993	1	3	6	98	103	57	33	6	11	3	0	321
Terres Cries/Baie James	1990	3	1	2	50	44	14	4	1	0	0	0	119
	1991	1	2	1	48	31	14	8	0	3	1	0	109
	1992	0	2	1	35	27	25	7	0	0	0	0	97
	1993	0	0	1	34	36	12	2	1	0	1	0	87
Province de Québec	1990	1110	55	201	4243	4749	2718	1312	585	361	74	29	15437
	1991	442	45	214	4185	4477	2112	946	499	332	68	25	13345
	1992	253	43	146	3946	3925	1780	836	411	268	66	23	11697
	1993	207	45	136	3346	3311	1538	734	325	279	60	15	9996

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Bas St-laurent	1990	3,9	7,9	3,2	607,3	1082,9	482,2	164,1	66,8	24,0	5,3	0,0	168,3
	1991	3,4	0,0	9,6	835,1	1160,3	516,1	202,4	105,8	30,9	10,7	2,8	200,0
	1992	2,4	0,0	6,4	759,1	1040,0	332,8	120,3	66,8	41,2	5,3	5,5	163,9
	1993	1,0	7,9	6,4	697,0	816,5	326,0	142,2	66,8	30,9	5,3	0,0	144,9
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	15,4	15,9	10,3	896,5	1254,4	637,4	192,0	129,2	15,1	11,1	0,0	243,4
	1991	12,6	0,0	22,7	1070,2	1378,1	527,5	166,7	125,3	25,2	11,1	0,0	251,8
	1992	10,1	5,3	22,7	1093,6	1342,8	347,3	115,9	121,4	37,8	7,4	5,3	231,8
	1993	9,1	15,9	8,3	990,4	1213,2	320,9	119,6	66,6	27,7	3,7	2,7	204,9
Québec	1990	6,5	8,8	21,2	873,7	1159,7	511,9	241,5	112,9	43,6	12,9	2,0	238,5
	1991	1,9	5,9	17,2	873,7	1159,7	451,6	206,0	122,2	48,9	8,0	3,0	226,2
	1992	1,0	0,0	7,9	721,6	833,3	318,0	149,2	53,7	24,5	6,4	3,0	162,7
	1993	1,5	2,9	6,6	650,4	774,6	259,7	133,2	53,7	25,5	3,2	0,0	146,9
Mauricie/ Bois-Francs	1990	2,8	3,5	5,9	719,0	910,4	418,2	195,1	97,6	18,1	8,6	2,4	167,0
	1991	1,5	3,5	20,6	800,7	824,4	364,9	146,4	95,1	36,2	6,5	0,0	161,4
	1992	2,4	7,1	10,3	800,7	835,1	291,9	107,3	60,1	16,6	8,6	1,2	147,3
	1993	1,5	17,7	14,7	585,0	684,6	247,0	70,7	52,6	18,1	8,6	1,2	117,4
Estrie	1990	2,6	5,7	20,6	1136,4	1412,4	509,6	214,7	27,0	44,8	4,0	0,0	249,2
	1991	5,2	22,8	23,1	1087,7	1353,1	433,4	205,9	103,4	26,4	8,0	0,0	243,2
	1992	6,3	22,8	10,3	1163,4	1132,1	381,0	144,6	103,4	42,2	12,0	2,2	226,1
	1993	3,7	0,0	23,1	903,7	711,6	271,5	74,5	27,0	18,5	8,0	2,2	152,2
Montréal centre	1990	27,9	22,8	20,9	1022,1	899,6	503,2	279,7	141,3	61,8	14,2	4,4	256,7
	1991	12,1	10,9	30,8	906,1	732,2	299,4	131,9	70,0	36,7	8,4	1,7	177,8
	1992	5,2	8,9	16,5	871,8	638,2	238,0	140,5	60,1	23,8	5,3	1,5	151,9
	1993	5,6	9,9	18,2	688,1	513,1	209,6	126,4	57,9	34,2	6,3	0,9	129,4
Outaouais	1990	9,9	14,3	32,9	1326,7	1144,3	390,9	229,2	112,1	39,1	11,7	8,6	266,0
	1991	4,6	9,5	25,3	1075,0	1012,2	361,4	142,4	96,7	22,0	0,0	8,6	216,2
	1992	2,5	23,8	32,9	912,4	875,3	254,4	69,5	77,3	31,8	15,6	2,9	178,1
	1993	1,1	23,8	10,1	949,1	792,2	309,7	159,8	65,7	34,2	0,0	0,0	182,0
Abitibi/ Témiscamingue	1990	14,3	24,9	75,0	1988,4	1858,3	788,2	280,6	153,0	32,7	29,9	0,0	422,1
	1991	6,2	8,3	75,0	1971,8	1747,9	731,9	274,4	167,0	32,7	29,9	10,2	401,0
	1992	0,6	16,6	30,0	1375,3	1628,3	485,6	237,0	104,3	84,1	22,5	5,1	310,1
	1993	0,0	24,9	41,2	1383,6	1159,2	541,9	193,3	215,7	107,4	59,9	10,2	298,2
Côte-Nord	1990	0,0	0,0	78,6	2245,3	2214,7	1177,1	514,3	194,0	53,4	29,5	10,2	537,3
	1991	0,0	28,1	72,6	1928,0	2093,2	805,9	553,9	150,9	73,5	39,3	0,0	473,3
	1992	1,0	14,0	48,4	1891,4	1742,1	689,3	247,3	150,9	33,4	49,1	0,0	395,7
	1993	4,8	14,0	66,5	1842,6	1472,0	498,4	227,5	107,8	20,0	19,7	10,2	352,1

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	4,7	15,5	39,2	755,0	1337,5	446,9	220,2	141,1	66,4	19,5	5,7	228,4
	1991	6,6	77,6	13,1	928,2	839,8	620,7	136,3	86,8	26,6	0,0	0,0	205,8
	1992	3,8	0,0	13,1	767,3	995,3	446,9	220,2	130,2	33,2	29,2	0,0	197,3
	1993	0,9	0,0	26,1	779,7	964,2	360,0	209,8	54,3	66,4	19,5	0,0	185,0
Chaudière/Appalaches	1990	1,9	4,0	15,4	519,7	835,9	364,5	133,4	56,1	39,7	12,1	1,8	144,9
	1991	1,1	12,1	10,3	450,9	720,3	245,3	130,4	71,6	24,6	3,0	0,0	120,5
	1992	2,7	12,1	3,4	450,9	471,3	213,8	97,0	37,4	17,0	3,0	1,8	96,5
	1993	1,6	0,0	0,0	290,4	498,0	157,7	69,7	34,3	17,0	3,0	0,0	76,9
Laval	1990	30,5	9,5	33,5	921,8	837,8	379,4	177,7	106,0	30,3	2,8	2,3	219,5
	1991	17,5	14,3	23,9	897,7	698,9	368,9	103,9	106,0	45,4	5,7	4,6	180,4
	1992	9,5	4,8	23,9	791,5	775,1	342,5	154,2	71,9	47,6	5,7	2,3	178,5
	1993	3,8	19,1	4,8	791,5	694,4	294,7	87,2	41,7	30,3	8,5	9,2	151,1
Lanaudière	1990	6,6	11,7	11,4	693,6	865,3	307,6	110,5	57,1	21,6	3,2	0,0	147,0
	1991	2,7	11,7	21,0	684,4	963,9	293,2	101,8	38,0	33,4	6,5	2,4	147,9
	1992	1,8	7,8	5,7	762,5	772,2	235,3	125,1	66,6	23,6	6,5	0,0	137,5
	1993	1,5	7,8	13,4	652,3	580,5	213,5	43,6	31,7	15,7	13,0	0,0	106,8
Laurentides	1990	68,3	3,5	21,5	867,8	847,0	274,3	126,3	89,8	14,0	8,4	1,9	225,2
	1991	1,6	7,1	16,1	1158,4	1104,2	411,5	118,4	124,5	19,3	16,9	0,0	207,4
	1992	0,3	21,3	19,7	880,1	1033,3	326,2	110,5	86,9	15,8	14,0	3,9	173,7
	1993	0,5	14,2	17,9	986,5	935,7	310,9	84,2	75,3	29,8	22,5	1,9	171,9
Montérégie	1990	4,8	9,6	14,7	731,5	687,9	289,0	105,9	42,5	17,2	7,9	1,3	144,6
	1991	3,3	4,8	10,2	680,9	737,4	199,1	62,3	36,9	17,2	8,7	0,6	129,8
	1992	1,8	6,0	11,9	737,6	659,9	224,3	81,9	53,9	18,2	11,4	1,3	133,5
	1993	1,6	3,6	9,6	511,0	537,8	181,9	86,3	28,4	13,4	5,2	0,6	102,3
Kativik	1990	26,0	0,0	430,1	10256,4	12483,2	8000,0	2857,1	2650,6	495,9	0,0	0,0	3550,1
	1991	104,0	0,0	483,9	14230,8	13154,4	5517,2	6190,5	1445,8	2809,9	1728,4	1935,5	4434,3
	1992	130,0	0,0	376,3	15128,2	13288,6	10482,8	4127,0	1686,7	1157,0	987,7	322,6	4616,4
	1993	13,0	244,9	322,6	12564,1	13825,5	7862,1	5238,1	1445,8	1818,2	740,7	0,0	4174,3
Terres Cries/Baie James	1990	36,0	94,3	104,7	5235,6	5301,2	1794,9	634,9	208,3	0,0	0,0	0,0	1428,6
	1991	12,0	188,7	52,4	5026,2	3734,9	1794,9	1269,8	0,0	411,0	238,1	0,0	1308,5
	1992	0,0	188,7	52,4	3664,9	3253,0	3205,1	1111,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1164,5
	1993	0,0	0,0	52,4	3560,2	4337,3	1538,5	317,5	208,3	0,0	238,1	0,0	1044,4
Province de Québec	1990	16,1	12,4	21,6	941,2	1001,3	455,7	203,9	98,8	36,3	10,9	2,7	224,0
	1991	6,4	10,1	23,0	928,3	944,0	354,1	147,0	84,3	33,4	10,0	2,3	193,6
	1992	3,7	9,7	15,7	875,3	827,6	298,4	129,9	69,4	26,9	9,7	2,1	169,7
	1993	3,0	10,1	14,6	742,2	698,1	257,8	114,1	54,9	28,0	8,8	1,4	145,0

Nombre de cas déclarés de chlamydie chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Bas St-laurent	1990	6	1	1	72	90	48	17	8	3	0	246
	1991	3	0	3	98	83	47	27	8	2	1	272
	1992	2	0	2	93	72	22	10	5	9	0	217
	1993	1	0	2	81	60	25	14	6	4	0	193
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	23	2	5	162	157	87	34	18	6	2	496
	1991	25	0	11	192	169	87	22	18	5	2	531
	1992	12	1	11	211	146	47	14	20	6	1	469
	1993	19	1	3	196	149	41	23	13	5	0	450
Québec	1990	29	2	16	297	383	170	80	41	24	3	1047
	1991	11	1	12	305	391	156	78	38	28	2	1022
	1992	5	0	6	257	269	101	47	21	12	2	721
	1993	4	0	5	235	260	86	42	18	11	1	662
Mauricie/ Bois-Francs	1990	9	0	4	197	176	104	58	24	7	4	583
	1991	4	1	12	208	152	82	40	28	19	2	548
	1992	4	1	7	204	153	68	25	17	7	4	491
	1993	5	2	10	157	134	55	19	13	10	3	408
Estrie	1990	5	1	8	174	167	62	35	3	6	1	462
	1991	12	3	8	172	167	57	27	14	6	1	467
	1992	13	3	4	186	146	56	23	19	11	2	464
	1993	7	0	9	142	88	34	11	5	4	0	301
Montréal centre	1990	363	12	36	876	1034	647	346	147	109	15	3598
	1991	142	7	53	783	736	304	129	50	47	7	2264
	1992	65	7	26	719	656	266	137	49	34	7	1968
	1993	75	4	31	589	519	224	116	46	35	7	1647
Outaouais	1990	23	1	12	220	188	77	51	20	8	1	601
	1991	11	0	9	182	165	79	33	22	8	0	510
	1992	6	4	11	153	125	48	16	17	11	3	395
	1993	1	3	3	160	129	61	33	12	13	0	415
Abitibi/ Témiscamingue	1990	17	2	20	204	148	75	25	18	4	2	515
	1991	7	1	18	199	134	72	30	12	3	2	478
	1992	1	1	7	154	117	53	24	9	9	1	376
	1993	0	2	11	140	85	57	22	23	7	3	352
Côte-Nord	1990	0	0	12	152	105	80	27	11	7	2	397
	1991	0	2	11	128	103	54	42	11	6	1	358
	1992	0	0	6	130	83	46	17	8	3	5	298
	1993	4	0	11	119	71	35	13	4	1	1	260

Nombre de cas déclarés de chlamydie chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	5	1	6	49	66	30	20	7	8	1	1	194
	1991	4	4	2	62	43	41	12	7	3	0	0	178
	1992	3	0	2	53	47	18	13	9	4	1	0	150
	1993	0	0	4	51	42	19	12	1	3	0	0	132
Chaudière/Appalaches	1990	3	0	8	120	133	72	27	14	10	2	0	389
	1991	4	2	6	106	115	49	29	13	9	1	0	334
	1992	9	0	2	99	77	39	22	6	5	1	1	261
	1993	4	0	0	67	76	28	16	8	2	0	0	201
Laval	1990	67	2	14	163	118	59	25	17	7	1	0	473
	1991	39	2	10	145	100	41	19	12	6	0	0	374
	1992	21	0	10	121	108	46	30	10	9	1	0	356
	1993	10	1	2	134	100	42	11	3	4	3	3	313
Lanaudière	1990	20	1	6	135	114	58	21	15	5	0	0	375
	1991	5	3	11	128	122	55	21	7	7	0	0	359
	1992	4	0	3	140	94	45	31	16	6	2	0	341
	1993	2	1	6	122	72	41	7	8	3	2	0	264
Laurentides	1990	201	1	12	182	126	68	37	16	5	2	1	651
	1991	3	0	9	241	179	101	35	25	8	4	0	605
	1992	1	4	11	186	157	78	33	18	5	1	0	494
	1993	2	2	10	209	153	66	25	16	6	4	0	493
Montérégie	1990	43	4	25	505	376	199	82	29	24	4	1	1292
	1991	30	3	17	488	419	127	36	19	19	2	1	1161
	1992	15	3	19	516	372	144	50	36	17	6	2	1180
	1993	14	2	16	359	313	123	62	21	11	3	0	924
Kativik	1990	2	0	8	68	68	48	16	10	3	0	0	223
	1991	5	0	9	89	87	30	30	5	15	4	4	278
	1992	6	0	7	97	82	62	16	5	7	4	1	287
	1993	0	3	6	83	83	44	21	5	7	2	0	254
Terres Cries/Baie James	1990	3	1	2	48	39	13	2	1	0	0	0	109
	1991	0	2	1	47	28	13	7	0	3	0	0	101
	1992	0	1	1	31	26	21	5	0	0	0	0	85
	1993	0	0	1	33	35	12	2	1	0	1	0	85
Province de Québec	1990	819	31	195	3624	3488	1897	903	399	236	40	19	11651
	1991	305	31	202	3573	3193	1395	617	289	194	29	12	9840
	1992	167	25	135	3350	2730	1160	513	265	155	41	12	8553
	1993	148	21	130	2877	2369	993	449	203	126	30	8	7354

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Bas St-laurent	1990	5,8	16,3	6,6	1021,3	1577,6	640,9	182,3	89,0	20,9	0,0	0,0	236,6
	1991	2,9	0,0	19,7	1390,1	1454,9	627,5	289,5	89,0	13,9	10,5	0,0	261,6
	1992	1,9	0,0	13,2	1319,1	1262,1	293,7	107,2	55,6	62,6	0,0	9,9	208,7
	1993	1,0	0,0	13,2	1148,9	1051,7	333,8	150,1	66,7	27,8	0,0	0,0	185,6
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	16,0	21,7	21,2	1566,0	1895,0	761,5	245,2	144,8	30,6	14,4	0,0	345,2
	1991	17,4	0,0	46,7	1856,0	2039,8	761,5	158,7	144,8	25,5	14,4	0,0	369,6
	1992	8,4	10,9	46,7	2039,6	1762,2	411,4	101,0	160,9	30,6	7,2	0,0	326,5
	1993	13,2	10,9	12,7	1894,6	1798,4	358,9	165,9	104,6	25,5	0,0	0,0	313,2
Québec	1990	9,1	11,8	43,5	1495,8	1682,0	648,7	281,9	148,4	50,3	9,3	3,4	329,2
	1991	3,5	5,9	32,6	1536,1	1717,2	595,3	274,9	137,5	58,6	6,2	0,0	321,4
	1992	1,6	0,0	16,3	1294,4	1181,4	385,4	165,6	76,0	25,1	6,2	1,7	226,7
	1993	1,3	0,0	13,6	1183,6	1141,9	328,2	148,0	65,1	23,0	3,1	0,0	208,2
Mauricie/ Bois-Francs	1990	3,8	0,0	12,1	1313,3	1310,5	586,9	281,4	121,5	21,3	16,8	0,0	245,6
	1991	1,7	7,3	36,2	1386,7	1131,8	462,8	194,1	141,7	57,8	8,4	0,0	230,8
	1992	1,7	7,3	21,1	1360,0	1139,2	383,7	121,3	86,0	21,3	16,8	2,1	206,8
	1993	2,1	14,6	30,1	1046,7	997,8	310,4	92,2	65,8	30,4	12,6	0,0	171,9
Estrie	1990	3,7	11,7	42,4	1925,8	1827,1	585,2	303,2	26,9	31,7	7,8	0,0	337,9
	1991	8,8	35,1	42,4	1903,7	1827,1	538,0	233,9	125,7	31,7	7,8	0,0	341,5
	1992	9,5	35,1	21,2	2058,7	1597,4	528,6	199,2	170,6	58,1	15,5	3,8	339,3
	1993	5,1	0,0	47,7	1571,7	962,8	320,9	95,3	44,9	21,1	0,0	3,8	220,1
Montréal centre	1990	39,1	24,3	40,6	1783,9	1441,3	765,2	426,6	204,8	87,2	15,0	6,3	387,3
	1991	15,3	14,2	59,8	1594,5	1025,9	359,6	159,0	69,7	37,6	7,0	2,9	243,7
	1992	7,0	14,2	29,4	1464,2	914,4	314,6	168,9	68,3	27,2	7,0	1,0	211,8
	1993	8,1	8,1	35,0	1199,5	723,4	264,9	143,0	64,1	28,0	7,0	0,5	177,3
Outaouais	1990	16,1	9,7	62,3	2414,9	1826,1	552,0	345,3	154,0	39,6	7,8	0,0	420,0
	1991	7,7	0,0	46,7	1997,8	1602,7	566,3	223,4	169,4	39,6	0,0	5,2	356,4
	1992	4,2	38,6	57,1	1679,5	1214,2	344,1	108,3	130,9	54,4	23,5	5,2	276,1
	1993	0,7	29,0	15,6	1756,3	1253,0	437,3	223,4	92,4	64,3	0,0	0,0	290,0
Abitibi/ Témiscamingue	1990	20,8	32,4	145,7	3309,0	2700,7	1046,0	304,9	243,4	35,7	29,7	0,0	631,6
	1991	8,6	16,2	131,1	3227,9	2445,3	1004,2	365,9	162,3	26,8	29,7	0,0	586,2
	1992	1,2	16,2	51,0	2498,0	2135,0	739,2	292,7	121,7	80,3	14,9	0,0	461,1
	1993	0,0	32,4	80,1	2270,9	1551,1	795,0	268,3	311,0	62,5	44,6	21,6	431,7
Côte-Nord	1990	0,0	0,0	148,6	3800,0	2884,6	1691,3	547,1	243,1	96,8	42,2	19,7	787,5
	1991	0,0	56,8	136,2	3200,0	2829,7	1141,6	851,1	243,1	83,0	21,1	0,0	710,1
	1992	0,0	0,0	74,3	3250,0	2280,2	972,5	344,5	176,8	41,5	105,5	0,0	591,1
	1993	7,9	0,0	136,2	2975,0	1950,5	740,0	263,4	88,4	13,8	21,1	19,7	515,7

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1990	9,4	30,7	80,9	1258,0	2091,9	731,7	414,1	154,9	109,9	19,7	10,9	366,5
	1991	7,6	122,7	27,0	1591,8	1362,9	1000,0	248,4	154,9	41,2	0,0	0,0	336,3
	1992	5,7	0,0	27,0	1360,7	1489,7	439,0	269,2	199,1	54,9	19,7	0,0	283,4
	1993	0,0	0,0	53,9	1309,4	1331,2	463,4	248,4	22,1	41,2	0,0	0,0	249,4
Chaudière/Appalaches	1990	1,6	0,0	28,2	933,9	1233,8	502,4	164,2	88,8	38,3	12,1	0,0	210,5
	1991	2,2	16,3	21,2	824,9	1066,8	341,9	176,3	82,4	34,5	6,0	0,0	180,7
	1992	4,9	0,0	7,1	770,4	714,3	272,2	133,8	38,0	19,2	6,0	3,2	141,2
	1993	2,2	0,0	0,0	521,4	705,0	195,4	97,3	50,7	7,7	0,0	0,0	108,7
Laval	1990	42,0	19,6	68,5	1615,5	1086,1	439,5	165,9	125,1	29,6	5,6	0,0	296,7
	1991	24,5	19,6	48,9	1437,1	920,4	305,4	126,1	88,3	25,4	0,0	0,0	234,6
	1992	13,2	0,0	48,9	1199,2	994,0	342,6	199,1	73,6	38,1	5,6	0,0	223,3
	1993	6,3	9,8	9,8	1328,0	920,4	312,8	73,0	22,1	16,9	16,7	12,3	196,3
Lanaudière	1990	11,9	7,9	23,7	1290,0	1271,6	402,5	119,9	94,8	20,2	0,0	0,0	224,0
	1991	3,0	23,7	43,5	1223,1	1360,8	381,7	119,9	44,2	28,3	0,0	0,0	214,5
	1992	2,4	0,0	11,9	1337,8	1048,5	312,3	177,0	101,1	24,3	13,3	0,0	203,7
	1993	1,2	7,9	23,7	1165,8	803,1	284,5	40,0	50,5	12,1	13,3	0,0	157,7
Laurentides	1990	105,3	7,2	44,1	1550,3	1133,6	403,8	191,5	93,9	17,8	11,4	3,6	341,1
	1991	1,6	0,0	33,1	2052,8	1610,4	599,8	181,2	146,7	28,5	22,9	0,0	317,0
	1992	0,5	28,8	40,4	1584,3	1412,5	463,2	170,8	105,6	17,8	5,7	0,0	258,8
	1993	1,0	14,4	36,7	1780,2	1376,5	391,9	129,4	93,9	21,4	22,9	0,0	258,3
Montérégie	1990	7,1	9,8	29,1	1248,8	977,8	398,0	143,7	54,3	25,7	7,0	1,1	213,3
	1991	5,0	7,4	19,8	1206,7	1089,6	254,0	63,1	35,6	20,4	3,5	1,1	191,7
	1992	2,5	7,4	22,1	1276,0	967,4	288,0	87,6	67,4	18,2	10,5	2,2	194,8
	1993	2,3	4,9	18,6	887,7	813,9	246,0	108,6	39,3	11,8	5,3	0,0	152,5
Kativik	1990	53,8	0,0	904,0	17894,7	19154,9	13150,7	5423,7	5000,0	1071,4	0,0	0,0	6002,7
	1991	134,6	0,0	1016,9	23421,1	24507,0	8219,2	10169,5	2500,0	5357,1	1904,8	2424,2	7483,2
	1992	161,5	0,0	791,0	25526,3	23098,6	16986,3	5423,7	2500,0	2500,0	1904,8	606,1	7725,4
	1993	0,0	508,5	678,0	21842,1	23380,3	12054,8	7118,6	2500,0	2500,0	952,4	0,0	6837,1
Terres Cries/Baie James	1990	72,6	190,5	206,2	10105,3	9512,2	3376,6	655,7	408,2	0,0	0,0	0,0	2639,2
	1991	0,0	381,0	103,1	9894,7	6829,3	3376,6	2295,1	0,0	869,6	0,0	0,0	2445,5
	1992	0,0	190,5	103,1	6526,3	6341,5	5454,5	1639,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2058,1
	1993	0,0	0,0	103,1	6947,4	8536,6	3116,9	655,7	408,2	0,0	487,8	0,0	2058,1
Province de Québec	1990	23,3	14,2	42,9	1646,4	1485,1	636,3	278,8	134,2	47,2	11,6	3,1	331,4
	1991	8,7	14,2	44,5	1623,3	1359,5	467,9	190,5	97,2	38,8	8,4	1,9	279,9
	1992	4,8	11,5	29,7	1522,0	1162,4	389,1	158,4	89,2	31,0	11,8	1,9	243,3
	1993	4,2	9,6	28,6	1307,1	1008,7	333,1	138,7	68,3	25,2	8,7	1,3	209,2

Nombre de cas déclarés de chlamydie chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Bas St-laurent	1990	2	0	0	16	36	21	13	4	4	1	0	97
	1991	4	0	0	22	52	29	10	11	6	1	1	136
	1992	1	0	0	17	49	27	12	7	3	1	0	117
	1993	1	1	0	20	35	23	12	6	5	1	0	104
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	20	0	0	29	56	58	19	15	0	1	0	198
	1991	7	0	0	31	61	30	23	14	5	1	0	172
	1992	7	0	0	21	75	29	18	11	9	1	2	173
	1993	6	2	1	15	57	31	10	4	6	1	1	134
Québec	1990	11	1	0	57	150	101	56	20	17	5	0	418
	1991	1	1	1	51	142	83	38	28	18	3	3	369
	1992	1	0	0	36	114	68	37	8	11	2	2	279
	1993	5	1	0	30	96	52	33	11	13	1	0	242
Mauricie/ Bois-Francs	1990	4	1	0	23	78	45	22	15	5	0	2	195
	1991	3	0	2	37	78	48	20	10	5	1	0	204
	1992	7	1	0	41	80	36	19	7	4	0	0	195
	1993	2	3	0	22	57	33	10	8	2	1	1	139
Estrie	1990	2	0	0	36	95	45	14	3	11	0	0	206
	1991	2	1	1	29	84	34	20	9	4	1	0	185
	1992	4	1	0	29	64	24	10	4	5	1	0	142
	1993	3	0	0	25	44	23	6	1	3	2	0	107
Montréal centre	1990	126	11	2	133	234	221	108	53	39	12	2	941
	1991	64	4	3	114	296	212	86	49	41	9	0	878
	1992	26	2	4	145	247	145	92	36	23	3	3	726
	1993	22	6	2	93	207	138	90	36	47	5	2	648
Outaouais	1990	5	2	1	33	46	29	15	9	8	2	3	153
	1991	2	2	1	23	42	19	8	3	1	0	2	103
	1992	1	1	2	21	54	21	4	3	2	1	0	110
	1993	2	2	1	21	33	23	13	5	1	0	0	101
Abitibi/ Témiscamingue	1990	5	1	0	36	54	37	20	4	3	2	0	162
	1991	3	0	2	39	56	32	14	12	4	2	2	166
	1992	0	0	1	12	60	16	14	6	9	2	1	121
	1993	0	1	0	27	41	20	9	8	16	5	0	127
Côte-Nord	1990	0	0	1	32	59	31	25	7	1	1	0	157
	1991	0	0	1	30	52	22	14	3	5	3	0	130
	1992	1	1	2	25	46	19	8	6	2	0	0	110
	1993	1	1	0	32	38	12	10	6	2	1	0	103

Nombre de cas déclarés de chlamydie chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1990-1993) suite



Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	0	0	0	12	20	6	1	6	2	1	0	48
	1991	1	1	0	13	11	9	1	1	1	0	0	38
	1992	1	0	0	9	17	18	8	3	1	2	0	59
	1993	0	0	0	12	20	10	8	4	7	2	0	63
Chaudière/Appalaches	1990	4	1	1	15	55	32	17	4	11	2	1	143
	1991	0	1	0	11	47	21	14	10	4	0	0	108
	1992	1	3	0	19	29	22	10	6	4	0	0	94
	1993	2	0	0	9	36	17	7	3	7	1	0	82
Laval	1990	25	0	0	27	68	44	28	11	7	0	1	211
	1991	16	1	0	39	56	32	12	16	15	2	2	191
	1992	9	1	0	43	65	47	16	9	13	1	1	205
	1993	2	3	0	30	55	38	15	8	10	0	1	162
Lanaudière	1990	2	2	0	16	44	26	17	3	6	1	0	117
	1991	4	0	0	21	54	26	14	5	10	2	1	137
	1992	2	2	0	26	47	20	12	5	6	0	0	120
	1993	3	1	1	20	34	18	8	2	5	2	0	94
Laurentides	1990	59	0	0	30	65	22	11	15	3	1	0	206
	1991	3	2	0	42	70	34	10	18	3	2	0	184
	1992	0	2	0	29	76	29	9	12	4	4	2	167
	1993	0	2	0	32	58	36	7	10	11	4	1	161
Montérégie	1990	13	3	1	102	165	85	36	16	8	5	1	435
	1991	9	1	1	77	161	70	34	20	13	8	0	394
	1992	7	2	2	94	147	78	42	21	17	7	0	417
	1993	5	1	1	65	110	57	35	9	14	3	1	301
Kativik	1990	0	0	0	11	25	10	2	1	0	0	0	49
	1991	3	0	0	22	11	10	9	1	2	3	2	63
	1992	2	0	0	21	16	14	9	2	0	0	0	64
	1993	1	0	0	15	20	13	12	1	4	1	0	67
Terres Cries/Baie James	1990	0	0	0	2	5	1	2	0	0	0	0	10
	1991	1	0	0	1	3	1	1	0	0	1	0	8
	1992	0	1	0	4	1	4	2	0	0	0	0	12
	1993	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Province de Québec	1990	278	22	6	610	1255	814	406	186	125	34	10	3746
	1991	123	14	12	602	1276	712	328	210	137	39	13	3466
	1992	70	17	11	592	1187	617	322	146	113	25	11	3111
	1993	55	24	6	469	942	544	285	122	153	30	7	2637



Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Bas St-laurent	1990	2,0	0,0	0,0	213,8	603,5	293,5	144,8	44,6	27,2	10,9	0,0	96,0
	1991	4,0	0,0	0,0	293,9	871,8	405,3	111,4	122,6	40,8	10,9	6,1	134,6
	1992	1,0	0,0	0,0	227,1	821,5	377,4	133,7	78,0	20,4	10,9	0,0	115,8
	1993	1,0	15,6	0,0	267,2	586,8	321,5	133,7	66,9	34,0	10,9	0,0	103,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	14,1	0,0	0,0	267,0	641,8	510,8	139,2	115,5	0,0	7,5	0,0	139,1
	1991	4,9	0,0	0,0	285,5	699,1	264,2	168,6	107,8	24,8	7,5	0,0	120,9
	1992	4,9	0,0	0,0	193,4	859,6	255,4	131,9	84,7	44,7	7,5	11,9	121,6
	1993	4,2	20,8	4,0	138,1	653,3	273,0	73,3	30,8	29,8	7,5	6,0	94,2
Québec	1990	3,7	5,8	0,0	273,3	645,2	376,3	198,9	75,8	36,8	16,7	0,0	140,6
	1991	0,3	5,8	2,6	244,5	610,8	309,2	135,0	106,2	39,0	10,0	7,6	124,1
	1992	0,3	0,0	0,0	172,6	490,3	253,4	131,4	30,3	23,8	6,7	5,1	93,9
	1993	1,7	5,8	0,0	143,8	412,9	193,7	117,2	41,7	28,2	3,3	0,0	81,4
Mauricie/ Bois-Francs	1990	1,8	6,8	0,0	147,0	547,9	251,5	108,2	74,4	14,9	0,0	5,7	85,4
	1991	1,3	0,0	5,8	236,4	547,9	268,2	98,4	49,6	14,9	4,4	0,0	89,3
	1992	3,1	6,8	0,0	262,0	562,0	201,2	93,5	34,7	12,0	0,0	0,0	85,4
	1993	0,9	20,5	0,0	140,6	400,4	184,4	49,2	39,7	6,0	4,4	2,9	60,9
Estrie	1990	1,5	0,0	0,0	386,1	1008,0	433,1	124,2	27,0	57,6	0,0	0,0	156,9
	1991	1,5	11,1	5,0	311,0	891,2	327,2	177,4	81,1	20,9	8,2	0,0	140,9
	1992	3,0	11,1	0,0	311,0	679,0	231,0	88,7	36,1	26,2	8,2	0,0	108,2
	1993	2,3	0,0	0,0	268,1	466,8	221,4	53,2	9,0	15,7	16,4	0,0	81,5
Montréal centre	1990	14,9	21,3	2,1	265,6	335,3	251,4	131,8	76,1	34,0	13,4	1,5	111,2
	1991	7,6	7,7	3,2	227,7	424,1	241,2	105,0	70,3	35,8	10,0	0,0	103,8
	1992	3,1	3,9	4,3	289,6	353,9	165,0	112,3	51,7	20,1	3,3	2,2	85,8
	1993	2,6	11,6	2,1	185,7	296,6	157,0	109,8	51,7	41,0	5,6	1,5	76,6
Outaouais	1990	3,6	18,6	5,0	333,7	454,3	219,1	107,3	69,5	38,5	15,7	19,1	109,0
	1991	1,4	18,6	5,0	232,6	414,8	143,6	57,2	23,2	4,8	0,0	12,7	73,4
	1992	0,7	9,3	9,9	212,3	533,3	158,7	28,6	23,2	9,6	7,8	0,0	78,4
	1993	1,4	18,6	5,0	212,3	325,9	173,8	93,0	38,6	4,8	0,0	0,0	72,0
Abitibi/ Témiscamingue	1990	6,1	16,2	0,0	583,9	985,4	516,0	243,9	54,1	26,8	29,7	0,0	198,7
	1991	3,7	0,0	14,6	632,6	1021,9	446,3	170,7	162,3	35,7	29,7	21,6	203,6
	1992	0,0	0,0	7,3	194,6	1094,9	223,2	170,7	81,1	80,3	29,7	10,8	148,4
	1993	0,0	16,2	0,0	438,0	748,2	278,9	109,8	108,2	142,8	74,3	0,0	155,7
Côte-Nord	1990	0,0	0,0	11,7	749,4	1581,8	658,9	494,6	147,5	12,8	18,5	0,0	297,8
	1991	0,0	0,0	11,7	702,6	1394,1	467,6	277,0	63,2	64,1	55,6	0,0	246,6
	1992	1,9	27,6	23,4	585,5	1233,2	403,8	158,3	126,4	25,7	0,0	0,0	208,7
	1993	1,9	27,6	0,0	749,4	1018,8	255,0	197,8	126,4	25,7	18,5	0,0	195,4


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de chlamydie chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	0,0	0,0	0,0	285,0	605,1	151,1	21,5	128,3	26,0	19,5	0,0	90,7
	1991	1,9	31,5	0,0	308,8	332,8	226,7	21,5	21,4	13,0	0,0	0,0	71,8
	1992	1,9	0,0	0,0	213,8	514,4	453,4	171,7	64,2	13,0	39,0	0,0	111,5
	1993	0,0	0,0	0,0	285,0	605,1	251,9	171,7	85,6	91,1	39,0	0,0	119,1
Chaudière/Appalaches	1990	2,2	7,9	3,3	112,2	469,7	222,5	102,9	24,6	40,8	12,1	4,0	78,1
	1991	0,0	7,9	0,0	82,3	401,4	146,0	84,8	61,6	14,8	0,0	0,0	59,0
	1992	0,5	23,8	0,0	142,2	247,7	153,0	60,6	36,9	14,8	0,0	0,0	51,4
	1993	1,1	0,0	0,0	67,3	307,4	118,2	42,4	18,5	26,0	6,1	0,0	44,8
Laval	1990	16,1	0,0	0,0	252,6	593,4	320,5	189,1	85,3	30,9	0,0	5,2	136,2
	1991	10,3	9,3	0,0	364,8	488,7	233,1	81,0	124,1	66,2	11,5	10,4	123,3
	1992	5,8	9,3	0,0	402,2	567,2	342,3	108,0	69,8	57,3	5,7	5,2	132,3
	1993	1,3	27,8	0,0	280,6	479,9	276,8	101,3	62,1	44,1	0,0	5,2	104,6
Lanaudière	1990	1,2	15,3	0,0	141,8	478,5	196,1	101,0	19,0	23,1	6,3	0,0	69,7
	1991	2,4	0,0	0,0	186,1	587,3	196,1	83,2	31,7	38,5	12,6	5,2	81,6
	1992	1,2	15,3	0,0	230,4	511,1	150,8	71,3	31,7	23,1	0,0	0,0	71,5
	1993	1,8	7,7	3,7	177,2	369,8	135,7	47,5	12,7	19,2	12,6	0,0	56,0
Laurentides	1990	31,1	0,0	0,0	235,2	570,4	137,5	58,8	87,3	10,3	5,5	0,0	108,7
	1991	1,6	14,0	0,0	329,3	614,3	212,5	53,4	104,8	10,3	11,1	0,0	97,1
	1992	0,0	14,0	0,0	227,4	667,0	181,3	48,1	69,8	13,7	22,1	8,5	88,1
	1993	0,0	14,0	0,0	250,9	509,0	225,0	37,4	58,2	37,7	22,1	4,3	84,9
Montérégie	1990	2,2	7,1	1,1	238,7	411,4	173,5	64,9	30,5	8,6	8,7	1,5	73,5
	1991	1,5	2,4	1,1	180,2	401,4	142,9	61,3	38,1	14,0	13,9	0,0	66,6
	1992	1,2	4,7	2,2	219,9	366,5	159,2	75,8	40,0	18,3	12,2	0,0	70,4
	1993	0,8	2,4	1,1	152,1	274,3	116,4	63,1	17,2	15,0	5,2	1,5	50,9
Kativik	1990	0,0	0,0	0,0	2650,6	6756,8	2816,9	597,0	444,4	0,0	0,0	0,0	1228,1
	1991	75,2	0,0	0,0	5301,2	2973,0	2816,9	2686,6	444,4	645,2	1666,7	1290,3	1578,9
	1992	50,1	0,0	0,0	5060,2	4324,3	3943,7	2686,6	888,9	0,0	0,0	0,0	1604,0
	1993	25,1	0,0	0,0	3614,5	5405,4	3662,0	3582,1	444,4	1290,3	555,6	0,0	1679,2
Terres Cries/Baie James	1990	0,0	0,0	0,0	412,4	1176,5	256,4	615,4	0,0	0,0	0,0	0,0	238,7
	1991	23,9	0,0	0,0	206,2	705,9	256,4	307,7	0,0	0,0	500,0	0,0	190,9
	1992	0,0	188,7	0,0	824,7	235,3	1025,6	615,4	0,0	0,0	0,0	0,0	286,4
	1993	0,0	0,0	0,0	206,2	235,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,7
Province de Québec	1990	8,2	9,7	1,3	264,1	524,9	272,9	126,9	63,2	25,3	10,2	2,2	111,0
	1991	3,6	6,2	2,5	260,7	533,7	238,7	102,6	71,3	27,7	11,7	2,8	102,7
	1992	2,1	7,5	2,3	256,3	496,5	206,8	100,7	49,6	22,8	7,5	2,4	92,2
	1993	1,6	10,6	1,3	203,1	394,0	182,4	89,1	41,4	30,9	9,0	1,5	78,1







Taux d'incidence moyen des cas déclarés de chlamydirose chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1990-1993)



Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de chlamydirose chez les hommes, Québec (1990-1993)




**Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1993)
Province de Québec**



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	86	1143	660	1889
1991	24	953	410	1387
1992	10	658	303	971
1993	5	494	256	755



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	4	6	10
1991	0	8	4	12
1992	0	4	1	5
1993	0	4	2	6

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1993)
Région du Saguenay/Lac St-Jean



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	12	11	23
1991	1	15	17	33
1992	0	4	1	5
1993	1	1	7	9



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	1	52	14	67
1991	1	40	17	58
1992	0	43	12	55
1993	0	26	8	34

**Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1993)
Région de la Mauricie/Bois-Francs**



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	23	34	57
1991	0	23	16	39
1992	1	8	20	29
1993	0	9	3	12



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	4	7	11
1991	0	9	4	13
1992	1	11	1	13
1993	0	8	4	12

**Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1993)
Région de Montréal centre**



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	81	789	337	1207
1991	13	638	214	865
1992	3	445	137	585
1993	1	324	85	410



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	29	42	71
1991	0	9	12	21
1992	0	15	12	27
1993	0	14	8	22

**Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1993)
Région de l'Abitibi/Témiscamingue**



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	12	12	24
1991	0	11	7	18
1992	0	10	6	16
1993	0	5	1	6



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	42	54	96
1991	0	26	34	60
1992	0	6	11	17
1993	0	11	17	28

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1993)
Région de la Gaspésie/Iles de la Madeleine



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	2	2	4
1991	0	2	0	2
1992	0	1	0	1
1993	0	1	0	1



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	14	11	25
1991	0	7	3	10
1992	0	6	2	8
1993	0	5	4	9

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1993)
Région de Laval



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	17	21	38
1991	0	27	12	39
1992	1	12	5	18
1993	0	10	9	19



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	1	14	10	25
1991	0	9	9	18
1992	0	10	9	19
1993	0	4	3	7

Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1993)
Région des Laurentides



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	1	16	19	36
1991	1	14	5	20
1992	0	9	3	12
1993	0	7	6	13



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	2	78	32	112
1991	2	77	25	104
1992	1	38	24	63
1993	0	41	20	61

**Taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée par sexe (1990-1993)
Région Kativik**



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	35	41	76
1991	6	38	27	71
1992	3	35	56	94
1993	3	24	79	106



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	0	7	7
1991	0	0	4	4
1992	0	1	3	4
1993	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-santaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)

Région socio-santaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Bas St-Laurent	1990	0	4	6	10
	1991	0	8	4	12
	1992	0	4	1	5
	1993	0	4	2	6
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0	12	11	23
	1991	1	15	17	33
	1992	0	4	1	5
	1993	1	1	7	9
Québec	1990	1	52	14	67
	1991	1	40	17	58
	1992	0	43	12	55
	1993	0	26	8	34
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0	23	34	57
	1991	0	23	16	39
	1992	1	8	20	29
	1993	0	9	3	12
Estrie	1990	0	4	7	11
	1991	0	9	4	13
	1992	1	11	1	13
	1993	0	8	4	12
Montréal centre	1990	81	789	337	1207
	1991	13	638	214	865
	1992	3	445	137	585
	1993	1	324	85	410
Outaouais	1990	0	29	42	71
	1991	0	9	12	21
	1992	0	15	12	27
	1993	0	14	8	22
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	12	12	24
	1991	0	11	7	18
	1992	0	10	6	16
	1993	0	5	1	6
Côte-Nord	1990	0	42	54	96
	1991	0	26	34	60
	1992	0	6	11	17
	1993	0	11	17	28

Région socio-santaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Gaspésie/ Îles de la madeleine	1990	0	2	2	4
	1991	0	2	0	2
	1992	0	1	0	1
	1993	0	1	0	1
Chaudière/ Appalaches	1990	0	14	11	25
	1991	0	7	3	10
	1992	0	6	2	8
	1993	0	5	4	9
Laval	1990	0	17	21	38
	1991	0	27	12	39
	1992	1	12	5	18
	1993	0	10	9	19
Lanaudière	1990	1	14	10	25
	1991	0	9	9	18
	1992	0	10	9	19
	1993	0	4	3	7
Laurentides	1990	1	16	19	36
	1991	1	14	5	20
	1992	0	9	3	12
	1993	0	7	6	13
Monterégie	1990	2	78	32	112
	1991	2	77	25	104
	1992	1	38	24	63
	1993	0	41	20	61
Kativik	1990	0	35	41	76
	1991	6	38	27	71
	1992	3	35	56	94
	1993	3	24	79	106
Terres Cries/ Baie-James	1990	0	0	7	7
	1991	0	0	4	4
	1992	0	1	3	4
	1993	0	0	0	0
Province de Québec	1990	86	1143	660	1889
	1991	24	953	410	1387
	1992	10	658	303	971
	1993	5	494	256	755

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Bas St-Laurent	1990	0,0	4,0	5,8	4,9
	1991	0,0	7,9	3,8	5,9
	1992	0,0	4,0	1,0	2,4
	1993	0,0	4,0	1,9	2,9
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0,0	8,1	7,4	7,7
	1991	0,3	10,1	11,4	11,1
	1992	0,0	2,7	0,7	1,7
	1993	0,3	0,7	4,7	3,0
Québec	1990	0,2	17,5	4,4	10,9
	1991	0,2	13,5	5,3	9,4
	1992	0,0	14,5	3,8	8,9
	1993	0,0	8,7	2,5	5,5
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0,0	10,1	14,3	12,2
	1991	0,0	10,1	6,7	8,4
	1992	0,2	3,5	8,4	6,2
	1993	0,0	3,9	1,3	2,6
Estrie	1990	0,0	3,0	5,1	4,1
	1991	0,0	6,9	2,9	4,8
	1992	0,4	8,4	0,7	4,8
	1993	0,0	6,1	2,9	4,5
Montréal centre	1990	4,6	93,3	36,3	68,0
	1991	0,7	75,4	23,0	48,7
	1992	0,2	52,6	14,7	33,0
	1993	0,1	38,3	9,1	23,1
Outaouais	1990	0,0	20,7	29,4	25,0
	1991	0,0	6,4	8,4	7,4
	1992	0,0	10,7	8,4	9,5
	1993	0,0	10,0	5,6	7,8
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0,0	14,7	15,2	14,9
	1991	0,0	13,5	8,9	11,2
	1992	0,0	12,3	7,6	10,0
	1993	0,0	6,1	1,3	3,7
Côte-Nord	1990	0,0	79,7	107,1	93,1
	1991	0,0	49,3	67,4	58,2
	1992	0,0	11,4	21,8	16,5
	1993	0,0	20,9	33,7	27,2

Région socio-sanitaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Gaspésie/ Îles de la Madeleine	1990	0,0	3,8	3,8	3,8
	1991	0,0	3,8	0,0	1,9
	1992	0,0	1,9	0,0	0,9
	1993	0,0	1,9	0,0	0,9
Chaudière/ Appalaches	1990	0,0	7,7	6,0	6,8
	1991	0,0	3,8	1,6	2,7
	1992	0,0	3,3	1,1	2,2
	1993	0,0	2,7	2,2	2,4
Laval	1990	0,0	11,0	13,2	12,1
	1991	0,0	17,4	7,5	12,4
	1992	0,3	7,7	3,1	5,7
	1993	0,0	6,5	5,6	6,0
Lanaudière	1990	0,3	8,3	6,0	7,5
	1991	0,0	5,4	5,4	5,4
	1992	0,0	6,0	5,4	5,7
	1993	0,0	2,4	1,8	2,1
Laurentides	1990	0,3	8,4	10,0	9,5
	1991	0,3	7,4	2,6	5,3
	1992	0,0	4,7	1,6	3,2
	1993	0,0	3,7	3,1	3,4
Montérégie	1990	0,2	13,2	5,3	9,4
	1991	0,2	13,0	4,1	8,7
	1992	0,1	6,4	4,0	5,3
	1993	0,0	6,9	3,3	5,1
Kativik	1990	0,0	877,2	1103,6	988,3
	1991	78,0	952,4	726,8	923,3
	1992	39,0	877,2	1507,4	1222,4
	1993	39,0	601,5	2126,5	1378,4
Terres Cries/ Baie-James	1990	0,0	0,0	169,5	84,0
	1991	0,0	0,0	96,9	48,0
	1992	0,0	23,9	72,6	48,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1990	1,2	33,9	18,8	27,4
	1991	0,3	28,2	11,7	20,1
	1992	0,1	19,5	8,6	14,1
	1993	0,1	14,6	7,3	11,0

Nombre et taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par ancien territoire de DSC montréalais, année d'épisode et sexe (1990-1993)

DSC		Nombre de cas			
		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Lakeshore	1990	1	18	18	37
	1991	0	14	9	23
	1992	0	6	6	12
	1993	0	0	9	9
Verdun	1990	1	28	17	46
	1991	0	37	17	54
	1992	0	23	15	38
	1993	0	16	12	28
Maisonneuve-Rosemont	1990	1	28	34	63
	1991	0	57	44	101
	1992	0	33	16	49
	1993	0	19	7	26
Sainte-Justine	1990	1	40	36	77
	1991	0	35	29	64
	1992	0	26	17	43
	1993	0	35	17	52
Hôpital général de Montréal	1990	69	191	74	334
	1991	12	126	40	178
	1992	0	57	20	77
	1993	0	44	21	65
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1990	2	47	25	74
	1991	0	36	19	55
	1992	0	27	14	41
	1993	1	26	7	34
Saint-Luc	1990	6	437	133	576
	1991	1	333	56	390
	1992	3	273	49	325
	1993	0	184	12	196

DSC		Taux d'incidence			
		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Lakeshore	1990	0,4	14,9	14,2	15,0
	1991	0,0	11,6	7,1	9,3
	1992	0,0	5,0	4,7	4,9
	1993	0,0	0,0	7,1	3,6
Verdun	1990	0,6	33,0	17,9	25,6
	1991	0,0	43,6	17,9	30,0
	1992	0,0	27,1	15,8	21,1
	1993	0,0	18,9	12,6	15,6
Maisonneuve-Rosemont	1990	0,2	14,0	15,4	14,9
	1991	0,0	28,5	19,9	24,0
	1992	0,0	16,5	7,2	11,6
	1993	0,0	9,5	3,2	6,2
Sainte-Justine	1990	0,6	51,2	39,4	45,4
	1991	0,0	44,8	31,7	37,7
	1992	0,0	33,3	18,6	25,4
	1993	0,0	44,8	18,6	30,7
Hôpital général de Montréal	1990	36,7	210,9	75,9	177,6
	1991	6,4	139,1	41,0	94,6
	1992	0,0	62,9	20,5	40,9
	1993	0,0	48,6	21,5	34,6
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1990	0,6	29,9	13,9	21,9
	1991	0,0	22,9	10,5	16,3
	1992	0,0	17,2	7,8	12,1
	1993	0,3	16,5	3,9	10,1
Saint-Luc	1990	2,6	381,9	113,9	249,1
	1991	0,4	291,0	48,0	168,7
	1992	1,3	238,6	42,0	140,5
	1993	0,0	160,8	10,3	84,8

Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Bas St-laurent	1990	1	0	0	2	5	1	0	1	0	0	10
	1991	1	0	0	1	1	5	1	3	0	0	12
	1992	0	0	0	0	2	0	2	1	0	0	5
	1993	0	0	0	2	3	0	1	0	0	0	6
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	1	0	0	2	7	6	2	4	1	0	23
	1991	0	0	0	8	11	7	5	2	0	0	33
	1992	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	5
	1993	0	0	1	1	1	5	1	0	0	0	9
Québec	1990	2	0	0	8	12	13	16	8	6	2	67
	1991	3	0	1	4	16	13	10	5	3	2	58
	1992	0	0	0	3	17	11	9	7	7	0	55
	1993	0	0	0	0	8	9	7	7	2	1	34
Mauricie/ Bois-Francs	1990	2	0	1	10	15	16	7	4	1	1	57
	1991	0	3	0	3	3	16	5	5	4	0	39
	1992	0	0	2	7	9	4	3	2	2	0	29
	1993	0	0	0	1	2	7	1	1	0	0	12
Estrie	1990	0	0	0	3	4	1	2	0	0	1	11
	1991	0	0	0	2	5	2	1	1	2	0	13
	1992	3	0	0	0	4	5	1	0	0	0	13
	1993	2	0	0	1	3	2	2	0	2	0	12
Montréal centre	1990	205	3	7	132	308	267	117	81	70	17	1207
	1991	84	1	4	95	182	197	140	74	68	17	865
	1992	28	0	0	64	157	134	100	52	36	13	585
	1993	5	0	0	39	104	114	76	28	36	6	410
Outaouais	1990	1	1	0	20	26	10	5	5	1	1	71
	1991	0	0	1	5	7	4	2	1	1	0	21
	1992	0	0	0	8	6	6	4	2	1	0	27
	1993	0	0	0	8	8	3	1	1	0	1	22
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	0	0	11	8	4	0	1	0	0	24
	1991	0	0	0	4	5	6	1	2	0	0	18
	1992	0	0	0	5	0	4	2	2	1	0	16
	1993	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	6
Côte-Nord	1990	0	0	3	28	19	24	11	6	4	1	96
	1991	0	0	4	18	23	8	4	1	2	0	60
	1992	0	1	2	4	5	3	1	0	0	1	17
	1993	0	0	1	11	9	5	1	0	1	0	28

Nombre de cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	4
	1991	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	1992	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1993	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Chaudière/Appalaches	1990	0	0	0	4	4	8	2	3	4	0	25
	1991	0	0	0	1	1	2	1	3	2	0	10
	1992	0	0	0	1	2	0	2	2	1	0	8
	1993	0	0	0	1	1	1	3	1	2	0	9
Laval	1990	3	0	0	5	7	11	4	4	1	3	38
	1991	7	0	0	9	5	10	3	3	2	0	39
	1992	0	0	0	3	6	2	3	3	1	0	18
	1993	0	0	1	1	4	2	5	1	5	0	19
Lanaudière	1990	0	0	0	10	5	7	2	1	0	0	25
	1991	0	0	0	4	5	5	1	2	1	0	18
	1992	0	0	1	2	3	3	4	2	3	1	19
	1993	0	0	0	1	1	3	2	0	0	0	7
Laurentides	1990	1	0	0	8	13	7	3	1	0	3	36
	1991	1	0	1	2	6	4	3	2	0	1	20
	1992	0	1	0	3	2	2	1	1	2	0	12
	1993	0	0	2	4	1	3	0	1	0	2	13
Montérégie	1990	5	1	0	23	31	32	4	10	3	2	112
	1991	5	0	0	15	28	23	18	4	6	4	104
	1992	1	2	0	11	16	10	13	2	6	2	63
	1993	2	0	0	11	9	16	11	4	4	3	61
Kativik	1990	3	0	3	15	31	16	5	3	0	0	76
	1991	9	1	0	11	19	13	8	8	2	0	71
	1992	1	0	6	24	31	22	4	3	2	0	94
	1993	1	2	5	29	27	23	13	3	1	1	106
Terres Cries/Baie James	1990	0	0	0	3	2	1	1	0	0	0	7
	1991	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	4
	1992	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1990	224	5	14	286	498	424	181	133	91	31	1889
	1991	110	5	11	184	318	316	204	116	94	24	1387
	1992	33	4	11	136	265	208	150	80	63	17	971
	1993	10	2	10	112	183	194	124	48	54	13	755

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire		Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Bas St-laurent	1990	0,5	0,0	0,0	13,8	43,0	6,8	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	4,9
	1991	0,5	0,0	0,0	6,9	8,6	34,0	5,5	16,7	0,0	0,0	0,0	5,9
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	10,9	5,6	0,0	0,0	0,0	2,4
	1993	0,0	0,0	0,0	13,8	25,8	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0,3	0,0	0,0	9,4	41,2	26,4	7,2	15,7	2,5	0,0	0,0	8,0
	1991	0,0	0,0	0,0	37,5	64,8	30,8	18,1	7,8	0,0	0,0	0,0	11,5
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	4,4	3,6	3,9	0,0	0,0	0,0	1,7
	1993	0,0	0,0	2,1	4,7	5,9	22,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
Québec	1990	0,3	0,0	0,0	19,6	26,1	24,5	28,4	14,8	6,4	3,2	0,0	10,9
	1991	0,5	0,0	1,3	9,8	34,8	24,5	17,8	9,3	3,2	3,2	1,0	9,4
	1992	0,0	0,0	0,0	7,4	37,0	20,7	16,0	13,0	7,4	0,0	1,0	8,9
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	16,9	12,4	13,0	2,1	1,6	0,0	5,5
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0,4	0,0	1,5	32,7	53,8	44,9	17,1	10,0	1,5	2,2	0,0	12,2
	1991	0,0	10,6	0,0	9,8	10,8	44,9	12,2	12,5	6,0	0,0	0,0	8,4
	1992	0,0	0,0	2,9	22,9	32,3	11,2	7,3	5,0	3,0	0,0	0,0	6,2
	1993	0,0	0,0	0,0	3,3	7,2	19,6	2,4	2,5	0,0	0,0	0,0	2,6
Estrie	1990	0,0	0,0	0,0	16,2	21,6	4,8	8,8	0,0	0,0	4,0	0,0	4,1
	1991	0,0	0,0	0,0	10,8	27,0	9,5	4,4	4,5	5,3	0,0	0,0	4,8
	1992	1,1	0,0	0,0	0,0	21,6	23,8	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
	1993	0,7	0,0	0,0	5,4	16,2	9,5	8,8	0,0	5,3	0,0	0,0	4,5
Montréal centre	1990	11,5	3,0	3,9	133,2	217,7	154,6	71,8	57,2	29,2	9,0	0,0	68,0
	1991	4,7	1,0	2,2	95,9	128,6	114,1	85,9	52,3	28,4	9,0	0,9	48,7
	1992	1,6	0,0	0,0	64,6	111,0	77,6	61,3	36,7	15,0	6,8	0,3	33,0
	1993	0,3	0,0	0,0	39,4	73,5	66,0	46,6	19,8	15,0	3,2	0,6	23,1
Outaouais	1990	0,4	4,8	0,0	104,9	127,1	36,9	17,4	19,3	2,4	3,9	2,9	25,0
	1991	0,0	0,0	2,5	26,2	34,2	14,7	6,9	3,9	2,4	0,0	0,0	7,4
	1992	0,0	0,0	0,0	42,0	29,3	22,1	13,9	7,7	2,4	0,0	0,0	9,5
	1993	0,0	0,0	0,0	42,0	39,1	11,1	3,5	3,9	0,0	0,0	2,9	7,8
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0,0	0,0	0,0	91,1	73,6	28,1	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	14,9
	1991	0,0	0,0	0,0	33,1	46,0	42,2	6,2	13,9	0,0	0,0	0,0	11,2
	1992	0,0	0,0	0,0	41,4	0,0	28,1	12,5	13,9	9,3	7,5	0,0	10,0
	1993	0,0	0,0	0,0	16,6	9,2	7,0	0,0	7,0	4,7	0,0	0,0	3,7
Côte-Nord	1990	0,0	0,0	18,1	341,7	256,6	254,5	108,8	64,7	26,7	9,8	0,0	93,1
	1991	0,0	0,0	24,2	219,6	310,6	84,8	39,6	10,8	13,4	0,0	0,0	58,2
	1992	0,0	14,0	12,1	48,8	67,5	31,8	9,9	0,0	0,0	0,0	10,2	16,5
	1993	0,0	0,0	6,0	134,2	121,5	53,0	9,9	0,0	6,7	0,0	0,0	27,2

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	0,0	0,0	0,0	24,8	15,6	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	3,8
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	6,6	0,0	1,9
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
Chaudière/Appalaches	1990	0,0	0,0	0,0	15,3	17,8	28,0	6,1	9,3	7,6	0,0	6,8
	1991	0,0	0,0	0,0	3,8	4,4	7,0	3,0	9,3	3,8	0,0	2,7
	1992	0,0	0,0	0,0	3,8	8,9	0,0	6,1	6,2	1,9	0,0	2,2
	1993	0,0	0,0	0,0	3,8	4,4	3,5	9,1	3,1	3,8	0,0	2,4
Laval	1990	1,0	0,0	0,0	24,1	31,4	40,5	13,4	15,1	2,2	8,5	12,1
	1991	2,2	0,0	0,0	43,4	22,4	36,8	10,1	11,4	4,3	0,0	12,4
	1992	0,0	0,0	0,0	14,5	26,9	7,4	10,1	11,4	2,2	0,0	5,7
	1993	0,0	0,0	2,4	4,8	17,9	7,4	16,8	3,8	10,8	0,0	6,0
Lanaudière	1990	0,0	0,0	0,0	45,9	27,4	25,3	5,8	3,2	0,0	0,0	7,5
	1991	0,0	0,0	0,0	18,4	27,4	18,1	2,9	6,3	2,0	0,0	5,4
	1992	0,0	0,0	1,9	9,2	16,4	10,9	11,6	6,3	5,9	3,2	5,7
	1993	0,0	0,0	0,0	4,6	5,5	10,9	5,8	0,0	0,0	0,0	2,1
Laurentides	1990	0,3	0,0	0,0	32,7	57,6	21,3	7,9	2,9	0,0	8,4	9,5
	1991	0,3	0,0	1,8	8,2	26,6	12,2	7,9	5,8	0,0	2,8	5,3
	1992	0,0	3,5	0,0	12,3	8,9	6,1	2,6	2,9	3,5	0,0	3,2
	1993	0,0	0,0	3,6	16,4	4,4	9,1	0,0	2,9	0,0	5,6	3,4
Montérégie	1990	0,4	1,2	0,0	27,7	39,4	32,3	3,6	9,5	1,6	1,7	9,4
	1991	0,4	0,0	0,0	18,1	35,6	23,2	16,0	3,8	3,2	3,5	8,7
	1992	0,1	2,4	0,0	13,3	20,3	10,1	11,6	1,9	3,2	1,7	5,3
	1993	0,2	0,0	0,0	13,3	11,4	16,2	9,8	3,8	2,1	2,6	5,1
Kativik	1990	39,0	0,0	161,3	1923,1	4161,1	2206,9	793,7	722,9	0,0	0,0	988,3
	1991	117,0	81,6	0,0	1410,3	2550,3	1793,1	1269,8	1927,7	330,6	0,0	923,3
	1992	13,0	0,0	322,6	3076,9	4161,1	3034,5	634,9	722,9	330,6	0,0	1222,4
	1993	13,0	163,3	268,8	3717,9	3624,2	3172,4	2063,5	722,9	165,3	246,9	1378,4
Terres Cries/Baie James	1990	0,0	0,0	0,0	314,1	241,0	128,2	158,7	0,0	0,0	0,0	84,0
	1991	0,0	0,0	0,0	209,4	120,5	128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	1992	0,0	0,0	0,0	104,7	361,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1990	3,3	1,1	1,5	63,4	105,0	71,1	28,1	22,5	9,1	4,6	27,4
	1991	1,6	1,1	1,2	40,8	67,1	53,0	31,7	19,6	9,4	3,5	20,1
	1992	0,5	0,9	1,2	30,2	55,9	34,9	23,3	13,5	6,3	2,5	14,1
	1993	0,1	0,4	1,1	24,8	38,6	32,5	19,3	8,1	5,4	1,9	11,0

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Bas St-Jeurent	1990	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	6
	1991	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	4
	1992	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1993	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0	0	0	2	4	1	2	2	0	0	11
	1991	0	0	0	6	7	4	0	0	0	0	17
	1992	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1993	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	7
Québec	1990	1	0	0	2	3	2	3	3	0	0	14
	1991	2	0	1	3	5	1	2	2	0	1	17
	1992	0	0	0	2	4	2	2	1	1	0	12
	1993	0	0	0	0	3	1	3	1	0	0	8
Mauricie/ Bois-Francis	1990	1	0	1	8	10	7	6	0	0	1	34
	1991	0	1	0	3	2	5	3	1	1	0	16
	1992	0	0	2	7	6	2	2	1	0	0	20
	1993	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3
Estrie	1990	0	0	0	2	3	0	1	0	0	1	7
	1991	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	4
	1992	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1993	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4
Montréal centre	1990	34	2	6	82	115	54	17	9	14	4	337
	1991	8	1	4	53	61	45	18	13	9	1	214
	1992	2	0	0	43	44	20	16	8	3	1	137
	1993	0	0	0	22	33	15	9	1	5	0	85
Outaouais	1990	1	1	0	17	14	5	2	1	1	0	42
	1991	0	0	0	4	4	3	1	0	0	0	12
	1992	0	0	0	6	4	1	1	0	0	0	12
	1993	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	8
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	12
	1991	0	0	0	2	1	3	1	0	0	0	7
	1992	0	0	0	3	0	1	0	1	1	0	6
	1993	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Côte-Nord	1990	0	0	2	21	8	11	7	2	2	1	54
	1991	0	0	4	11	15	2	0	1	1	0	34
	1992	0	1	2	2	3	2	1	0	0	0	11
	1993	0	0	1	8	5	3	0	0	0	0	17

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/Appalaches	1990	0	0	0	4	2	3	0	0	2	0	11
	1991	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	3
	1992	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
	1993	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	4
Laval	1990	3	0	0	5	6	2	2	1	1	1	21
	1991	1	0	0	8	2	1	0	0	0	0	12
	1992	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	5
	1993	0	0	1	1	1	1	3	0	2	0	9
Lanaudière	1990	0	0	0	6	2	2	0	0	0	0	10
	1991	0	0	0	3	3	1	0	1	1	0	9
	1992	0	0	1	2	0	1	3	1	1	0	9
	1993	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Laurentides	1990	0	0	0	4	9	4	0	1	0	1	19
	1991	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	5
	1992	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	3
	1993	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	6
Montérégie	1990	1	1	0	10	11	6	0	2	1	0	32
	1991	1	0	0	8	9	3	3	1	0	0	25
	1992	0	2	0	8	6	1	7	0	0	0	24
	1993	0	0	0	7	1	6	3	1	1	0	20
Kativik	1990	2	0	3	8	16	9	3	0	0	0	41
	1991	1	1	0	6	10	5	2	1	1	0	27
	1992	1	0	5	15	19	15	1	0	0	0	56
	1993	0	2	3	26	26	14	6	2	0	0	79
Terres Cries/Baie James	1990	0	0	0	3	2	1	1	0	0	0	7
	1991	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	4
	1992	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1990	43	4	12	187	211	108	44	21	21	9	660
	1991	13	3	9	114	124	77	32	21	14	2	410
	1992	3	4	10	92	92	47	34	14	6	1	303
	1993	0	2	7	78	78	48	27	6	9	1	256

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Bas St-laurent	1990	0,0	0,0	0,0	28,4	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
	1991	0,0	0,0	0,0	14,2	17,5	26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1993	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	1,9
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0,0	0,0	0,0	19,3	48,3	8,8	14,4	16,1	0,0	0,0	7,7
	1991	0,0	0,0	0,0	58,0	84,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	1993	0,0	0,0	0,0	9,7	12,1	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9
Québec	1990	0,3	0,0	0,0	10,1	13,2	7,6	10,6	10,9	0,0	0,0	4,4
	1991	0,6	0,0	2,7	15,1	22,0	3,8	7,0	7,2	0,0	3,1	5,3
	1992	0,0	0,0	0,0	10,1	17,6	7,6	7,0	3,6	2,1	0,0	3,8
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	3,8	10,6	3,6	0,0	0,0	2,5
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0,4	0,0	3,0	53,3	74,5	39,5	29,1	0,0	0,0	4,2	14,3
	1991	0,0	7,3	0,0	20,0	14,9	28,2	14,6	5,1	3,0	0,0	6,7
	1992	0,0	0,0	6,0	46,7	44,7	11,3	9,7	5,1	0,0	0,0	8,4
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	5,6	0,0	5,1	0,0	0,0	1,3
Estrie	1990	0,0	0,0	0,0	22,1	32,8	0,0	8,7	0,0	0,0	7,8	5,1
	1991	0,0	0,0	0,0	11,1	21,9	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	2,9
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
	1993	0,0	0,0	0,0	11,1	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
Montréal centre	1990	3,7	4,1	6,8	167,0	160,3	63,9	21,0	12,5	11,2	4,0	36,3
	1991	0,9	2,0	4,5	107,9	85,0	53,2	22,2	18,1	7,2	1,0	23,0
	1992	0,2	0,0	0,0	87,6	61,3	23,7	19,7	11,1	2,4	1,0	14,7
	1993	0,0	0,0	0,0	44,8	46,0	17,7	11,1	1,4	4,0	0,0	9,1
Outaouais	1990	0,7	9,7	0,0	186,6	136,0	35,8	13,5	7,7	4,9	0,0	29,4
	1991	0,0	0,0	0,0	43,9	38,9	21,5	6,8	0,0	0,0	0,0	8,4
	1992	0,0	0,0	0,0	65,9	38,9	7,2	6,8	0,0	0,0	0,0	8,4
	1993	0,0	0,0	0,0	54,9	19,4	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0,0	0,0	0,0	146,0	36,5	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7
	1991	0,0	0,0	0,0	32,4	18,2	41,8	12,2	0,0	0,0	0,0	8,6
	1992	0,0	0,0	0,0	48,7	0,0	13,9	0,0	13,5	8,9	0,0	7,4
	1993	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
Côte-Nord	1990	0,0	0,0	24,8	525,0	219,8	232,6	141,8	44,2	27,7	21,1	107,1
	1991	0,0	0,0	49,5	275,0	412,1	42,3	0,0	22,1	13,8	0,0	67,4
	1992	0,0	28,4	24,8	50,0	82,4	42,3	20,3	0,0	0,0	0,0	21,8
	1993	0,0	0,0	12,4	200,0	137,4	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1990	0,0	0,0	0,0	51,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière-Appalaches	1990	0,0	0,0	0,0	31,1	18,6	20,9	0,0	0,0	7,7	0,0	6,0
	1991	0,0	0,0	0,0	7,8	9,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	1,6
	1992	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	1,1
	1993	0,0	0,0	0,0	7,8	9,3	0,0	6,1	0,0	3,8	0,0	2,2
Laval	1990	1,9	0,0	0,0	49,6	55,2	14,9	13,3	7,4	4,2	5,6	13,2
	1991	0,6	0,0	0,0	79,3	18,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5
	1992	0,0	0,0	0,0	19,8	9,2	0,0	6,6	7,4	0,0	0,0	3,1
	1993	0,0	0,0	4,9	9,9	9,2	7,4	19,9	0,0	8,5	0,0	5,6
Lanaudière	1990	0,0	0,0	0,0	57,3	22,3	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
	1991	0,0	0,0	0,0	28,7	33,5	6,9	0,0	6,3	4,0	0,0	5,4
	1992	0,0	0,0	4,0	19,1	0,0	6,9	17,1	6,3	4,0	0,0	5,4
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	6,9	5,7	0,0	0,0	0,0	1,8
Laurentides	1990	0,0	0,0	0,0	34,1	81,0	23,8	0,0	5,9	0,0	5,7	10,0
	1991	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	5,9	10,4	0,0	0,0	0,0	2,6
	1992	0,0	7,2	0,0	8,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
	1993	0,0	0,0	7,3	34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1
Montérégie	1990	0,2	2,5	0,0	24,7	28,6	12,0	0,0	3,7	1,1	0,0	5,3
	1991	0,2	0,0	0,0	19,8	23,4	6,0	5,3	1,9	0,0	0,0	4,1
	1992	0,0	4,9	0,0	19,8	15,6	2,0	12,3	0,0	0,0	0,0	4,0
	1993	0,0	0,0	0,0	17,3	2,6	12,0	5,3	1,9	1,1	1,8	3,3
Kativik	1990	53,8	0,0	339,0	2105,3	4507,0	2465,8	1016,9	0,0	0,0	0,0	1103,6
	1991	26,9	169,5	0,0	1578,9	2816,9	1369,9	678,0	500,0	357,1	0,0	726,8
	1992	26,9	0,0	565,0	3947,4	5352,1	4109,6	339,0	0,0	0,0	0,0	1507,4
	1993	0,0	339,0	339,0	6842,1	7323,9	3835,6	2033,9	1000,0	0,0	0,0	2126,5
Terres Cries/Baie James	1990	0,0	0,0	0,0	631,6	487,8	259,7	327,9	0,0	0,0	0,0	169,5
	1991	0,0	0,0	0,0	421,1	243,9	259,7	0,0	0,0	0,0	0,0	96,9
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	731,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,6
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1990	1,2	1,8	2,6	85,0	89,8	36,2	13,6	7,1	4,2	2,6	18,8
	1991	0,4	1,4	2,0	51,8	52,8	25,8	9,9	7,1	2,8	0,6	11,7
	1992	0,1	1,8	2,2	41,8	39,2	15,8	10,5	4,7	1,2	0,3	8,6
	1993	0,0	0,9	1,5	35,4	33,2	16,1	8,3	2,0	1,8	0,3	7,3

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Bas St-laurent	1990	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	4
	1991	1	0	0	0	0	3	1	3	0	0	8
	1992	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	4
	1993	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	1	0	0	0	3	5	0	2	1	0	12
	1991	0	0	0	1	4	3	5	2	0	0	15
	1992	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	4
	1993	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Québec	1990	0	0	0	6	9	11	13	5	6	2	52
	1991	1	0	0	1	10	12	8	3	3	1	40
	1992	0	0	0	1	13	9	7	6	6	0	43
	1993	0	0	0	0	5	8	4	6	2	1	26
Mauricie/ Bois-Francs	1990	1	0	0	2	5	9	1	4	1	0	23
	1991	0	2	0	0	1	11	2	4	3	0	23
	1992	0	0	0	0	3	1	1	1	2	0	8
	1993	0	0	0	1	1	6	1	0	0	0	9
Estrie	1990	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	4
	1991	0	0	0	1	3	2	1	1	0	0	9
	1992	2	0	0	0	4	4	1	0	0	0	11
	1993	2	0	0	0	0	2	2	0	2	0	8
Montréal centre	1990	103	0	1	48	187	212	98	71	56	13	789
	1991	64	0	0	42	121	152	121	61	59	16	638
	1992	25	0	0	21	112	113	84	44	33	12	445
	1993	5	0	0	16	71	99	67	27	31	6	324
Outaouais	1990	0	0	0	3	12	5	3	4	0	1	29
	1991	0	0	1	1	3	1	1	1	1	0	9
	1992	0	0	0	2	2	5	3	2	1	0	15
	1993	0	0	0	3	6	2	1	1	0	1	14
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	0	0	2	6	3	0	1	0	0	12
	1991	0	0	0	2	4	3	0	2	0	0	11
	1992	0	0	0	2	0	3	2	1	1	0	10
	1993	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	5
Côte-Nord	1990	0	0	1	7	11	13	4	4	2	0	42
	1991	0	0	0	7	8	6	4	0	1	0	26
	1992	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1	6
	1993	0	0	0	3	4	2	1	0	1	0	11

Nombre de cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1990-1993) suite



Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1990	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	1991	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	1992	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1993	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Chaudière/Appalaches	1990	0	0	0	0	2	5	2	3	2	0	14
	1991	0	0	0	0	0	2	1	2	2	0	7
	1992	0	0	0	0	2	0	2	1	1	0	6
	1993	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	5
Laval	1990	0	0	0	0	1	9	2	3	0	2	17
	1991	6	0	0	1	3	9	3	3	2	0	27
	1992	0	0	0	0	5	2	2	2	1	0	12
	1993	0	0	0	0	3	1	2	1	3	0	10
Lanaudière	1990	0	0	0	4	2	5	2	1	0	0	14
	1991	0	0	0	1	2	4	1	1	0	0	9
	1992	0	0	0	0	3	2	1	1	2	1	10
	1993	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	4
Laurentides	1990	1	0	0	3	4	3	3	0	0	2	16
	1991	0	0	1	0	6	3	1	2	0	1	14
	1992	0	0	0	2	1	2	1	1	2	0	9
	1993	0	0	0	0	1	3	0	1	0	2	7
Montérégie	1990	3	0	0	13	20	26	4	7	2	2	78
	1991	2	0	0	7	19	20	15	3	6	4	77
	1992	1	0	0	3	10	8	6	2	6	2	38
	1993	2	0	0	4	8	10	8	3	3	2	41
Kativik	1990	1	0	0	7	15	7	2	3	0	0	35
	1991	3	0	0	5	8	8	6	7	1	0	38
	1992	0	0	1	7	11	7	3	3	2	0	35
	1993	0	0	1	3	1	9	7	1	1	1	24
Terres Cries/Baie James	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1990	111	0	2	96	280	315	135	110	70	22	1143
	1991	77	2	2	69	192	239	171	95	80	22	953
	1992	28	0	1	41	171	158	116	66	57	16	658
	1993	9	0	1	33	105	146	97	42	45	12	494

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)


Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Bas St-laurent	1990	1,0	0,0	0,0	0,0	16,8	14,0	0,0	11,1	0,0	0,0	4,0
	1991	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	11,1	33,4	0,0	0,0	7,9
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	22,3	11,1	0,0	0,0	4,0
	1993	0,0	0,0	0,0	13,4	50,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0,7	0,0	0,0	0,0	34,4	44,0	0,0	15,4	5,0	0,0	8,4
	1991	0,0	0,0	0,0	9,2	45,8	26,4	36,6	15,4	0,0	0,0	10,5
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	22,9	0,0	7,3	7,7	0,0	0,0	2,8
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,7
Québec	1990	0,0	0,0	0,0	28,8	38,7	41,0	46,2	19,0	13,0	6,7	17,5
	1991	0,3	0,0	0,0	4,8	43,0	44,7	28,4	11,4	6,5	3,3	13,5
	1992	0,0	0,0	0,0	4,8	55,9	33,5	24,9	22,7	13,0	0,0	14,5
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	29,8	14,2	22,7	4,3	3,3	8,7
Mauricie/ Bois-Francis	1990	0,4	0,0	0,0	12,8	35,1	50,3	4,9	19,9	3,0	0,0	10,1
	1991	0,0	13,7	0,0	0,0	7,0	61,5	9,8	19,9	9,0	0,0	10,1
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	5,6	4,9	5,0	6,0	0,0	3,5
	1993	0,0	0,0	0,0	6,4	7,0	33,5	4,9	0,0	0,0	0,0	3,9
Estrie	1990	0,0	0,0	0,0	10,7	10,6	9,6	8,9	0,0	0,0	0,0	3,0
	1991	0,0	0,0	0,0	10,7	31,8	19,2	8,9	9,0	5,2	0,0	6,9
	1992	1,5	0,0	0,0	0,0	42,4	38,5	8,9	0,0	0,0	0,0	8,4
	1993	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	17,7	0,0	10,5	0,0	6,1
Montréal centre	1990	12,2	0,0	1,1	95,9	267,9	241,2	119,6	101,9	48,9	14,5	93,3
	1991	7,6	0,0	0,0	83,9	173,4	172,9	147,7	87,6	51,5	17,8	75,4
	1992	3,0	0,0	0,0	41,9	160,5	128,5	102,5	63,2	28,8	13,4	52,6
	1993	0,6	0,0	0,0	32,0	101,7	112,6	81,8	38,8	27,1	6,7	38,3
Outaouais	1990	0,0	0,0	0,0	30,3	118,5	37,8	21,5	30,9	0,0	7,8	20,7
	1991	0,0	0,0	5,0	10,1	29,6	7,6	7,2	7,7	4,8	0,0	6,4
	1992	0,0	0,0	0,0	20,2	19,8	37,8	21,5	15,4	4,8	0,0	10,7
	1993	0,0	0,0	0,0	30,3	59,3	15,1	7,2	7,7	0,0	0,0	10,0
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0,0	0,0	0,0	32,4	109,5	41,8	0,0	13,5	0,0	0,0	14,7
	1991	0,0	0,0	0,0	32,4	73,0	41,8	0,0	27,0	0,0	0,0	13,5
	1992	0,0	0,0	0,0	32,4	0,0	41,8	24,4	13,5	8,9	14,9	12,3
	1993	0,0	0,0	0,0	16,2	18,2	13,9	0,0	13,5	8,9	0,0	6,1
Côte-Nord	1990	0,0	0,0	11,7	163,9	294,9	276,3	79,1	84,3	25,7	0,0	79,7
	1991	0,0	0,0	0,0	163,9	214,5	127,5	79,1	0,0	12,8	0,0	49,3
	1992	0,0	0,0	0,0	46,8	53,6	21,3	0,0	0,0	0,0	20,3	11,4
	1993	0,0	0,0	0,0	70,3	107,2	42,5	19,8	0,0	12,8	0,0	20,9

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	3,8
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	13,0	0,0	3,8
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
Chaudière/ Appalaches	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	34,8	12,1	18,5	7,4	0,0	7,7
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	6,1	12,3	7,4	0,0	3,8
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	12,1	6,2	3,7	0,0	3,3
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	12,1	6,2	3,7	0,0	2,7
Laval	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	65,5	13,5	23,3	0,0	11,5	11,0
	1991	3,9	0,0	0,0	9,4	26,2	65,5	20,3	23,3	8,8	0,0	17,4
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	14,6	13,5	15,5	4,4	0,0	7,7
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	7,3	13,5	7,8	13,2	0,0	6,5
Lanaudière	1990	0,0	0,0	0,0	35,4	21,8	37,7	11,9	6,3	0,0	0,0	8,3
	1991	0,0	0,0	0,0	8,9	21,8	30,2	5,9	6,3	0,0	0,0	5,4
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	15,1	5,9	6,3	7,7	6,3	6,0
	1993	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	15,1	5,9	0,0	0,0	0,0	2,4
Laurentides	1990	0,5	0,0	0,0	23,5	35,1	18,8	16,0	0,0	0,0	11,1	8,4
	1991	0,0	0,0	3,5	0,0	52,7	18,8	5,3	11,6	0,0	5,5	7,4
	1992	0,0	0,0	0,0	15,7	8,8	12,5	5,3	5,8	6,9	0,0	4,7
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	18,8	0,0	5,8	0,0	11,1	3,7
Montérégie	1990	0,5	0,0	0,0	30,4	49,9	53,1	7,2	13,3	2,1	3,5	13,2
	1991	0,3	0,0	0,0	16,4	47,4	40,8	27,1	5,7	6,4	7,0	13,0
	1992	0,2	0,0	0,0	7,0	24,9	16,3	10,8	3,8	6,4	3,5	6,4
	1993	0,3	0,0	0,0	9,4	19,9	20,4	14,4	5,7	3,2	3,5	6,9
Kativik	1990	25,1	0,0	0,0	1686,7	4054,1	1971,8	597,0	1333,3	0,0	0,0	877,2
	1991	75,2	0,0	0,0	1204,8	2162,2	2253,5	1791,0	3111,1	322,6	0,0	952,4
	1992	0,0	0,0	102,0	1686,7	2973,0	1971,8	895,5	1333,3	645,2	0,0	877,2
	1993	0,0	0,0	102,0	722,9	270,3	2535,2	2089,6	444,4	322,6	555,6	601,5
Terres Cries/ Baie James	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	206,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,9
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1990	3,3	0,0	0,4	41,6	117,1	105,6	42,2	37,3	14,1	6,6	33,9
	1991	2,3	0,9	0,4	29,9	80,3	80,1	53,5	32,3	16,2	6,6	28,2
	1992	0,8	0,0	0,2	17,8	71,5	53,0	36,3	22,4	11,5	4,8	19,5
	1993	0,3	0,0	0,2	14,3	43,9	48,9	30,3	14,3	9,1	3,6	14,6




Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes par groupe d'âge, Québec (1990-1993)




Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les femmes, Québec (1990-1993)



Taux d'incidence moyen des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1990-1993)



Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés de gonorrhée chez les hommes, Québec (1990-1993)




Nombre et pourcentage de cas déclarés de gonorrhée causée par un *Neisseria gonorrhoeae* producteur de pénicillinase (NGPP)¹ par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1991-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant		Hommes		Femmes		Total		
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
Bas St-Laurent	1991	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1992	0	0,0	1	12,5	0	0,0	1	8,3
	1993	0	0,0	1	25,0	1	100,0	2	40,0
Saguenay/Lac St-Jean	1991	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1992	0	0,0	2	50,0	1	100,0	3	60,0
	1993	0	0,0	0	0,0	1	14,3	1	11,1
Québec	1991	0	0,0	2	5,0	1	5,9	3	5,2
	1992	0	0,0	3	7,0	1	8,3	4	7,3
	1993	0	0,0	1	3,8	0	0,0	1	2,9
Nauricie/Bois-Francs	1991	0	0,0	2	8,7	2	12,5	4	10,3
	1992	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1993	0	0,0	1	11,1	0	0,0	1	8,3
Estrie	1991	0	0,0	1	11,1	0	0,0	1	7,7
	1992	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1993	0	0,0	1	12,5	0	0,0	1	8,3
Montréal centre	1991	1	7,7	68	10,7	33	15,4	102	11,8
	1992	0	0,0	32	7,2	17	12,4	49	8,4
	1993	0	0,0	14	4,3	8	9,4	22	5,4
Outaouais	1991	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1992	0	0,0	1	6,7	0	0,0	1	3,7
	1993	0	0,0	1	7,1	0	0,0	1	4,5
Abitibi/Témiscamingue	1991	0	0,0	1	9,1	0	0,0	1	5,6
	1992	0	0,0	1	10,0	1	16,7	2	12,5
	1993	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Côte-Nord	1991	0	0,0	1	3,8	0	0,0	1	1,7
	1992	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1993	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Région socio-sanitaire	Manquant		Hommes		Femmes		Total		
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1991	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1992	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1993	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Chaudière/Appalaches	1991	0	0,0	1	14,3	1	33,3	2	20,0
	1992	0	0,0	1	16,7	0	0,0	1	12,5
	1993	0	0,0	2	40,0	1	25,0	3	33,3
Laval	1991	0	0,0	2	7,4	0	0,0	2	5,1
	1992	1	100,0	0	0,0	1	20,0	2	11,1
	1993	0	0,0	0	0,0	2	22,2	2	10,5
Lanaudière	1991	0	0,0	1	11,1	1	11,1	2	11,1
	1992	0	0,0	1	10,0	0	0,0	1	5,3
	1993	0	0,0	0	0,0	1	33,3	1	14,3
Laurentides	1991	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1992	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1993	0	0,0	1	14,3	0	0,0	1	7,7
Montérégie	1991	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1992	0	0,0	1	2,6	1	4,2	2	3,2
	1993	0	0,0	1	2,4	2	10,0	3	4,9
Kativik	1991	4	66,7	11	28,9	5	18,5	20	28,2
	1992	1	33,3	13	37,1	17	30,4	31	33,0
	1993	0	0,0	2	8,3	2	2,5	4	3,8
Terres Cries/Baie-James	1991	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1992	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	1993	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Province de Québec	1991	5	20,8	90	9,4	43	10,5	138	9,9
	1992	2	20,0	56	8,5	39	12,9	97	10,0
	1993	0	0,0	25	5,1	18	7,0	43	5,7


¹: Les cas tabulés ici incluent les cas confirmés de NGPP par le LSPQ ainsi que les cas déclarés comme étant causés par une souche "B-Lactame positive" mais non-confirmée par le LSPQ (un seul cas, en 1993). De plus, certains doublons ne peuvent pas être éliminés de la banque MADO dépersonnalisée.



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	305	141	446
1991	0	268	155	423
1992	0	311	141	452
1993	0	314	128	442


Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1993)
Région du Bas-St-Laurent



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	3	0	3
1991	0	2	0	2
1992	0	1	1	2
1993	0	0	0	0


Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1993)
Région du Saguenay/Lac St-Jean



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	4	3	7
1991	0	3	3	6
1992	0	2	1	3
1993	0	4	5	9

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1993)
Région de Québec



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	60	24	84
1991	0	46	30	76
1992	0	62	27	89
1993	0	62	18	80



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	14	8	22
1991	0	10	3	13
1992	0	11	7	18
1993	0	8	0	8

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1993)
Région de l'Estrie



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	1	0	1
1991	0	5	2	7
1992	0	7	7	14
1993	0	19	9	28



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	118	47	165
1991	0	86	53	139
1992	0	128	47	175
1993	0	136	48	184

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1993)
Région de l'Outaouais



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	5	3	8
1991	0	10	5	15
1992	0	11	3	14
1993	0	4	2	6



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	5	7	12
1991	0	6	7	13
1992	0	4	0	4
1993	0	3	3	6

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1993)
Région de la Côte-Nord



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	4	0	4
1991	0	4	0	4
1992	0	1	2	3
1993	0	1	0	1



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	0	0	0
1991	0	1	0	1
1992	0	1	0	1
1993	0	1	0	1


Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1993)
Région Chaudière/Appalaches



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	12	7	19
1991	0	8	7	15
1992	0	11	8	19
1993	0	6	3	9


**Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1993)
Région de Laval**



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	17	12	29
1991	0	10	14	24
1992	0	13	7	20
1993	0	13	10	23

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1993)
Région de Lanaudière



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	7	1	8
1991	0	8	1	9
1992	0	5	4	9
1993	0	9	7	16



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	13	7	20
1991	0	24	5	29
1992	0	12	10	22
1993	0	10	5	15

Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1993)
Région de la Montérégie



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	42	22	64
1991	0	45	25	70
1992	0	42	16	58
1993	0	38	18	56



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	0	0	0
1991	0	0	0	0
1992	0	0	1	1
1993	0	0	0	0

**Taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë par sexe (1990-1993)
Région Terres Cries/Baie-James**



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	0	0	0
1991	0	0	0	0
1992	0	0	0	0
1993	0	0	0	0

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Bas St-Laurent	1990	0	3	0	3
	1991	0	2	0	2
	1992	0	1	1	2
	1993	0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0	4	3	7
	1991	0	3	3	6
	1992	0	2	1	3
	1993	0	4	5	9
Québec	1990	0	60	24	84
	1991	0	46	30	76
	1992	0	62	27	89
	1993	0	62	18	80
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0	14	8	22
	1991	0	10	3	13
	1992	0	11	7	18
	1993	0	8	0	8
Estrie	1990	0	1	0	1
	1991	0	5	2	7
	1992	0	7	7	14
	1993	0	19	9	28
Montréal centre	1990	0	118	47	165
	1991	0	86	53	139
	1992	0	128	47	175
	1993	0	136	48	184
Outaouais	1990	0	5	3	8
	1991	0	10	5	15
	1992	0	11	3	14
	1993	0	4	2	6
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	5	7	12
	1991	0	6	7	13
	1992	0	4	0	4
	1993	0	3	3	6
Côte-Nord	1990	0	4	0	4
	1991	0	4	0	4
	1992	0	1	2	3
	1993	0	1	0	1

Région socio-sanitaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Gaspésie/ Iles de la madeleine	1990	0	0	0	0
	1991	0	1	0	1
	1992	0	1	0	1
	1993	0	1	0	1
Chaudière/ Appalaches	1990	0	12	7	19
	1991	0	8	7	15
	1992	0	11	8	19
	1993	0	6	3	9
Laval	1990	0	17	12	29
	1991	0	10	14	24
	1992	0	13	7	20
	1993	0	13	10	23
Lanaudière	1990	0	7	1	8
	1991	0	8	1	9
	1992	0	5	4	9
	1993	0	9	7	16
Laurentides	1990	0	13	7	20
	1991	0	24	5	29
	1992	0	12	10	22
	1993	0	10	5	15
Montérégie	1990	0	42	22	64
	1991	0	45	25	70
	1992	0	42	16	58
	1993	0	38	18	56
Kativik	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	1	1
	1993	0	0	0	0
Terres Cries/ Baie-James	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Province de Québec	1990	0	305	141	446
	1991	0	268	155	423
	1992	0	311	141	452
	1993	0	314	128	442

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	Hommes	Femmes	Total	
Bas St-Laurent	1990	0,0	3,0	0,0	1,5
	1991	0,0	2,0	0,0	1,0
	1992	0,0	1,0	1,0	1,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0,0	2,7	2,0	2,4
	1991	0,0	2,0	2,0	2,0
	1992	0,0	1,3	0,7	1,0
	1993	0,0	2,7	3,4	3,0
Québec	1990	0,0	20,2	7,5	13,6
	1991	0,0	15,5	9,4	12,3
	1992	0,0	20,9	8,5	14,5
	1993	0,0	20,9	5,7	13,0
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0,0	6,1	3,4	4,7
	1991	0,0	4,4	1,3	2,8
	1992	0,0	4,8	2,9	3,9
	1993	0,0	3,5	0,0	1,7
Estrie	1990	0,0	0,8	0,0	0,4
	1991	0,0	3,8	1,5	2,6
	1992	0,0	5,3	5,1	5,2
	1993	0,0	14,5	6,6	10,4
Montréal centre	1990	0,0	13,9	5,1	9,3
	1991	0,0	10,2	5,7	7,8
	1992	0,0	15,1	5,1	9,9
	1993	0,0	16,1	5,2	10,4
Outaouais	1990	0,0	3,6	2,1	2,8
	1991	0,0	7,1	3,5	5,3
	1992	0,0	7,8	2,1	4,9
	1993	0,0	2,8	1,4	2,1
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0,0	6,1	8,9	7,5
	1991	0,0	7,4	8,9	8,1
	1992	0,0	4,9	0,0	2,5
	1993	0,0	3,7	3,8	3,7
Côte-Nord	1990	0,0	7,6	0,0	3,9
	1991	0,0	7,6	0,0	3,9
	1992	0,0	1,9	4,0	2,9
	1993	0,0	1,9	0,0	1,0

Région socio-sanitaire	Manquant	Hommes	Femmes	Total	
Gaspésie/ Iles de la madeleine	1990	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	1,9	0,0	0,9
	1992	0,0	1,9	0,0	0,9
	1993	0,0	1,9	0,0	0,9
Chaudière/ Appalaches	1990	0,0	6,6	3,8	5,2
	1991	0,0	4,4	3,8	4,1
	1992	0,0	6,0	4,3	5,2
	1993	0,0	3,3	1,6	2,4
Laval	1990	0,0	11,0	7,5	9,2
	1991	0,0	6,5	8,8	7,6
	1992	0,0	8,4	4,4	6,4
	1993	0,0	8,4	6,3	7,3
Lanaudière	1990	0,0	4,2	0,6	2,4
	1991	0,0	4,8	0,6	2,7
	1992	0,0	3,0	2,4	2,7
	1993	0,0	5,4	4,2	4,8
Laurentides	1990	0,0	6,9	3,7	5,3
	1991	0,0	12,7	2,6	7,6
	1992	0,0	6,3	5,2	5,8
	1993	0,0	5,3	2,6	3,9
Montérégie	1990	0,0	7,1	3,6	5,3
	1991	0,0	7,6	4,1	5,8
	1992	0,0	7,1	2,6	4,8
	1993	0,0	6,4	3,0	4,7
Kativik	1990	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	26,9	13,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/ Baie-James	1990	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1990	0,0	9,0	4,0	6,5
	1991	0,0	7,9	4,4	6,1
	1992	0,0	9,2	4,0	6,6
	1993	0,0	9,3	3,6	6,4

Nombre et taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par ancien territoire de DSC montréalais, année d'épisode et sexe (1990-1993)

DSC		Nombre de cas			
		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Lakeshore	1990	0	4	3	7
	1991	0	2	9	11
	1992	0	7	1	8
	1993	0	5	2	7
Verdun	1990	0	23	10	33
	1991	0	14	8	22
	1992	0	18	15	33
	1993	0	26	5	31
Maisonneuve-Rosemont	1990	0	34	8	42
	1991	0	25	19	44
	1992	0	33	14	47
	1993	0	24	13	37
Sainte-Justine	1990	0	3	0	3
	1991	0	5	3	8
	1992	0	3	1	4
	1993	0	8	4	12
Hôpital général de Montréal	1990	0	25	12	37
	1991	0	23	2	25
	1992	0	27	7	34
	1993	0	16	6	22
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1990	0	24	11	35
	1991	0	12	9	21
	1992	0	11	2	13
	1993	0	21	11	32
Saint-Luc	1990	0	5	3	8
	1991	0	5	3	8
	1992	0	29	7	36
	1993	0	36	7	43

DSC		Taux d'incidence			
		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Lakeshore	1990	0,0	3,3	2,4	2,8
	1991	0,0	1,7	7,1	4,5
	1992	0,0	5,8	0,8	3,2
	1993	0,0	4,2	1,6	2,8
Verdun	1990	0,0	27,1	10,5	18,3
	1991	0,0	16,5	8,4	12,2
	1992	0,0	21,2	15,8	18,3
	1993	0,0	30,6	5,3	17,2
Maisonneuve-Rosemont	1990	0,0	17,0	3,6	10,0
	1991	0,0	12,5	8,6	10,4
	1992	0,0	16,5	6,3	11,1
	1993	0,0	12,0	5,9	8,8
Sainte-Justine	1990	0,0	3,8	0,0	1,8
	1991	0,0	6,4	3,3	4,7
	1992	0,0	3,8	1,1	2,4
	1993	0,0	10,2	4,4	7,1
Hôpital général de Montréal	1990	0,0	27,6	12,3	19,7
	1991	0,0	25,4	2,1	13,3
	1992	0,0	29,8	7,2	18,1
	1993	0,0	17,7	6,2	11,7
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1990	0,0	15,3	6,1	10,4
	1991	0,0	7,6	5,0	6,2
	1992	0,0	7,0	1,1	3,9
	1993	0,0	13,4	0,0	9,5
Saint-Luc	1990	0,0	4,4	2,6	3,5
	1991	0,0	4,4	2,6	3,5
	1992	0,0	25,3	6,0	15,6
	1993	0,0	31,5	6,0	18,6

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Bas St-laurent	1990	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3
	1991	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
	1992	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	1	7
	1991	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	6
	1992	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3
	1993	0	0	1	2	1	1	2	1	1	0	0	9
Québec	1990	1	1	0	7	17	16	11	5	17	7	2	84
	1991	0	0	0	4	12	13	16	9	12	8	2	76
	1992	0	0	0	4	13	14	17	13	15	9	4	89
	1993	1	1	0	1	8	19	12	6	17	11	4	80
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0	0	0	1	1	4	5	2	3	2	4	22
	1991	1	0	0	0	0	3	1	4	2	0	2	13
	1992	1	0	0	0	5	5	2	3	2	0	0	18
	1993	0	0	0	0	1	0	2	2	3	0	0	8
Estrie	1990	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1991	0	1	0	0	1	2	3	0	0	0	0	7
	1992	0	0	0	0	3	0	1	1	7	2	0	14
	1993	0	0	0	2	3	4	4	6	9	0	0	28
Montréal centre	1990	3	1	0	9	30	43	30	21	15	8	5	165
	1991	1	1	1	9	22	32	28	12	18	11	4	139
	1992	0	0	0	12	20	36	30	28	27	16	6	175
	1993	2	1	1	12	28	30	31	24	28	16	11	184
Outaouais	1990	0	0	1	1	3	0	0	2	0	1	0	8
	1991	0	0	0	3	4	4	1	3	0	0	0	15
	1992	1	0	0	0	1	2	3	1	2	3	1	14
	1993	0	0	0	0	1	2	0	1	1	1	0	6
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	0	0	2	3	4	2	1	0	0	0	12
	1991	0	0	1	0	0	4	2	3	1	2	0	13
	1992	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4
	1993	0	0	0	2	2	0	1	0	1	0	0	6
Côte-Nord	1990	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4
	1991	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	4
	1992	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3
	1993	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
 Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1991	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	1992	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Chaudière/Appalaches	1990	0	1	0	3	3	0	4	1	4	1	2	19
	1991	0	0	0	3	2	1	4	2	2	1	0	15
	1992	1	0	1	4	0	7	2	1	1	2	0	19
	1993	0	0	0	0	1	4	1	0	2	1	0	9
Laval	1990	0	0	0	2	8	4	3	4	7	1	0	29
	1991	0	0	0	1	5	8	2	2	4	0	2	24
	1992	0	0	0	3	2	3	6	2	3	1	0	20
	1993	0	0	0	3	2	5	3	4	2	2	2	23
Lanaudière	1990	0	0	0	0	1	1	3	2	1	0	0	8
	1991	0	0	1	0	1	4	0	1	1	1	0	9
	1992	0	0	0	1	2	2	2	2	0	0	0	9
	1993	0	1	0	1	0	2	4	3	4	0	1	16
Laurentides	1990	0	0	0	1	5	4	3	2	3	2	0	20
	1991	0	0	0	1	4	3	12	2	3	3	1	29
	1992	1	0	0	2	4	1	4	5	3	0	2	22
	1993	0	0	0	4	1	0	4	0	2	4	0	15
Montérégie	1990	0	0	1	3	7	17	10	4	14	6	2	64
	1991	1	0	0	7	5	9	14	8	19	3	4	70
	1992	0	0	0	2	7	11	13	8	11	3	3	58
	1993	0	0	1	6	7	12	11	3	14	1	1	56
Kativik	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/Baie James	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1990	4	3	2	29	81	98	71	46	66	30	16	446
	1991	3	2	3	29	59	86	86	47	63	30	15	423
	1992	4	1	1	28	59	85	81	66	74	36	17	452
	1993	3	3	3	33	55	79	75	51	85	36	19	442

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Bas St-laurent	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	6,8	0,0	5,6	0,0	0,0	1,5	
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	1,0	
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	3,4	0,0	1,0	
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	8,8	0,0	3,9	2,5	3,7	2,4	
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	4,4	3,6	3,9	2,5	3,7	2,1	
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	2,5	0,0	1,0	
	1993	0,0	0,0	2,1	9,4	5,9	4,4	7,2	3,9	2,5	0,0	3,1	
Québec	1990	0,2	2,9	0,0	17,2	37,0	30,1	19,5	9,3	18,1	11,3	2,0	13,6
	1991	0,0	0,0	0,0	9,8	26,1	24,5	28,4	16,7	12,8	12,9	2,0	12,3
	1992	0,0	0,0	0,0	9,8	28,3	26,3	30,2	24,1	15,9	14,5	4,0	14,5
	1993	0,2	2,9	0,0	2,5	17,4	35,8	21,3	11,1	18,1	17,7	4,0	13,0
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0,0	0,0	0,0	3,3	3,6	11,2	12,2	5,0	4,5	4,3	4,9	4,7
	1991	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	2,4	10,0	3,0	0,0	2,4	2,8
	1992	0,2	0,0	0,0	0,0	17,9	14,0	4,9	7,5	3,0	0,0	0,0	3,9
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	4,9	5,0	4,5	0,0	0,0	1,7
Estrie	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	
	1991	0,0	5,7	0,0	0,0	5,4	9,5	13,1	0,0	0,0	0,0	2,6	
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	4,4	4,5	18,5	8,0	5,2	
	1993	0,0	0,0	0,0	10,8	16,2	19,1	17,5	27,0	23,7	0,0	10,4	
Montréal centre	1990	0,2	1,0	0,0	9,1	21,2	24,9	18,4	14,8	6,3	4,2	1,5	9,3
	1991	0,1	1,0	0,6	9,1	15,5	18,5	17,2	8,5	7,5	5,8	1,2	7,8
	1992	0,0	0,0	0,0	12,1	14,1	20,8	18,4	19,8	11,3	8,4	1,7	9,9
	1993	0,1	1,0	0,6	12,1	19,8	17,4	19,0	17,0	11,7	8,4	3,2	10,4
Outaouais	1990	0,0	0,0	2,5	5,2	14,7	0,0	0,0	7,7	0,0	3,9	0,0	2,8
	1991	0,0	0,0	0,0	15,7	19,6	14,7	3,5	11,6	0,0	0,0	0,0	5,3
	1992	0,4	0,0	0,0	0,0	4,9	7,4	10,4	3,9	4,9	11,7	2,9	4,9
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	7,4	0,0	3,9	2,4	3,9	0,0	2,1
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0,0	0,0	0,0	16,6	27,6	28,1	12,5	7,0	0,0	0,0	0,0	7,5
	1991	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	28,1	12,5	20,9	4,7	15,0	0,0	8,1
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	6,2	7,0	4,7	0,0	0,0	2,5
	1993	0,0	0,0	0,0	16,6	18,4	0,0	6,2	0,0	4,7	0,0	0,0	3,7
Côte-Nord	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	10,6	0,0	0,0	6,7	9,8	0,0	3,9
	1991	0,0	0,0	0,0	12,2	13,5	10,6	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
	1992	0,0	14,0	0,0	0,0	13,5	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	1,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,9
Chaudière/Appalaches	1990	0,0	4,0	0,0	11,5	13,3	0,0	12,1	3,1	7,6	3,0	5,2
	1991	0,0	0,0	0,0	11,5	8,9	3,5	12,1	6,2	3,8	3,0	4,1
	1992	0,3	0,0	1,7	15,3	0,0	24,5	6,1	3,1	1,9	6,0	5,2
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	14,0	3,0	0,0	3,8	3,0	2,4
Laval	1990	0,0	0,0	0,0	9,7	35,8	14,7	10,1	15,1	15,1	2,8	9,2
	1991	0,0	0,0	0,0	4,8	22,4	29,5	6,7	7,6	8,6	0,0	7,6
	1992	0,0	0,0	0,0	14,5	9,0	11,0	20,1	7,6	6,5	2,8	6,4
	1993	0,0	0,0	0,0	14,5	9,0	18,4	10,1	15,1	4,3	5,7	7,3
Lanaudière	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	3,6	8,7	6,3	2,0	0,0	2,4
	1991	0,0	0,0	1,9	0,0	5,5	14,5	0,0	3,2	2,0	3,2	2,7
	1992	0,0	0,0	0,0	4,6	11,0	7,2	5,8	6,3	0,0	0,0	2,7
	1993	0,0	3,9	0,0	4,6	0,0	7,2	11,6	9,5	7,9	0,0	4,8
Laurentides	1990	0,0	0,0	0,0	4,1	22,2	12,2	7,9	5,8	5,3	5,6	5,3
	1991	0,0	0,0	0,0	4,1	17,7	9,1	31,6	5,8	5,3	8,4	7,6
	1992	0,3	0,0	0,0	8,2	17,7	3,0	10,5	14,5	5,3	0,0	5,8
	1993	0,0	0,0	0,0	16,4	4,4	0,0	10,5	0,0	3,5	11,2	3,9
Montérégie	1990	0,0	0,0	0,6	3,6	8,9	17,2	8,9	3,8	7,5	5,2	5,3
	1991	0,1	0,0	0,0	8,4	6,4	9,1	12,5	7,6	10,2	2,6	5,8
	1992	0,0	0,0	0,0	2,4	8,9	11,1	11,6	7,6	5,9	2,6	4,8
	1993	0,0	0,0	0,6	7,2	8,9	12,1	9,8	2,8	7,5	0,9	4,7
Kativik	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,9	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/Baie James	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1990	0,1	0,7	0,2	6,4	17,1	16,4	11,0	7,8	6,6	4,4	6,5
	1991	0,0	0,4	0,3	6,4	12,4	14,4	13,4	7,9	6,3	4,4	6,1
	1992	0,1	0,2	0,1	6,2	12,4	14,2	12,6	11,1	7,4	5,3	6,6
	1993	0,0	0,7	0,3	7,3	11,6	13,2	11,7	8,6	8,5	5,3	6,4

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Bas St-laurent	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1992	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	
	1991	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	
	1992	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	1993	0	0	1	2	1	0	0	1	0	0	5	
Québec	1990	1	0	0	5	5	0	3	2	5	3	0	24
	1991	0	0	0	3	7	5	6	2	5	2	0	30
	1992	0	0	0	2	5	6	7	2	2	2	1	27
	1993	0	0	0	1	2	4	4	3	1	2	1	18
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0	0	0	1	0	1	3	0	0	0	3	8
	1991	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	3	
	1992	0	0	0	0	3	0	2	1	1	0	7	
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Estrie	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1991	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	
	1992	0	0	0	0	3	0	0	1	2	1	7	
	1993	0	0	0	0	1	1	0	6	1	0	9	
Montréal centre	1990	0	0	0	6	6	15	5	6	4	3	2	47
	1991	1	1	0	4	9	7	11	5	6	6	3	53
	1992	0	0	0	8	6	9	7	5	8	3	1	47
	1993	1	1	0	6	10	8	7	4	5	4	2	48
Outaouais	1990	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	3	
	1991	0	0	0	1	3	0	0	1	0	0	5	
	1992	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	
	1993	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	0	0	2	1	2	1	1	0	0	7	
	1991	0	0	1	0	0	2	1	1	0	2	7	
	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1993	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	
Côte-Nord	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1992	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/Appalaches	1990	0	0	0	2	2	0	1	0	0	2	7
	1991	0	0	0	2	0	1	3	0	1	0	7
	1992	0	0	0	3	0	3	1	0	1	0	8
	1993	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3
Laval	1990	0	0	0	2	3	3	2	0	2	0	12
	1991	0	0	0	1	4	5	2	1	1	0	14
	1992	0	0	0	2	1	0	1	1	2	0	7
	1993	0	0	0	3	0	3	0	3	1	0	10
Lanaudière	1990	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	1992	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	4
	1993	0	0	0	1	0	1	2	2	1	0	7
Laurentides	1990	0	0	0	1	0	3	0	1	1	0	7
	1991	0	0	0	1	0	0	4	0	0	0	5
	1992	1	0	0	1	0	0	1	3	2	0	10
	1993	0	0	0	2	1	0	1	0	1	0	5
Montérégie	1990	0	0	0	1	3	7	3	2	5	1	22
	1991	0	0	0	5	2	3	6	2	4	1	25
	1992	0	0	0	2	5	3	3	1	1	0	16
	1993	0	0	0	4	2	2	3	0	7	0	18
Kativik	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/Baie James	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1990	1	0	0	21	21	32	19	12	17	10	141
	1991	1	1	1	17	27	26	34	12	17	13	155
	1992	2	1	0	19	23	23	24	16	21	8	141
	1993	1	1	1	20	21	20	17	18	18	8	128

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Bas St-laurent	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	7,2	4,8
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	8,8	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	4,2	19,3	12,1	0,0	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0
Québec	1990	0,3	0,0	0,0	25,2	22,0	0,0	10,6	7,2	10,5	9,3	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	15,1	30,7	19,1	21,1	7,2	10,5	6,2	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	10,1	22,0	22,9	24,7	7,2	4,2	6,2	1,7
	1993	0,0	0,0	0,0	5,0	8,8	15,3	14,1	10,9	2,1	6,2	1,7
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	5,6	14,6	0,0	0,0	0,0	6,3
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	4,9	0,0	0,0	0,0	2,1
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	0,0	9,7	5,1	3,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estrie	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	9,0	10,6	7,8	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	9,4	0,0	53,9	5,3	0,0	0,0
Montréal centre	1990	0,0	0,0	0,0	12,2	8,4	17,7	6,2	8,4	3,2	3,0	1,0
	1991	0,1	2,0	0,0	8,1	12,5	8,3	13,6	7,0	4,8	6,0	1,4
	1992	0,0	0,0	0,0	16,3	8,4	10,6	8,6	7,0	6,4	3,0	0,5
	1993	0,1	2,0	0,0	12,2	13,9	9,5	8,6	5,6	4,0	4,0	1,0
Outaouais	1990	0,0	0,0	0,0	11,0	9,7	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	2,1
	1991	0,0	0,0	0,0	11,0	29,1	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0
	1992	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	4,9	0,0	2,1
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0,0	0,0	0,0	32,4	18,2	27,9	12,2	13,5	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	27,9	12,2	13,5	0,0	29,7	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	16,2	36,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	28,4	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/Appalaches	1990	0,0	0,0	0,0	15,6	18,6	0,0	6,1	0,0	0,0	6,4	3,8
	1991	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	7,0	18,2	0,0	6,0	0,0	3,8
	1992	0,0	0,0	0,0	23,3	0,0	20,9	6,1	0,0	6,0	0,0	4,3
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	7,0	0,0	0,0	3,8	0,0	1,6
Laval	1990	0,0	0,0	0,0	19,8	27,6	22,3	13,3	0,0	8,5	0,0	7,5
	1991	0,0	0,0	0,0	9,9	36,8	37,2	13,3	7,4	4,2	0,0	8,8
	1992	0,0	0,0	0,0	19,8	9,2	0,0	6,6	7,4	8,5	0,0	4,4
	1993	0,0	0,0	0,0	29,7	0,0	22,3	0,0	22,1	4,2	0,0	6,3
Lanaudière	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,6
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,6
	1992	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	5,7	12,6	0,0	0,0	2,4
	1993	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	6,9	11,4	12,6	4,0	0,0	4,2
Laurentides	1990	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	17,8	0,0	5,9	3,6	5,7	3,7
	1991	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	0,0	2,6
	1992	0,5	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	5,2	17,6	7,1	0,0	5,2
	1993	0,0	0,0	0,0	17,0	9,0	0,0	5,2	0,0	0,0	5,7	2,6
Montérégie	1990	0,0	0,0	0,0	2,5	7,8	14,0	5,3	3,7	5,4	1,8	3,6
	1991	0,0	0,0	0,0	12,4	5,2	6,0	10,5	3,7	4,3	1,8	4,1
	1992	0,0	0,0	0,0	4,9	13,0	6,0	5,3	1,9	1,1	1,8	2,6
	1993	0,0	0,0	0,0	9,9	5,2	4,0	5,3	0,0	7,5	0,0	3,0
Kativik	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/Baie James	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1990	0,0	0,0	0,0	9,5	8,9	10,7	5,9	4,0	3,4	2,9	4,0
	1991	0,0	0,5	0,2	7,7	11,5	8,7	10,5	4,0	3,4	3,8	4,4
	1992	0,1	0,5	0,0	8,6	9,8	7,7	7,4	5,4	4,2	2,3	4,0
	1993	0,0	0,5	0,2	9,1	8,9	6,7	5,2	6,1	3,6	2,3	3,6

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Bas St-laurent	1990	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	
	1991	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	
	1992	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	4	
	1991	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	
	1992	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
	1993	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	4	
Québec	1990	0	1	0	2	12	16	8	3	12	4	2	60
	1991	0	0	0	1	5	8	10	7	7	6	2	46
	1992	0	0	0	2	8	8	10	11	13	7	3	62
	1993	1	1	0	0	6	15	8	3	16	9	3	62
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0	0	0	0	1	3	2	2	3	2	1	14
	1991	1	0	0	0	0	2	0	4	2	0	1	10
	1992	1	0	0	0	2	5	0	2	1	0	0	11
	1993	0	0	0	0	1	0	2	2	3	0	0	8
Estrie	1990	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	1991	0	1	0	0	0	1	3	0	0	0	5	
	1992	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	7	
	1993	0	0	0	2	2	3	4	0	8	0	19	
Montréal centre	1990	3	1	0	3	24	28	25	15	11	5	3	118
	1991	0	0	1	5	13	25	17	7	12	5	1	86
	1992	0	0	0	4	14	27	23	23	19	13	5	128
	1993	1	0	1	6	18	22	24	20	23	12	9	136
Outaouais	1990	0	0	1	0	2	0	0	2	0	0	5	
	1991	0	0	0	2	1	4	1	2	0	0	10	
	1992	0	0	0	0	1	2	2	1	1	3	11	
	1993	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	4	
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	5	
	1991	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	6	
	1992	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4	
	1993	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	
Côte-Nord	1990	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4	
	1991	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4	
	1992	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	1993	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	

Nombre de cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite



Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1991	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
	1992	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
	1993	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
Chaudière/Appalaches	1990	0	1	0	1	1	0	3	1	4	1	0	12
	1991	0	0	0	1	2	0	1	2	2	0	0	8
	1992	1	0	1	1	0	4	1	1	1	1	0	11
	1993	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	0	6
Laval	1990	0	0	0	0	5	1	1	4	5	1	0	17
	1991	0	0	0	0	1	3	0	1	3	0	2	10
	1992	0	0	0	1	1	3	1	1	1	1	0	13
	1993	0	0	0	0	2	2	3	1	1	2	2	13
Lanaudière	1990	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	7
	1991	0	0	1	0	1	4	0	1	1	0	0	8
	1992	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	5
	1993	0	1	0	0	0	1	2	1	3	0	1	9
Laurentides	1990	0	0	0	0	5	1	3	1	2	1	0	13
	1991	0	0	0	0	4	3	8	2	3	3	1	24
	1992	0	0	0	1	4	1	3	2	1	0	0	12
	1993	0	0	0	2	0	0	3	0	2	3	0	10
Montérégie	1990	0	0	1	2	4	10	7	2	9	5	2	42
	1991	1	0	0	2	3	6	8	6	15	2	2	45
	1992	0	0	0	0	2	8	10	7	10	2	3	42
	1993	0	0	1	2	5	10	8	3	7	1	1	38
Kativik	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/Baie James	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1990	3	3	2	8	60	66	52	34	49	20	8	305
	1991	2	1	2	12	32	60	52	35	46	17	9	268
	1992	2	0	1	9	36	62	57	50	53	28	13	311
	1993	2	2	2	13	34	59	58	33	67	28	16	314



Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Bas St-laurent	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	14,0	0,0	11,1	0,0	0,0	3,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	2,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	8,8	0,0	7,7	5,0	0,0	2,8
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,7	0,0	7,5	2,1
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	1,4
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	14,7	7,7	0,0	0,0	2,8
Québec	1990	0,0	5,8	0,0	9,6	51,6	59,6	28,4	11,4	26,0	13,4	20,2
	1991	0,0	0,0	0,0	4,8	21,5	29,8	35,5	26,5	15,2	20,0	15,5
	1992	0,0	0,0	0,0	9,6	34,4	29,8	35,5	41,7	28,2	23,4	20,9
	1993	0,3	5,8	0,0	0,0	25,8	55,9	28,4	11,4	34,7	30,1	20,9
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	16,8	9,8	9,9	9,0	8,8	6,1
	1991	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	19,9	6,0	0,0	4,4
	1992	0,4	0,0	0,0	0,0	14,0	27,9	0,0	9,9	3,0	0,0	4,8
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	9,8	9,9	9,0	0,0	3,5
Estrie	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	1991	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	9,6	26,6	0,0	0,0	0,0	3,8
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	26,2	8,2	5,3
	1993	0,0	0,0	0,0	21,4	21,2	28,9	35,5	0,0	41,9	0,0	14,5
Montréal centre	1990	0,4	1,9	0,0	6,0	34,4	31,9	30,5	21,5	9,6	5,6	13,9
	1991	0,0	0,0	1,1	10,0	18,6	28,4	20,7	10,0	10,5	5,6	10,2
	1992	0,0	0,0	0,0	8,0	20,1	30,7	28,1	33,0	16,6	14,5	15,1
	1993	0,1	0,0	1,1	12,0	25,8	25,0	29,3	28,7	20,1	13,4	16,1
Outaouais	1990	0,0	0,0	5,0	0,0	19,8	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	3,6
	1991	0,0	0,0	0,0	20,2	9,9	30,2	7,2	15,4	0,0	0,0	7,1
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	15,1	14,3	7,7	4,8	23,5	7,8
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	7,7	4,8	0,0	2,8
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	36,5	27,9	12,2	0,0	0,0	0,0	6,1
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9	12,2	27,0	8,9	0,0	7,4
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	12,2	13,5	8,9	0,0	4,9
	1993	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	12,2	0,0	8,9	0,0	3,7
Côte-Nord	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	21,3	0,0	0,0	12,8	18,5	7,6
	1991	0,0	0,0	0,0	23,4	26,8	21,3	19,8	0,0	0,0	0,0	7,6
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	1,9


Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Gaspésie/Iles de la Madeleine	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	1,9	
Chaudière/Appalaches	1990	0,0	7,9	0,0	7,5	8,5	0,0	18,2	6,2	14,8	6,1	6,6	
	1991	0,0	0,0	0,0	7,5	17,1	0,0	6,1	12,3	7,4	0,0	4,4	
	1992	0,5	0,0	3,3	7,5	0,0	27,8	6,1	6,2	3,7	6,1	6,0	
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	6,1	0,0	3,7	6,1	0,0	3,3
Laval	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	7,3	6,8	31,0	22,1	5,7	0,0	11,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	21,8	0,0	7,8	13,2	0,0	10,4	6,5
	1992	0,0	0,0	0,0	9,4	8,7	21,8	33,8	7,8	4,4	5,7	0,0	8,4
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	14,6	20,3	7,8	4,4	11,5	10,4	8,4
Lanaudière	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	7,5	11,9	12,7	3,8	0,0	0,0	4,2
	1991	0,0	0,0	3,7	0,0	10,9	30,2	0,0	6,3	3,8	0,0	0,0	4,8
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	15,1	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	1993	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	7,5	11,9	6,3	11,5	0,0	5,2	5,4
Laurentides	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	6,3	16,0	5,8	6,9	5,5	0,0	6,9
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	35,1	18,8	42,7	11,6	10,3	16,6	4,3	12,7
	1992	0,0	0,0	0,0	7,8	35,1	6,3	16,0	11,6	3,4	0,0	0,0	6,3
	1993	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	16,0	0,0	6,9	16,6	0,0	5,3
Montérégie	1990	0,0	0,0	1,1	4,7	10,0	20,4	12,6	3,8	9,7	8,7	2,9	7,1
	1991	0,2	0,0	0,0	4,7	7,5	12,2	14,4	11,4	16,1	3,5	2,9	7,6
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	16,3	18,0	13,3	10,7	3,5	4,4	7,1
	1993	0,0	0,0	1,1	4,7	12,5	20,4	14,4	5,7	7,5	1,7	1,5	6,4
Kativik	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/Baie James	1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1990	0,1	1,3	0,4	3,5	25,1	22,1	16,3	11,5	9,9	6,0	1,7	9,0
	1991	0,1	0,4	0,4	5,2	13,4	20,1	16,3	11,9	9,3	5,1	2,0	7,9
	1992	0,1	0,0	0,2	3,9	15,1	20,8	17,8	17,0	10,7	8,4	2,8	9,2
	1993	0,1	0,9	0,4	5,6	14,2	19,8	18,1	11,2	13,5	8,4	3,5	9,3






Taux d'incidence moyen des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes par groupe d'âge, Québec (1990-1993)



Evolution par groupe d'âge des taux d'incidence des cas déclarés d'hépatite B aiguë chez les hommes, Québec (1990-1993)



Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe: Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	Hommes	Femmes	Total
Bas St-Laurent	1990	0	1	1
	1991	0	2	0
	1992	0	2	2
	1993	0	2	1
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0	14	14
	1991	1	16	15
	1992	0	17	15
	1993	0	15	4
Québec	1990	0	52	31
	1991	0	57	36
	1992	0	51	38
	1993	0	48	24
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0	29	10
	1991	0	12	15
	1992	0	26	14
	1993	0	20	15
Estrie	1990	0	11	4
	1991	0	28	14
	1992	1	22	16
	1993	0	19	12
Montréal centre	1990	2	315	256
	1991	1	336	296
	1992	2	384	306
	1993	0	359	263
Outaouais	1990	0	47	34
	1991	0	40	15
	1992	0	25	11
	1993	0	20	10
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	1	3
	1991	0	8	9
	1992	0	12	4
	1993	0	9	5
Côte-Nord	1990	0	13	9
	1991	0	5	9
	1992	0	9	5
	1993	0	8	3

Région socio-sanitaire	Manquant	Hommes	Femmes	Total
Gaspésie/ Iles de la madeleine	1990	0	0	0
	1991	0	1	0
	1992	0	1	1
	1993	0	3	0
Chaudière/ Appalaches	1990	0	16	9
	1991	0	10	12
	1992	0	10	5
	1993	0	10	3
Laval	1990	0	26	16
	1991	0	43	34
	1992	0	44	40
	1993	0	51	35
Lanaudière	1990	0	21	16
	1991	0	13	5
	1992	0	30	12
	1993	0	19	10
Laurentides	1990	0	42	28
	1991	0	28	16
	1992	0	43	10
	1993	0	44	13
Montérégie	1990	0	77	50
	1991	0	80	44
	1992	0	97	66
	1993	0	84	44
Kativik	1990	0	0	0
	1991	0	0	0
	1992	0	0	3
	1993	0	0	0
Terres Cries/ Baie-James	1990	0	0	0
	1991	0	0	0
	1992	0	0	0
	1993	0	0	0
Province de Québec	1990	2	665	481
	1991	2	679	520
	1992	3	773	548
	1993	0	711	442

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par ancien territoire de DSC
montréalais, année d'épisode et sexe (1990-1993)

DSC		Nombre de cas			
		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Lakeshore	1990	0	13	10	23
	1991	0	21	23	44
	1992	0	26	31	57
	1993	0	29	34	63
Verdun	1990	0	22	21	43
	1991	0	23	13	36
	1992	0	27	13	40
	1993	0	32	25	57
Maisonneuve- Rosemont	1990	0	71	56	127
	1991	1	69	50	120
	1992	1	84	49	134
	1993	0	63	39	102
Sainte- Justine	1990	0	40	42	82
	1991	0	47	60	107
	1992	0	59	83	142
	1993	0	53	54	107
Hôpital général de Montréal	1990	2	85	48	135
	1991	0	68	50	118
	1992	0	60	31	91
	1993	0	57	34	91
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1990	0	55	68	123
	1991	0	65	81	146
	1992	1	76	70	147
	1993	0	52	40	92
Saint-Luc	1990	0	29	11	40
	1991	0	43	19	62
	1992	0	52	29	81
	1993	0	73	37	110

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Bas St-laurent	1990	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	
	1991	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	
	1992	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	4	
	1993	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3	
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	1	0	0	0	2	2	4	3	9	4	28	
	1991	0	1	1	1	3	3	3	2	10	1	32	
	1992	0	0	0	0	1	4	4	7	11	3	32	
	1993	0	0	0	1	0	1	4	0	6	2	19	
Québec	1990	0	1	6	5	10	14	11	4	20	6	6	83
	1991	0	0	1	9	11	15	13	8	22	10	4	93
	1992	0	1	5	5	5	9	13	16	24	6	5	89
	1993	0	4	1	2	3	11	19	10	16	4	2	72
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0	0	1	0	4	5	6	9	9	2	3	39
	1991	0	0	2	0	1	3	6	5	6	2	2	27
	1992	0	0	0	2	2	7	7	7	10	4	1	40
	1993	0	0	1	3	4	2	6	4	8	3	4	35
Estrie	1990	0	0	0	0	0	6	1	2	5	1	0	15
	1991	0	1	1	0	5	7	6	2	12	3	5	42
	1992	0	0	2	1	1	2	2	10	15	3	3	39
	1993	1	0	1	2	4	4	2	3	8	5	1	31
Montréal centre	1990	28	3	10	15	56	96	102	82	82	60	39	573
	1991	23	9	12	22	59	126	115	68	93	57	49	633
	1992	12	5	14	28	58	128	114	104	131	52	46	692
	1993	5	8	14	20	69	102	102	81	119	64	38	622
Outaouais	1990	2	0	3	7	5	15	15	12	16	4	2	81
	1991	0	1	2	4	5	9	12	4	13	4	1	55
	1992	0	0	0	1	7	8	1	5	11	1	2	36
	1993	1	0	0	1	1	5	4	9	4	1	4	30
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	4
	1991	0	0	0	1	0	1	2	2	8	2	1	17
	1992	0	0	3	1	1	2	3	3	2	0	1	16
	1993	0	0	0	1	2	0	5	2	2	1	1	14
Côte-Nord	1990	0	0	0	1	4	2	4	3	5	3	0	22
	1991	0	0	2	1	0	2	4	0	1	2	2	14
	1992	0	1	1	0	0	1	2	4	3	1	1	14
	1993	0	1	0	0	2	2	0	1	3	1	1	11

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1992	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	1993	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
Chaudière/Appalaches	1990	0	0	0	1	4	4	3	10	2	1	25
	1991	0	0	1	0	3	1	2	4	4	2	22
	1992	0	0	1	1	0	1	4	3	5	0	15
	1993	0	1	0	1	0	1	1	2	4	2	13
Laval	1990	1	1	1	1	4	4	5	9	9	6	42
	1991	2	3	1	6	4	10	7	10	21	10	77
	1992	2	2	1	3	5	12	11	8	20	14	84
	1993	2	1	0	7	8	7	8	17	22	10	86
Lanaudière	1990	1	0	3	1	4	8	5	4	5	3	37
	1991	0	0	0	0	1	0	4	2	4	4	18
	1992	0	1	3	0	2	4	8	5	15	0	42
	1993	0	2	1	1	1	1	3	3	9	6	29
Laurentides	1990	2	0	1	4	12	19	9	6	15	1	70
	1991	0	0	3	2	4	3	11	9	9	2	44
	1992	1	1	0	4	5	5	10	10	12	1	53
	1993	1	1	4	3	0	12	6	8	12	6	57
Montérégie	1990	3	1	11	6	11	9	19	15	33	9	127
	1991	0	4	3	7	9	15	18	20	28	12	124
	1992	0	2	7	8	12	17	25	24	44	16	163
	1993	0	4	2	5	11	15	19	11	43	9	128
Kativik	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/Baie James	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1990	38	6	36	41	113	185	186	152	219	102	1148
	1991	25	19	29	53	105	195	203	138	233	113	1201
	1992	15	13	37	57	100	200	204	207	305	102	1324
	1993	10	22	25	47	105	164	180	151	258	114	1153

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total	
Bas St-laurent	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1992	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
	1993	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	1	0	0	0	1	2	1	0	4	3	2	14
	1991	0	0	1	0	1	1	2	2	5	1	2	15
	1992	0	0	0	0	1	4	2	1	6	1	0	15
	1993	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	4
Québec	1990	0	0	4	2	5	7	2	1	5	1	4	31
	1991	0	0	1	4	5	8	5	2	8	3	0	36
	1992	0	0	2	4	3	6	3	3	12	4	1	38
	1993	0	1	0	0	2	4	7	3	6	0	1	24
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0	0	0	0	1	1	1	5	1	0	1	10
	1991	0	0	1	0	1	2	1	4	4	2	0	15
	1992	0	0	0	2	2	1	2	3	2	2	0	14
	1993	0	0	0	3	2	2	0	3	3	1	1	15
Estrie	1990	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	4
	1991	0	1	0	0	3	2	2	0	3	0	3	14
	1992	0	0	0	1	1	1	0	3	8	1	1	16
	1993	0	0	1	2	2	0	2	1	1	2	1	12
Montréal centre	1990	12	1	2	7	31	59	43	29	28	24	20	256
	1991	9	6	5	14	30	74	57	30	33	16	22	296
	1992	4	1	7	18	31	71	62	46	33	18	15	306
	1993	3	5	6	9	41	47	50	27	39	25	11	263
Outaouais	1990	0	0	0	3	4	9	10	4	3	1	0	34
	1991	0	1	2	3	2	2	1	1	3	0	0	15
	1992	0	0	0	0	2	5	0	1	2	0	1	11
	1993	1	0	0	0	1	0	1	5	0	0	2	10
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3
	1991	0	0	0	1	0	0	1	1	5	0	1	9
	1992	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	4
	1993	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	5
Côte-Nord	1990	0	0	0	0	1	1	3	1	1	2	0	9
	1991	0	0	1	1	0	2	2	0	0	2	1	9
	1992	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	5
	1993	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	3

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les femmes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chaudière/Appalaches	1990	0	0	0	0	1	1	1	2	2	2	9
	1991	0	0	1	0	2	0	2	2	0	4	12
	1992	0	0	1	0	0	1	2	0	1	0	5
	1993	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	3
Laval	1990	0	0	0	1	0	2	4	3	3	3	16
	1991	1	0	0	5	1	7	4	2	8	6	34
	1992	1	2	0	3	5	7	6	3	6	3	40
	1993	0	1	0	4	4	2	4	6	11	3	35
Lanaudière	1990	1	0	0	1	1	5	2	4	1	1	16
	1991	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	5
	1992	0	1	0	0	2	1	2	1	4	0	12
	1993	0	2	1	0	0	0	2	2	2	1	10
Laurentides	1990	0	0	1	2	4	9	5	0	6	0	28
	1991	0	0	1	2	1	3	4	3	2	0	16
	1992	0	1	0	2	0	0	1	1	4	0	10
	1993	0	1	2	0	0	1	2	2	1	3	13
Montérégie	1990	2	1	6	2	5	2	12	6	11	1	50
	1991	0	3	0	3	4	7	6	7	9	2	44
	1992	0	1	2	2	7	7	13	11	18	2	66
	1993	0	2	0	3	5	3	6	4	13	4	44
Kativik	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/Baie James	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1990	16	2	13	19	54	102	84	55	66	39	481
	1991	10	11	13	33	51	108	88	54	83	36	520
	1992	5	7	14	34	55	104	96	75	97	32	548
	1993	4	13	10	22	58	63	79	53	79	39	442

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge,
Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire		Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Bas St-laurent	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1991	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	1992	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0	0	0	0	1	0	3	3	5	1	1	14
	1991	0	1	0	1	2	2	1	0	5	0	4	16
	1992	0	0	0	0	0	0	2	6	5	2	2	17
	1993	0	0	0	1	0	0	3	0	4	2	5	15
Québec	1990	0	1	2	3	5	7	9	3	15	5	2	52
	1991	0	0	0	5	6	7	8	6	14	7	4	57
	1992	0	1	3	1	2	3	10	13	12	2	4	51
	1993	0	3	1	2	1	7	12	7	10	4	1	48
Mauricie/ Bois-Francis	1990	0	0	1	0	3	4	5	4	8	2	2	29
	1991	0	0	1	0	0	1	5	1	2	0	2	12
	1992	0	0	0	0	0	6	5	4	8	2	1	26
	1993	0	0	1	0	2	0	6	1	5	2	3	20
Estrie	1990	0	0	0	0	0	3	1	2	4	1	0	11
	1991	0	0	1	0	2	5	4	2	9	3	2	28
	1992	0	0	1	0	0	1	2	7	7	2	2	22
	1993	1	0	0	0	2	4	0	2	7	3	0	19
Montréal centre	1990	16	2	8	8	25	37	58	53	54	35	19	315
	1991	14	3	7	8	29	51	58	38	60	41	27	336
	1992	7	4	7	10	27	57	52	58	98	33	31	384
	1993	2	3	8	11	28	55	52	54	80	39	27	359
Outaouais	1990	2	0	3	4	1	6	5	8	13	3	2	47
	1991	0	0	0	1	3	7	11	3	10	4	1	40
	1992	0	0	0	1	5	3	1	4	9	1	1	25
	1993	0	0	0	1	0	5	3	4	4	1	2	20
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
	1991	0	0	0	0	0	1	1	1	3	2	0	8
	1992	0	0	2	1	1	2	1	2	2	0	1	12
	1993	0	0	0	1	1	0	1	2	2	1	1	9
Côte-Nord	1990	0	0	0	1	3	1	1	2	4	1	0	13
	1991	0	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	5
	1992	0	0	0	0	0	1	1	3	3	1	0	9
	1993	0	1	0	0	2	0	0	1	2	1	1	8

Nombre de cas déclarés d'hépatite B chronique chez les hommes par région socio-sanitaire, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993) suite

Région socio-sanitaire	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Gaspésie/Îles de la Madeleine	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1992	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	1993	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	3
Chaudière/Appalaches	1990	0	0	0	0	3	3	1	8	0	1	16
	1991	0	0	0	0	1	1	0	3	4	1	10
	1992	0	0	0	1	0	0	2	3	4	0	10
	1993	0	0	0	0	0	1	1	2	4	1	10
Laval	1990	1	1	1	0	4	2	1	6	6	3	26
	1991	1	3	1	1	3	3	3	8	13	4	43
	1992	1	0	1	0	0	5	5	14	11	2	44
	1993	2	0	0	3	4	5	4	11	11	7	51
Lanaudière	1990	0	0	3	0	3	3	3	4	2	3	21
	1991	0	0	0	0	0	0	3	2	1	4	13
	1992	0	0	3	0	0	3	6	4	11	0	30
	1993	0	0	0	1	1	1	1	1	7	5	19
Laurentides	1990	2	0	0	2	8	10	4	6	9	1	42
	1991	0	0	2	0	3	0	7	6	7	2	28
	1992	1	0	0	2	5	5	9	9	8	1	43
	1993	1	0	2	3	0	11	4	6	11	3	44
Montérégie	1990	1	0	5	4	6	7	7	9	22	8	77
	1991	0	1	3	4	5	8	12	13	19	10	80
	1992	0	1	5	6	5	10	12	13	26	14	97
	1993	0	2	2	2	6	12	13	7	30	5	84
Kativik	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terres Cries/Baie James	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Province de Québec	1990	22	4	23	22	59	83	101	97	153	62	665
	1991	15	8	16	20	54	86	115	84	150	77	679
	1992	9	6	22	23	45	96	108	132	208	69	773
	1993	6	9	15	25	47	101	101	98	179	75	711


Nombre de cas déclarés d'hépatite B de type non-précisé par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Bas St-Laurent	1990	0	5	1	6
	1991	0	1	0	1
	1992	0	1	2	3
	1993	0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0	1	3	4
	1991	0	2	0	2
	1992	0	2	0	2
	1993	0	10	5	15
Québec	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	14	9	23
	1993	0	10	5	15
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0	4	1	5
	1991	0	4	0	4
	1992	0	1	2	3
	1993	0	1	0	1
Estrie	1990	0	12	5	17
	1991	0	1	3	4
	1992	0	1	1	2
	1993	0	4	0	4
Montréal centre	1990	7	325	133	465
	1991	1	269	116	386
	1992	0	246	113	359
	1993	2	215	103	320
Outaouais	1990	0	5	2	7
	1991	0	7	2	9
	1992	0	6	1	7
	1993	0	9	1	10
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	1	1
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Côte-Nord	1990	0	1	1	2
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0

Région socio-sanitaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Gaspésie/ Iles de la madeleine	1990	0	1	2	3
	1991	0	6	4	10
	1992	0	2	3	5
	1993	0	6	1	7
Chaudière/ Appalaches	1990	0	1	1	2
	1991	0	1	1	2
	1992	0	1	2	3
	1993	0	1	0	1
Laval	1990	0	1	0	1
	1991	0	1	0	1
	1992	0	0	1	1
	1993	0	0	1	1
Lanaudière	1990	0	3	1	4
	1991	0	0	0	0
	1992	0	10	5	15
	1993	0	11	8	19
Laurentides	1990	0	11	3	14
	1991	0	1	0	1
	1992	0	3	1	4
	1993	0	1	0	1
Montérégie	1990	0	8	1	9
	1991	0	8	5	13
	1992	0	15	6	21
	1993	0	29	13	42
Kativik	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	2	2
	1992	0	1	2	3
	1993	0	0	3	3
Terres Cries/ Baie-James	1990	0	1	0	1
	1991	0	0	1	1
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Province de Québec	1990	7	379	154	540
	1991	1	301	135	437
	1992	0	303	148	451
	1993	2	297	140	439

Nombre de cas déclarés d'hépatite B de type non-précisé par ancien territoire de DSC
montréalais, année d'épisode et sexe (1990-1993)


DSC		Nombre de cas			
		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Lakeshore	1990	0	8	3	11
	1991	0	0	0	0
	1992	0	4	3	7
	1993	0	7	1	8
Verdun	1990	0	3	0	3
	1991	0	0	0	0
	1992	0	1	0	1
	1993	0	0	1	1
Maisonneuve- Rosemont	1990	0	17	5	22
	1991	1	23	5	29
	1992	0	18	9	27
	1993	0	21	7	28
Sainte- Justine	1990	0	3	3	6
	1991	0	5	5	10
	1992	0	10	10	20
	1993	2	8	6	16
Hôpital général de Montréal	1990	1	7	8	16
	1991	0	11	10	21
	1992	0	17	8	25
	1993	0	29	19	48
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1990	0	8	4	12
	1991	0	7	11	18
	1992	0	25	22	47
	1993	0	36	32	68
Saint-Luc	1990	6	279	110	395
	1991	0	223	85	308
	1992	0	171	61	232
	1993	0	114	37	151



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	1	40	20	61
1991	0	44	20	64
1992	0	26	14	40
1993	0	13	6	19

Taux d'incidence des cas déclarés de syphilis récente par sexe (1990-1993)
Région de Québec



Nombre de cas déclarés


	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	6	2	8
1991	0	6	2	8
1992	0	5	1	6
1993	0	1	0	1



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	1	21	10	32
1991	0	27	18	45
1992	0	15	11	26
1993	0	6	3	9

Taux d'incidence des cas déclarés de syphilis récente par sexe (1990-1993)
Région de la Montérégie



Nombre de cas déclarés

	Manquant	Hommes	Femmes	Total
1990	0	6	5	11
1991	0	5	0	5
1992	0	1	1	2
1993	0	3	1	4

Nombre de cas déclarés de syphilis récente par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Bas St-Laurent	1990	0	1	0	1
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0	0	0	0
	1991	0	1	0	1
	1992	0	1	0	1
	1993	0	0	0	0
Québec	1990	0	6	2	8
	1991	0	6	2	8
	1992	0	5	1	6
	1993	0	1	0	1
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0	1	0	1
	1991	0	1	0	1
	1992	0	0	0	0
	1993	0	1	0	1
Estrie	1990	0	0	1	1
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	1	1
Montréal centre	1990	1	21	10	32
	1991	0	27	18	45
	1992	0	15	11	26
	1993	0	6	3	9
Outaouais	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	1	1	2
	1993	0	0	0	0
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	0	0	0
	1991	0	1	0	1
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Côte-Nord	1990	0	1	0	1
	1991	0	1	0	1
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0

Région socio-sanitaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Gaspésie/ Iles de la Madeleine	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Chaudière/ Appalaches	1990	0	2	0	2
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Laval	1990	0	2	0	2
	1991	0	2	0	2
	1992	0	2	0	2
	1993	0	1	1	2
Lanaudière	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Laurentides	1990	0	0	2	2
	1991	0	0	0	0
	1992	0	1	0	1
	1993	0	1	0	1
Montérégie	1990	0	6	5	11
	1991	0	5	0	5
	1992	0	1	1	2
	1993	0	3	1	4
Kativik	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Terres Cries/ Baie-James	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Province de Québec	1990	1	40	20	61
	1991	0	44	20	64
	1992	0	26	14	40
	1993	0	13	6	19

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe, Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire	Manquant	Hommes	Femmes	Total	
Bas St-Laurent	1990	0,0	1,0	0,0	0,5
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,7	0,0	0,3
	1992	0,0	0,7	0,0	0,3
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Québec	1990	0,0	2,0	0,6	1,3
	1991	0,0	2,0	0,6	1,3
	1992	0,0	1,7	0,3	1,0
	1993	0,0	0,3	0,0	0,2
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0,0	0,4	0,0	0,2
	1991	0,0	0,4	0,0	0,2
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,4	0,0	0,2
Estrie	1990	0,0	0,0	0,7	0,4
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,7	0,4
Montréal centre	1990	0,1	2,5	1,1	1,8
	1991	0,0	3,2	1,9	2,5
	1992	0,0	1,8	1,2	1,5
	1993	0,0	0,7	0,3	0,5
Outaouais	1990	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,7	0,7	0,7
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	1,2	0,0	0,6
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Côte-Nord	1990	0,0	1,9	0,0	1,0
	1991	0,0	1,9	0,0	1,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0

Région socio-sanitaire	Manquant	Hommes	Femmes	Total	
Gaspésie/ Iles de la madeleine	1990	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Chaudière/ Appalaches	1990	0,0	1,1	0,0	0,5
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Laval	1990	0,0	1,3	0,0	0,6
	1991	0,0	1,3	0,0	0,6
	1992	0,0	1,3	0,0	0,6
	1993	0,0	0,6	0,6	0,6
Lanaudière	1990	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Laurentides	1990	0,0	0,0	1,0	0,5
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,5	0,0	0,3
	1993	0,0	0,5	0,0	0,3
Montérégie	1990	0,0	1,0	0,8	0,9
	1991	0,0	0,8	0,0	0,4
	1992	0,0	0,2	0,2	0,2
	1993	0,0	0,5	0,2	0,3
Kativik	1990	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Terres Cries/ Baie-James	1990	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	0,0	0,0	0,0
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Province de Québec	1990	0,0	1,2	0,6	0,9
	1991	0,0	1,3	0,6	0,9
	1992	0,0	0,8	0,4	0,6
	1993	0,0	0,4	0,2	0,3

Nombre et taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par ancien territoire de DSC montréalais, année d'épisode et sexe (1990-1993)

DSC		Nombre de cas			
		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Lakeshore	1990	0	0	0	0
	1991	0	2	1	3
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Verdun	1990	0	3	0	3
	1991	0	3	2	5
	1992	0	2	4	6
	1993	0	1	1	2
Maisonnette- Rosemont	1990	0	0	1	1
	1991	0	2	0	2
	1992	0	1	1	2
	1993	0	0	0	0
Sainte- Justine	1990	0	0	2	2
	1991	0	4	4	8
	1992	0	3	0	3
	1993	0	1	1	2
Hôpital général de Montréal	1990	0	4	1	5
	1991	0	0	1	1
	1992	0	3	2	5
	1993	0	0	1	1
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1990	1	5	3	9
	1991	0	7	5	12
	1992	0	4	0	4
	1993	0	0	0	0
Saint-Luc	1990	0	9	3	12
	1991	0	9	5	14
	1992	0	2	4	6
	1993	0	4	0	4

DSC		Taux d'incidence			
		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Lakeshore	1990	0,0	0,0	0,0	0,0
	1991	0,0	1,7	0,8	1,2
	1992	0,0	0,0	0,0	0,0
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Verdun	1990	0,0	3,5	0,0	1,7
	1991	0,0	3,5	2,1	2,8
	1992	0,0	2,4	4,2	3,3
	1993	0,0	1,2	1,1	1,1
Maisonnette- Rosemont	1990	0,0	0,0	0,5	0,2
	1991	0,0	1,0	0,0	0,5
	1992	0,0	0,5	0,5	0,5
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Sainte- Justine	1990	0,0	0,0	2,2	1,2
	1991	0,0	5,1	4,4	4,7
	1992	0,0	3,8	0,0	1,8
	1993	0,0	1,3	1,1	1,2
Hôpital général de Montréal	1990	0,0	4,4	1,0	2,7
	1991	0,0	0,0	1,0	0,5
	1992	0,0	3,3	2,1	2,7
	1993	0,0	0,0	1,0	0,5
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1990	0,3	3,2	1,7	2,7
	1991	0,0	4,5	2,8	3,6
	1992	0,0	2,5	0,0	1,2
	1993	0,0	0,0	0,0	0,0
Saint-Luc	1990	0,0	7,9	2,6	5,2
	1991	0,0	7,9	4,3	6,1
	1992	0,0	1,7	3,4	2,6
	1993	0,0	3,5	0,0	1,7

Nombre de cas déclarés de syphilis récente par sexe, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Femmes												
1990	1	0	0	5	3	7	3	0	1	0	0	20
1991	0	0	0	3	4	5	4	1	1	0	2	20
1992	0	0	0	2	2	1	3	1	4	1	0	14
1993	0	0	0	0	3	0	0	2	0	1	0	6
Hommes												
1990	0	0	0	0	2	6	8	11	7	1	5	40
1991	1	0	0	1	6	7	4	10	9	5	1	44
1992	1	0	0	2	2	7	5	4	4	1	0	26
1993	0	0	0	0	0	2	1	1	7	1	1	13
Total												
1990	1	0	0	5	5	14	11	11	8	1	5	61
1991	1	0	0	4	10	12	8	11	10	5	3	64
1992	1	0	0	4	4	8	8	5	8	2	0	40
1993	0	0	0	0	3	2	1	3	7	2	1	19

Taux d'incidence (par 100 000) des cas déclarés de syphilis récente par sexe, année d'épisode et groupe d'âge, Québec (1990-1993)

	Manquant	0-4	5-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-49	50-59	60 et plus	Total
Femmes												
1990	0,0	0,0	0,0	2,3	1,3	2,3	0,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,6
1991	0,0	0,0	0,0	1,4	1,7	1,7	1,2	0,3	0,2	0,0	0,3	0,6
1992	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	0,3	0,9	0,3	0,8	0,3	0,0	0,4
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	0,0	0,2
Hommes												
1990	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	2,0	2,5	3,7	1,4	0,3	1,1	1,2
1991	0,0	0,0	0,0	0,4	2,5	2,3	1,3	3,4	1,8	1,5	0,2	1,3
1992	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	2,3	1,6	1,4	0,8	0,3	0,0	0,8
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	0,3	1,4	0,3	0,2	0,4
Total												
1990	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	2,3	1,7	1,9	0,8	0,1	0,5	0,9
1991	0,0	0,0	0,0	0,9	2,1	2,0	1,2	1,9	1,0	0,7	0,3	0,9
1992	0,0	0,0	0,0	0,9	0,8	1,3	1,2	0,8	0,8	0,3	0,0	0,6
1993	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,3	0,2	0,5	0,7	0,3	0,1	0,3

Nombre de cas déclarés de syphilis ancienne par région socio-sanitaire, année d'épisode et sexe. Québec (1990-1993)

Région socio-sanitaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Bas St-Laurent	1990	0	0	1	1
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Saguenay/ Lac St-Jean	1990	0	0	2	2
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	1	0	1
Québec	1990	0	1	0	1
	1991	0	1	0	1
	1992	0	1	5	6
	1993	0	2	1	3
Mauricie/ Bois-Francs	1990	0	0	0	0
	1991	0	1	1	2
	1992	0	1	1	2
	1993	0	1	2	3
Estrie	1990	0	1	1	2
	1991	0	0	0	0
	1992	0	1	0	1
	1993	0	1	0	1
Montréal centre	1990	1	35	27	63
	1991	2	39	32	73
	1992	0	51	40	91
	1993	0	38	17	55
Outaouais	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Abitibi/ Témiscamingue	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	1	1	2
	1993	0	1	1	2
Côte-Nord	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	2	2
	1993	0	0	1	1

Région socio-sanitaire		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Gaspésie/ Iles de la madeleine	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Chaudière/ Appalaches	1990	0	1	1	2
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Laval	1990	0	3	8	11
	1991	0	4	2	6
	1992	0	1	0	1
	1993	0	6	4	10
Lanaudière	1990	0	0	0	0
	1991	0	1	1	2
	1992	0	2	0	2
	1993	0	2	0	2
Laurentides	1990	0	2	0	2
	1991	0	2	0	2
	1992	0	0	0	0
	1993	0	1	0	1
Montérégie	1990	0	6	3	9
	1991	0	9	8	17
	1992	0	10	7	17
	1993	0	2	3	5
Kativik	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Terres Cries/ Baie-James	1990	0	0	0	0
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	0	0
Province de Québec	1990	1	49	43	93
	1991	2	57	44	103
	1992	0	68	56	124
	1993	0	55	29	84

Nombre de cas déclarés de syphilis ancienne par ancien territoire de DSC montréalais, année d'épisode et sexe (1990-1993)

DSC		Nombre de cas			
		Manquant	Hommes	Femmes	Total
Lakeshore	1990	0	1	0	1
	1991	0	0	0	0
	1992	0	0	0	0
	1993	0	0	1	1
Verdun	1990	1	7	8	16
	1991	0	6	4	10
	1992	0	9	8	17
	1993	0	6	6	12
Maisonneuve-Rosemont	1990	0	5	5	10
	1991	2	4	3	9
	1992	0	8	6	14
	1993	0	7	3	10
Sainte-Justine	1990	0	3	1	4
	1991	0	8	2	10
	1992	0	8	7	15
	1993	0	2	1	3
Hôpital général de Montréal	1990	0	9	5	14
	1991	0	2	7	9
	1992	0	3	1	4
	1993	0	2	2	4
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal	1990	0	6	6	12
	1991	0	13	12	25
	1992	0	19	14	33
	1993	0	16	4	20
Saint-Luc	1990	0	4	2	6
	1991	0	6	4	10
	1992	0	4	4	8
	1993	0	5	0	5

Annexe. Cadre d'analyse et de production utilisé

Le texte qui suit détaille le mécanisme mis en place pour traiter les données de façon récurrente à tous les douze mois. On y documente la méthode utilisée afin de susciter les commentaires (tout au moins de ceux qui pourraient ne pas trouver la lecture de ce qui suit trop obscure...).

L'analyse annuelle principale contiendra toujours une composante de comparaison avec les années de déclaration antérieures. L'analyse intérimaire (qui ne porte que sur les cas déclarés pendant les six premiers mois de chaque année ne contiendra que les nombres de cas déclarés par maladie pendant la période d'analyse avec une ventilation moins fine.

1. Programmation d'analyse (exécutée sur SAS/OS, Université Laval)

Le LSPO (par l'entremise de M. Florian Gosselin) extrait les données brutes qui nous intéressent et nous les transmet sur disquettes. Sur réception, les données sont directement transférées vers l'Université Laval. En effet, le centre de recherche de l'Hôpital du Saint-Sacrement bénéficie d'un lien physique direct (fibre optique) avec les ordinateurs centraux de l'université. La banque de données y est conservée sur ruban magnétique ainsi que sur "espace-disque" permanent. Les sorties informatiques des analyses exécutées (sur SAS/OS, SAS Institute Inc., Cary, NC, Etats-Unis) sont ensuite imprimées et importées à l'hôpital par télématique. Nous croyons, sans l'avoir testé, que la majorité des programmes écrits pourraient être exécutés sur microordinateur avec, toutefois, un temps de traitement plus long. Les seules analyses qui poseraient certainement des problèmes sont celles de tendance centrale sur l'âge. Les programmes utilisés sont énumérés ci-bas (exception faite des programmes de transmission de banques et de vérification de leur intégrité). Ils ont été écrits grâce au support de Mme. Myrto Mondor, biostatisticienne au centre de recherche de l'hôpital.

► **AGMOYMTS SAS A** Traitement de:
toutes les données.

Programme d'analyses centrales sur l'âge (procédures UNIVARIATE, TTEST et WILCOXON). Les résultats sont ceux du tableau de la page 19.

► **GLOBMTS SAS A** Traitement de:
toutes les données.

Programme qui génère (procédure TABULATE) les données provinciales ainsi que certaines autres données telles que celles des NGPP et des gonorrhées rectales et pharyngées. Ces données sont contenues dans la section texte (Word Perfect) des rapports.

► **RSSMTS93 SAS A** Traitement des:
gonorrhées et chlamydioses.

Programme qui génère (procédure TABULATE) les données du chiffrier à partir duquel, pour chaque région, sexe et maladie, on construit les séries de graphiques qui débutent les sections présentant la tabulation des données pour chaque maladie (p.e.: pages 20 à 37 du présent rapport). La même sortie sert à préparer les tableaux correspondants (p.e. pages 38 et 39).

- **DSCMTS93 SAS A** Traitement des:
gonorrhées, chlamydioses, hépatites B (aiguës, chroniques et non-précisées) et syphilis (récentes et anciennes).

Programme qui génère (procédure TABULATE) les données des chiffriers ventilant le nombre de cas de chaque maladie par sexe et par territoire de DSC ("RSR") de la région de Montréal seulement.

- **AGEMTS93 SAS A** Traitement des:
gonorrhées, chlamydioses, hépatites B (aiguës, chroniques et non-précisées) et syphilis (récentes et anciennes mais à Montréal seulement).

Programme qui génère (procédure TABULATE) les données du chiffrier ventilant la structure d'âge des cas déclarés par région socio-sanitaire pour chaque maladie.

2. Production des tableaux et des graphiques (Tabulation et graphisme en Excel 5,0)

Nous nous servons, sur Windows 3,1, de la version 5,0 du logiciel Excel (Microsoft Corporation, Redmon, WA, Etats-Unis). L'ordinateur utilisé est un "486 66 MHz". Cette puissance est nécessaire étant donné la taille des chiffriers à produire. Un ordinateur "486 33 Mhz" permet également de faire le travail mais moins rapidement. L'accès à une imprimante performante est nécessaire étant donné le nombre et la taille des tableaux et graphiques à imprimer.

La programmation SAS préparée produit des données "ASCII" qui sont tabulées dans un format compatible à l'importation directe en Excel, une fois importées par télématique. Partout où cela est pertinent, les chiffriers sont liés au chiffrier qui contient les données du recensement 91. Nous avons utilisé les données validées par le Ministère de la Santé et des Service Sociaux et avons évité de travailler avec les données de projection de population car leur marge d'erreur est trop importante quand on veut ventiler finement. La liaison des données MTS avec les données du recensement permet de produire facilement les données d'incidence. Les classeurs Excel qui génèrent le rapport contiennent souvent plus d'un chiffrier. Leur contenu est détaillé ci-bas.

► **RSSDCS91.XLS**

Ce classeur contient, ventilé dans une structure compatible à celle de l'analyse MTS, les données "Recensement 1991". (Ce classeur est lié à tous les chiffriers qui calculent des données d'incidence et produisent les graphiques correspondants).

Structure du classeur:

Un seul chiffrier (**RSSDSC91.XLS**) contient toutes les données ventilées par sexe, groupe d'âge, territoire de CLSC, ancien territoire de DSC et territoire de région socio-sanitaire.

► **AGMOYMTS.XLS**

Ce classeur contient les données de l'analyse de tendances centrales obtenues de "AGMOYMTS SAS A". Les données sont saisies, tabulées et imprimées en utilisant Excel (tableau de la page 19 du rapport 90-92).

Structure du classeur:

Un seul chiffrier (**AGMOYMTS.XLS**) contient ici toutes les données.

- ▶ **CHXLC.XLS**
- ▶ **GONOXLC.XLS**
- ▶ **HBAXLC.XLS**
- ▶ **SYRXLC.XLS**

Ces chiffriers contiennent les données produites par "RSSMETS93 SAS A". Elles y sont mises en page afin de générer les histogrammes que nous avons jugé pertinents de produire^(NT2). Les histogrammes ont été préparés sous forme de graphiques incorporés aux chiffriers correspondants.

▶ **RSSMETS93.XLS**

Ce classeur contient aussi les données produites par "RSSMETS93 SAS A". Il les synthétise sous forme de tableaux spécifiques à chaque maladie.

Structure du classeur:

RSSCHL93.XLS (données des chlamydioses)
RSSGON93.XLS (données des gonorrhées)
RSSHBA93.XLS (données des hépatites B aiguës)
RSSHBC93.XLS (données des hépatites B chroniques)
RSSHBN93.XLS (données des hépatites B de type non-précisé)
RSSSYR93.XLS (données des syphilis récentes)
RSSSYA93.XLS (données des syphilis anciennes)

▶ **DSCMETS93.XLS**

Ce classeur contient les données produites par "DSCMETS93 SAS A". Le classeur produit les tableaux qui, pour chaque maladie, donnent le nombre et le taux d'incidence (lorsque pertinent) des cas déclarés par sexe et par ancien DSC montréalais.

Structure du classeur:

DSCCHL93.XLS (données des chlamydioses)
DSCGON93.XLS (données des gonorrhées)
DSCHBA93.XLS (données des hépatites B aiguës)
DSCHBC93.XLS (données des hépatites B chroniques)
DSCHBN93.XLS (données des hépatites B de type non-précisé)
DSCSYR93.XLS (données des syphilis récentes)
DSCSYA93.XLS (données des syphilis anciennes)

▶ **AGEMTS.XLS**

Ce classeur contient les données produites par "AGEMTS SAS A". Il génère donc les tableaux donnant la ventilation des cas déclarés par maladie et groupe d'âge. Chacun des chiffriers contient le nombre et le taux d'incidence (si pertinent) des cas déclarés au total, chez les femmes et chez les hommes et cela, par région socio-sanitaire.

Structure du classeur:

AGECHLAM.XLS (données des chlamydioses)
AGEGONO.XLS (données des gonorrhées)
AGEHBA.XLS (données des hépatites aiguës)
AGEHBC.XLS (données des hépatites B chroniques)
AGEHBNP.XLS (données des hépatites B de type non-précisé)
AGESYPHR.XLS (données des syphilis récentes)
AGESYPHA.XLS (données des syphilis anciennes)

I 9714 E-642
1990-93 Parent, R. et al.

ex.2

Analyse des cas de gonorrhée, de
chlamydirose, d'infection par le
virus de l'hépatite B et de sy-
philitis déclarés au Québec par
année civile 1990-1993.

I 9714
1990-93

ex.2

