


INDICATEURS SOCIOSANITAIRES

LE QUÉBEC ET SES RÉGIONS



S A N T É P U B L I Q U E



COLLECTION

analyses et surveillance

4

Québec 

INDICATEURS SOCIOSANITAIRES LE QUÉBEC ET SES RÉGIONS

INSTITUT NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC
CENTRE DE DOCUMENTATION
MONTRÉAL

MICHEL PAGEAU,

RRSSS de Québec, Direction de la santé publique

MARC FERLAND,

RRSSS de Québec, Direction de la santé publique

ROBERT CHOINIÈRE,

RRSSS de Montréal-Centre, Direction de la santé publique

YVES SAUVAGEAU,

RRSSS de la Montérégie, Direction de la santé publique

Mai 1997



Pour tout renseignement concernant le contenu de ce document,
s'adresser au :

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction générale de la santé publique
1075, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)
G1S 2M1

Cette publication est disponible au coût de 19.95 \$ auprès des publications du Québec.

Recherche et rédaction :

Michel Pageau, RRSSS de Québec, Direction de la santé publique

Marc Ferland, RRSSS de Québec, Direction de la santé publique

Robert Choinière, RRSSS de Montréal-Centre, Direction de la santé publique

Yves Sauvageau, RRSSS de la Montérégie, Direction de la santé publique

Collaboration spéciale :

Serge Chevalier, RRSSS de Montréal-Centre, Direction de la santé publique

Citation suggérée : PAGEAU, M., FERLAND, M., CHOINIÈRE, R., SAUVAGEAU, Y. (1997). *Indicateurs sociosanitaires : Le Québec et ses régions*, Québec, MSSS.

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec, 1997
ISBN 2-551-17723-5

© Gouvernement du Québec

NOTE : Le genre masculin est utilisé dans ce document uniquement dans le but d'alléger le texte et il peut aussi bien désigner les femmes que les hommes.

AVANT-PROPOS


En raison de son mandat, la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux doit notamment développer et mettre à jour les connaissances sur l'état de santé et de bien-être de la population et ses déterminants, en assurer la surveillance et en informer la population. Par ailleurs, les directeurs régionaux de la santé publique sont responsables, selon la loi, d'informer la population de l'état de santé général des individus qui la composent, des problèmes de santé prioritaires, des groupes les plus vulnérables et des principaux facteurs de risque. Voilà à quels mandats *Indicateurs sociosanitaires : Le Québec et ses régions* apporte une réponse.

Ce document présente, pour l'ensemble du Québec et pour chacune de ses 18 régions sociosanitaires, la méthode de calcul et la description de 60 indicateurs couvrant différents domaines de la santé publique. Il vise un large public et s'adresse autant aux personnes œuvrant dans le domaine de la santé publique, décideurs, intervenants, chercheurs, qu'à celles dont l'intérêt pour les indicateurs sociosanitaires est ponctuel. Cet ouvrage se veut un outil utile à la fois pour l'analyse, la planification, la prise de décision et l'évaluation.

La particularité de ce document est de réunir des données provenant de plus de 25 sources différentes, de couvrir un large spectre du domaine de la santé publique, de rendre les résultats disponibles pour l'ensemble du Québec et pour chacune de ses 18 régions sociosanitaires et d'utiliser des tests statistiques qui permettent de mieux faire ressortir les régions se démarquant le plus de l'ensemble du Québec.

Je remercie tous ceux et celles qui ont rendu possible la publication de cet ouvrage et particulièrement ses auteurs. Ils ont fait montre de persévérance et de professionnalisme pour mener à terme cet ambitieux projet et pour en faire un outil de référence indispensable. Je souhaite sincèrement que ce document soit très utile; les connaissances qu'il réunit devraient en effet soutenir efficacement l'amélioration de la santé et du bien-être des Québécoises et Québécois.

La sous-ministre adjointe
à la santé publique,

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Christine Colin

REMERCIEMENTS

Les auteurs tiennent à remercier les personnes et les organismes qui ont contribué à la préparation de ce document.

Denis L'Heureux, directeur de la Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, **Gaétan Bibeau**, chef du Service du portrait et de la surveillance de la santé et du bien-être, **Odette Laplante**, de la Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, et **Denis Drouin**, directeur adjoint de la Direction de la santé publique à la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec, nous ont appuyé et conseillé tout au long du projet.

Diane Careau, **Marcelle Boissinot**, **Linda Lapointe** et **Gisèle Bergeron**, de la Direction de la santé publique de la RRSSS de Québec, ont assuré le secrétariat et la mise en page du document.

Lecture du document

Aline Bégin

MSSS — Direction de la protection de la santé publique

Gaétan Bibeau

MSSS — Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être

Jean-Pierre Courteau

RRSSS de l'Outaouais — Direction de la santé publique

Desmond Dufour

MSSS — Direction de la prévention et de l'éducation sociosanitaire

Odette Laplante

MSSS — Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être

Jacques Locas

MSSS — Direction de la promotion de la santé et du bien-être

Danielle St-Laurent

MSSS — Direction de l'analyse des déterminants

Marie-France Veilleux

RRSSS de la Chaudière-Appalaches — Direction de la santé publique

Contributions à certaines fiches

Robert Arcand

RRSSS de Montréal-Centre — Direction de la santé publique

Nathalie Audet

Santé Québec

Suzie Bélanger

Ministère de la Sécurité publique — Service des systèmes d'information

Jeanine Bustros

Statistique Canada — Division des statistiques sur la santé

Jacques Carpentier

Ministère des Affaires municipales — Service du contrôle budgétaire

Carole Chamberland

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST)

Manon Côté

RRSSS de Québec — Direction de la santé publique

Nathalie Madore

Régie des rentes du Québec — Direction de l'évaluation et de la révision

Josée Payette

RRSSS de la Montérégie — Direction de la santé publique

Gilles Pelletier

MSSS — Direction générale de la planification et de l'évaluation

Pierre Provencher

RRSSS de Montréal-Centre — Direction de la programmation et de la coordination

Madeleine Rochon

MSSS — Direction générale de la planification et de l'évaluation

Guy Sanfaçon

Centre Anti-Poison du Québec

Marc-André St-Pierre

MSSS — Direction générale de la planification et de l'évaluation

Lyne Vézina

Société de l'assurance automobile du Québec — Service de la statistique et de l'information corporative

TABLE DES MATIÈRES

	Page
AVANT-PROPOS.....	iii
REMERCIEMENTS.....	v
TABLE DES MATIÈRES.....	vii
INTRODUCTION.....	1
PARTIE I – MÉTHODOLOGIE	3
PARTIE II – FICHES DESCRIPTIVES.....	17
1. DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ.....	19
ENVIRONNEMENT	
<i>Environnement physique et écologie</i>	
1 Proportion de la population desservie par des équipements de collecte sélective.....	22
2 Proportion de la population desservie par des installations d'épuration des eaux usées.....	24
3 Taux de véhicules automobiles.....	26
<i>Environnement social</i>	
Indicateurs démographiques	
4 Répartition de la population selon l'âge et le sexe	28
5 Taux d'accroissement de la population	30
6 Taux de fécondité selon l'âge	32
Indicateurs sociodémographiques	
7 Proportion de la population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais.....	34
8 Proportion d'immigrants.....	36
9 Proportion de familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans.....	38
10 Proportion de la population vivant seule.....	40
11 Proportion de la population ayant déménagé.....	42

Indicateurs socioéconomiques

12	Proportion de la population ayant moins de neuf ans de scolarité	44
13	Proportion de naissances vivantes de mères faiblement scolarisées.....	46
14	Proportion de la population inoccupée	48
15	Taux de chômage	50
16	Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu	52
17	Proportion d'assistés sociaux.....	54

COMPORTEMENTS, HABITUDES DE VIE ET FACTEURS DE RISQUE

18	Proportion de fumeurs réguliers.....	56
19	Proportion de la population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine	58
20	Proportion de la population n'ayant jamais consommé de drogues illicites	60
21	Proportion de la population présentant un excès de poids	62
22	Proportion des occupants de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue.....	64
23	Proportion de naissances de faible poids.....	66
24	Taux de grossesses à l'adolescence	68
25	Proportion de femmes ayant subi un test de Pap.....	70
26	Proportion de femmes ayant subi une mammographie.....	72
27	Proportion de la population présentant un niveau élevé de détresse psychologique	74
28	Proportion de la population présentant des idées suicidaires sérieuses.....	76
29	Proportion de la population insatisfaite de sa vie sociale	78
30	Taux de crimes contre la personne	80

ORGANISATION DES SOINS

31	Nombre de lits et de places selon les catégories d'établissement.....	82
32	Nombre d'habitants par professionnel de la santé selon le type	84
33	Dépenses <i>per capita</i> consacrées au domaine de la santé et des services sociaux.....	86
34	Durée moyenne d'hospitalisation selon le diagnostic	88
35	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire (MADO) évitables par la vaccination	90

2. ÉTAT DE SANTÉ 93**ÉTAT DE SANTÉ SUBJECTIF**

36	Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé.....	96
37	Proportion de la population ayant au moins un problème de santé.....	98
38	Prévalence des principaux problèmes de santé.....	100

ÉTAT DE SANTÉ OBJECTIVÉ*Morbidité extra-hospitalière*

39	Taux de lésions professionnelles déclarées et indemnisées	102
40	Taux d'intoxication	104

41 Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire.....	106
<i>Morbidité hospitalière</i>	
42 Taux d'hospitalisation selon le diagnostic	108
43 Taux d'incidence du cancer	110
<i>Mortalité</i>	
44 Espérance de vie	112
45 Taux de mortalité infantile.....	114
46 Taux de mortalité périnatale.....	116
47 Taux de mortalité selon la cause	118
48 Taux de mortalité par suicide	120
49 Espérance de vie en bonne santé.....	122
50 Taux des années potentielles de vie perdues	124
51 Taux de victimes d'accidents de véhicules routiers.....	126
3. CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ.....	129
INCAPACITÉ	
52 Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle.....	132
53 Proportion de la population ayant une incapacité à long terme	134
54 Proportion d'enfants handicapés.....	136
UTILISATION DES SERVICES	
55 Taux de consultations médicales	138
56 Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic	140
57 Taux de césarienne	142
58 Taux de pontages coronariens.....	144
CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS	
59 Proportion de la population ayant consommé trois classes de médicaments et plus	146
60 Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus.....	148
PARTIE III – SYNTHÈSE RÉGIONALE.....	151
Région du Bas-Saint-Laurent (01).....	152
Région du Saguenay—Lac-Saint-Jean (02)	154
Région de Québec (03).....	156
Région de la Mauricie—Bois-Francs (04).....	158
Région de l'Estrie (05).....	160
Région de Montréal-Centre (06).....	162
Région de l'Outaouais (07).....	164
Région de l'Abitibi-Témiscamingue (08)	166
Région de la Côte-Nord (09)	168
Région du Nord-du-Québec (10)	170
Région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine (11)	172

Région de la Chaudière-Appalaches (12).....	174
Région de Laval (13).....	176
Région de Lanaudière (14).....	178
Région des Laurentides (15).....	180
Région de la Montérégie (16).....	182
Région du Nunavik (17).....	184
Région des Terres-Cries-de-la-Baie-James (18).....	186
PARTIE IV – TABLEAU DE BORD	189
BIBLIOGRAPHIE.....	201
ANNEXE	
SOURCES DES DONNÉES UTILISÉES DANS LES GRAPHIQUES ET LES TABLEAUX.....	207

INTRODUCTION

Le projet ayant mené à la publication du présent ouvrage s'inscrit dans le cadre des activités de connaissance et de surveillance de l'état de santé de la population du réseau de la santé publique du Québec. Il représente une application pratique, sous forme de portrait statistique, d'un document paru en 1995 sous le titre *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, préparé par les mêmes auteurs pour le compte de l'Institut canadien d'information sur la santé. Ce document de nature plutôt théorique visait à établir un consensus canadien autour de définitions, de méthodes de calcul et de modes d'utilisation de 60 indicateurs sociosanitaires. Par le passé, d'autres travaux ont aussi porté sur les indicateurs sociosanitaires; parmi ceux-ci, on retrouve le *Guide d'utilisation de 40 indicateurs sociosanitaires* (Chevalier, Choinière, Bernier, Sauvageau, Masson et Cadieux, 1993), le *Contenu informationnel du Système d'information en santé communautaire* (SISC, 1993) et la *Liste des indicateurs sociosanitaires pour le réseau des DSC* (Choinière, Malenfant et Sauvageau, 1990).

La présente publication s'apparente également aux travaux du MSSS sur les indicateurs réalisés dans le cadre de la Politique de la santé et du bien-être du Québec (MSSS, 1995a et b) et de l'allocation interrégionale des ressources (Pampalon, Saucier, Berthiaume, Ferland, Couture, Caris, Fortin, Lacroix et Kirouac, 1995). Elle rejoint enfin les différentes études sur l'état de santé de la population du Québec réalisées à partir de sources bien déterminées. Parmi ces études, mentionnons les productions tirées des enquêtes de Santé Québec (MSSS, 1988; Pampalon, Gauthier, Raymond et Beaudry, 1990; Santé Québec, 1995), ainsi que certains travaux sur la mortalité ou les hospitalisations (Lafontaine, 1987a et b; Pampalon 1985 et 1986; Choinière, Robitaille, Dorval et Sauvageau, 1993).

Le document est divisé en quatre parties. La première fait un survol des considérations méthodologiques relatives à l'exploitation des sources de données, au modèle de classification des indicateurs, aux méthodes de calcul et à l'utilisation de tests statistiques.

La deuxième partie porte sur les 60 indicateurs. Chaque indicateur est présenté sur deux pages comprenant une section analytique et quatre éléments graphiques. Dans la section analytique, on retrouve la définition de l'indicateur, la méthode de calcul, les sources de données et

l'interprétation des résultats. D'un indicateur à l'autre, les quatre éléments graphiques fournissent en général le même type d'information. Les deux premiers éléments graphiques décrivent l'indicateur pour le Québec dans son ensemble. Le premier illustre l'évolution de l'indicateur au cours des dernières années tandis que le deuxième présente une ventilation selon certaines caractéristiques, dont principalement l'âge et le sexe. Le troisième élément fournit la valeur de l'indicateur selon la région pour la période la plus récente. Le dernier élément décrit plus en détail les résultats à l'échelle des régions à partir soit de l'évolution de l'indicateur dans le temps, soit d'une ventilation selon une variable particulière. De plus, des notes méthodologiques ont été ajoutées à la fin de chacune des fiches.

La troisième partie est consacrée aux synthèses régionales des 60 indicateurs. Pour chaque région, on présente sur deux pages un court texte décrivant les faits saillants de cette région ainsi qu'un tableau fournissant les valeurs les plus récentes des 60 indicateurs pour la région et l'ensemble du Québec.

La quatrième et dernière partie est constituée d'un tableau de bord permettant de comparer les valeurs les plus récentes des 60 indicateurs pour le Québec et chacune des 18 régions.

PARTIE

1

MÉTHODOLOGIE

MÉTHODOLOGIE

Dans cette partie sont présentées brièvement les sources de données utilisées ainsi que des notes méthodologiques relatives aux périodes couvertes, au découpage géographique, au modèle de classification des indicateurs, au calcul des indicateurs et aux tests statistiques.

Les sources

Les sources utilisées dans cette étude pour calculer les 60 indicateurs sont nombreuses. On en dénombre plus de 25. En voici la liste, par ordre alphabétique des organismes qui les diffusent :

Centre Anti-Poison du Québec

Collecte sélective Québec

Commission de la santé et de la sécurité du travail

- *Fichier des lésions professionnelles*

Ministère de la Santé et des Services sociaux

- *Fichier des maladies à déclaration obligatoire, version novembre 1995 (Direction générale de la santé publique)*
- *Direction générale de la planification et de l'évaluation*
- *Fichier des décès*
- *Fichier des établissements de santé et des services sociaux du Québec*
- *Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO*
- *Fichier des mortinaissances*
- *Fichier des naissances*
- *Fichier des tumeurs*
- *Fichier des effectifs de population, version mai 1995 (Service de l'analyse statistique)*
- *Système d'information financière et opérationnelle (SIFO)*

Ministère de la Sécurité du revenu

- *Fichier de l'aide sociale (Direction de la recherche, de l'évaluation et de la statistique)*

Ministère de la Sécurité publique

Ministère des Affaires municipales

- *Répertoire des municipalités (Direction des communications)*
- *Service du contrôle budgétaire*

Régie de l'assurance-maladie du Québec

- *Fichier des dispensateurs de services*
- *Fichier des services professionnels rémunérés à l'acte*
- *Fichier des services pharmaceutiques*
- *Fichier d'inscription des bénéficiaires*

Régie des rentes du Québec

- *Fichier de l'allocation pour enfants handicapés*

Santé Canada

- *Enquêtes de santé*

Santé Québec

- *Enquêtes de santé*

Société de l'assurance automobile du Québec

- *Enquêtes sur l'utilisation des dispositifs de retenue*
- *Fichier de l'immatriculation*
- *Registre des rapports d'accidents*

Statistique Canada

- *Enquêtes de santé*
- *Enquêtes sur la population active*
- *Enquêtes sur les finances des consommateurs*
- *Recensements*

Pour chacun des 60 indicateurs, la plupart des résultats ont été obtenus directement à partir des sources énumérées à la page précédente. Dans quelques cas, les résultats proviennent d'autres études ou nous ont été transmis par des personnes-ressources. On fournit à la fin du document une liste des sources de données, indicateur par indicateur, utilisées pour chacun des éléments graphiques.

Les sources de données exploitées dans ce projet présentent des caractéristiques particulières en ce qui a trait à l'univers couvert, au mode de collecte de l'information, à la définition et à l'interprétation des variables ainsi qu'aux limites à l'intérieur desquelles ces sources peuvent être utilisées. En plus du document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, le lecteur désirent obtenir plus d'information technique sur les différentes sources pourra se référer à la « Liste des documents méthodologiques selon les organismes diffuseurs » à la fin de la section.

Les périodes couvertes

Dans la mesure du possible, nous présentons les données les plus récentes, disponibles au moment du calcul des différents indicateurs. Nous avons également tenté de remonter le plus loin possible dans la description des tendances historiques. Toutefois, les périodes étudiées varient d'un indicateur à l'autre. Dans le cas des indicateurs se rapportant à des nombres restreints d'événements, le calcul s'est fait le plus souvent à partir d'événements regroupés sur plusieurs années.

Le découpage géographique

Nous avons utilisé le découpage en 18 régions sociosanitaires selon les décrets du 20 avril 1978, du 18 décembre 1991 et du 4 mai 1994 (Blondeau et Mecteau, 1996). Dans l'identification des régions, les noms des régions sociosanitaires qui ont été retenus sont ceux du décret du 4 mai 1994 sauf pour deux régions. Par manque d'espace, la région Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine a été appelée Gaspésie—Îles-de-la-Mad. et la région Terres-Cries-de-la-Baie-James a été identifiée sous le nom Terres-Cries. Ainsi, les noms des régions apparaissant dans les graphiques et tableaux sont les suivants :

01	Bas-Saint-Laurent	10	Nord-du-Québec
02	Saguenay—Lac-Saint-Jean	11	Gaspésie—Îles-de-la-Mad.
03	Québec	12	Chaudière-Appalaches
04	Mauricie—Bois-Francs	13	Laval
05	Estrie	14	Lanaudière
06	Montréal-Centre	15	Laurentides
07	Outaouais	16	Montérégie
08	Abitibi-Témiscamingue	17	Nunavik
09	Côte-Nord	18	Terres-Cries

Pour certains indicateurs, les données ne sont disponibles que selon le découpage en 16 régions administratives. Pour 15 de ces régions, la région administrative correspond exactement à la région sociosanitaire. L'exception est la région administrative du Nord-du-Québec qui englobe trois régions sociosanitaires : Nord-du-Québec, Terres-Cries-de-la-Baie-James et Nunavik. Dans d'autres cas, ces trois régions sociosanitaires ont été jumelées par l'organisme responsable de la source pour des raisons de confidentialité. Enfin, pour les indicateurs calculés à partir des enquêtes de Santé Québec, les données ne sont pas disponibles pour la région sociosanitaire 10, le Nord-du-Québec. Pour les régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James, nous avons retenu respectivement les données des enquêtes de 1992 auprès des Inuits du Nunavik et de 1991 chez les Cris de la Baie James.

Pour tous les indicateurs, sauf pour le *taux de crimes contre la personne* (indicateur 30) et le *taux de victimes d'accidents de véhicules routiers* (indicateur 51), les données régionales se rapportent à la région de résidence.

Le modèle de classification des indicateurs

Dans cette étude, les indicateurs sont présentés selon le modèle de classification retenu dans le document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*. Ce modèle de classification établit trois axes séquentiels en matière de santé : les déterminants, l'état de santé et les conséquences.

Les déterminants de la santé sont des facteurs qui peuvent être associés au développement de problèmes de santé. En aucun cas, les éléments recueillis sous cette rubrique ne peuvent être interprétés comme des problèmes de santé. Par ailleurs, chacun des déterminants peut être associé directement ou indirectement à un ou plusieurs problèmes de santé.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental, et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » (OMS, 1946). Cependant, la mesure de la santé est difficile. L'absence d'indicateurs de l'état de santé fiables et disponibles nous amène plus souvent qu'autrement à mesurer la santé par son contraire, c'est-à-dire par la maladie, la morbidité et la mortalité. Ainsi, l'état de santé renvoie à des problèmes qui font référence à une vision surtout médicale de la santé. Il peut s'agir de problèmes de santé, d'états morbides ou de maladies, diagnostiqués par des professionnels de la santé ou par auto-évaluation de la personne affectée, voire même par une tierce personne, et dont la gravité s'étend de la situation la plus bénigne à l'affection la plus sévère. La présence d'un problème de santé n'implique pas nécessairement le développement de quelconques conséquences négatives.

Les conséquences des problèmes de santé se définissent comme des états ou des comportements attribuables au développement, à la présence ou aux séquelles d'une maladie.

Chacun des trois axes comprend différentes rubriques. Le modèle de classification des indicateurs se présente de la façon suivante :

1. Déterminants de la santé

- Environnement
 - Environnement physique et écologie
 - Environnement social
- Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque
- Organisation des soins

2. État de santé

- État de santé subjectif
- État de santé objectif
 - Morbidité extra-hospitalière
 - Morbidité hospitalière
 - Mortalité

3. Conséquences des problèmes de santé

- Incapacité
- Utilisation des services
- Consommation de médicaments

Le calcul des indicateurs

Les indicateurs calculés dans cette étude sont généralement présentés sous forme de proportions ou de taux. Les proportions représentent le rapport d'un sous-ensemble à un

ensemble plus grand. Dans le cas des taux, on en retrouve deux types : les taux bruts et les taux ajustés. Les taux bruts se calculent comme le rapport d'un nombre d'événements observés durant une période donnée, à la population moyenne durant cette période. Les taux ajustés sont obtenus selon la méthode de la standardisation directe, en appliquant les taux par âge d'un territoire ou d'une période donnés à la structure par âge d'une population de référence. Cet ajustement permet d'effectuer des comparaisons géographiques ou temporelles en éliminant l'effet de structures d'âge différentes (Fleiss, 1981). Dans le calcul des taux, nous avons utilisé dans la mesure du possible au dénominateur les effectifs corrigés du Service de l'analyse statistique du MSSS. Ces données sont basées sur les recensements canadiens et sont corrigées pour tenir compte du sous-dénombrement, du surdénombrement et des résidents non permanents (Pelletier, 1995). La population de référence retenue dans le calcul des taux ajustés est celle de la population corrigée, sexes réunis, de l'ensemble du Québec en 1991.

Le calcul des indices comparatifs s'est fait en rapportant le taux brut ou ajusté de chaque région, selon le cas, à celui de l'ensemble du Québec. La valeur de base pour l'ensemble du Québec a été établie à 100. Un indice qui dépasse cette valeur signifie que le taux est supérieur à celui de l'ensemble du Québec.

En général, dans les indicateurs de l'état de santé, les taux ont été ajustés selon l'âge de façon à présenter les variations du phénomène une fois éliminé l'effet perturbateur de structures d'âge différentes. À l'opposé, pour les déterminants et les conséquences, en particulier pour les indicateurs se rapportant à l'organisation des soins et à l'utilisation des services, les taux bruts ont été utilisés afin d'illustrer l'ampleur réelle du phénomène. Ainsi, l'indicateur 42, *taux d'hospitalisation selon le diagnostic*, a été ajusté selon l'âge puisqu'il se situe dans la section **État de santé**, tandis que l'indicateur 56, *taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic*, n'a pas été ajusté puisqu'il se retrouve comme indicateur de l'utilisation des ressources, dans la section **Conséquences des problèmes de santé**.

Aucune proportion n'a été ajustée selon l'âge pour les données tirées du recensement comme les proportions d'immigrants, de personnes pauvres ou de personnes vivant seules. Il en est de même pour les données d'enquêtes comme les proportions de fumeurs, de personnes ne se percevant pas en bonne santé ou de personnes ayant une incapacité. Ce choix s'explique par le fait que cette procédure n'est pas courante pour ce type de données.

Les variations temporelles ont été calculées à partir des valeurs non arrondies. Le calcul des variations à partir des valeurs arrondies peuvent donner des résultats légèrement différents.

Les coefficients de variation et les tests statistiques

La plupart des indicateurs ont été calculés à partir d'un nombre restreint d'événements ou à partir d'un échantillon. Les résultats peuvent être soumis à des variations aléatoires, surtout ceux se rapportant à des régions moins peuplées. Une façon d'estimer l'imprécision des données associées aux variations aléatoires est de calculer l'erreur-type. La méthode de calcul de l'erreur-type varie selon qu'il s'agit de proportions, de taux bruts, de taux ajustés ou d'autres types de mesures comme l'espérance de vie. Les méthodes retenues sont celles décrites dans Blalock (1972) pour les proportions, dans Bernard et Lapointe (1987) pour les taux bruts et dans Chiang (1961 et 1984) pour les taux ajustés et l'espérance de vie.

Une fois l'erreur-type estimée, il nous a été possible d'effectuer des tests statistiques et d'identifier les régions présentant des différences significatives par rapport à la moyenne québécoise. À partir de l'erreur-type, nous avons également calculé le coefficient de variation et ainsi estimé l'imprécision relative de l'indicateur.

La plupart des tests statistiques ont été faits selon la formule suivante :

$$Z = \frac{\text{(valeur de la région - valeur du Québec)}}{\sqrt{\text{(variance de la valeur de la région + variance de la valeur du Québec)}}$$

Lorsque Z était égal ou supérieur à 1,96, nous avons conclu que la valeur de la région était significativement plus élevée que celle du Québec, avec une probabilité d'erreur de 5 %. À l'inverse, lorsque Z était égal ou inférieur à -1,96, nous avons conclu que la région enregistrait une valeur significativement plus faible que celle de l'ensemble du Québec.

Dans le cas des proportions provenant des enquêtes de Santé Québec et de la SAAQ, ce sont les intervalles de confiance qui ont été comparés. Les limites inférieures et supérieures des intervalles de confiance ont été obtenues à partir des formules suivantes :

$$\begin{aligned} \text{limite inférieure} &= \text{valeur de l'indicateur} - (1,96 \times \text{erreur-type}) \\ \text{limite supérieure} &= \text{valeur de l'indicateur} + (1,96 \times \text{erreur-type}) \end{aligned}$$

Lorsque les limites des intervalles de confiance de la région et de l'ensemble du Québec ne se chevauchaient pas, nous avons conclu que la valeur de la région était significativement différente de celle de l'ensemble du Québec. Dans le cas des données tirées des enquêtes de Santé Québec, étant donné le poids démographique des régions de Montréal-Centre et de la Montérégie, l'intervalle de confiance de ces régions n'a pas été comparé à celui de l'ensemble du Québec mais plutôt à celui du reste du Québec. De plus, les différences temporelles entre les enquêtes de Santé Québec pour l'ensemble du Québec ont été testées au seuil alpha de 0,01 alors que le seuil de 0,05 fut utilisé pour les variations à l'échelle des régions.

En ce qui concerne les données provenant des enquêtes de Santé Québec pour les régions des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nunavik (réalisées respectivement en 1991 et 1992), la comparaison avec l'ensemble du Québec s'est faite avec les données tirées de l'Enquête sociale et de santé de 1992-1993 selon la même approche par intervalle de confiance. Cette méthode est d'ailleurs celle utilisée dans le rapport produit par Santé Québec pour la région du Nunavik, à la différence que les données disponibles à ce moment pour le Québec provenaient de l'Enquête Santé Québec de 1987 (Santé Québec, 1994a).

Le coefficient de variation a été obtenu en divisant l'erreur-type de la proportion ou du taux par la valeur que prend la proportion ou le taux. Le coefficient de variation a été exprimé en pourcentage. Le calcul des coefficients de variation (CV) nous a permis, en s'inspirant des normes de Statistique Canada, de prendre les décisions suivantes :

- les valeurs ayant un CV inférieur ou égal à 16,5 % ont été publiées sans restriction;
- les valeurs ayant un CV supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 % doivent être interprétées avec prudence et ont été identifiées par un astérisque (*);
- les valeurs ayant un CV supérieur à 33,3 % n'ont été présentées qu'à titre indicatif et ne devraient pas être utilisées. Dans les tableaux, ces valeurs ont été identifiées par deux astérisques (**) tandis que dans les graphiques, elles ont été supprimées.

Les coefficients de variation et les tests statistiques n'ont pas été calculés pour tous les indicateurs. Lorsque le nombre d'événements est assez grand, comme dans le cas des hospitalisations et des journées d'hospitalisation, l'utilisation de tests statistiques n'est pas appropriée puisque les valeurs de la plupart des régions sont significativement différentes de celles de l'ensemble du Québec et que les coefficients de variation sont très faibles. Pour d'autres indicateurs, comme ceux tirés du recensement ou de fichiers administratifs tels que celui des établissements du MSSS ou de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, ce n'est pas l'usage d'effectuer des tests statistiques.

Liste des documents méthodologiques selon les organismes diffuseurs

Centre Anti-Poison du Québec

- CENTRE ANTI-POISON DU QUÉBEC (1996). *Rapport annuel 1995*, Québec, Centre Anti-Poison du Québec.

Collecte sélective Québec

- MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (1992). *État de l'environnement au Québec*, Montréal, Guérin.

Commission de la santé et de la sécurité du travail

- CSST (1996). *Statistiques sur les lésions professionnelles 1992*, Québec, CSST.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Fichier des maladies à déclaration obligatoire (Direction générale de la santé publique) :

- MSSS (1996). *Surveillance des maladies infectieuses : maladies évitables par la vaccination, maladies d'origine hydrique ou alimentaire, tuberculose, et autres maladies, 1994*, Québec, MSSS, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, Direction générale de la santé publique, 201 p.

Fichiers des décès, des naissances et des mortinaissances :

- BUREAU DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (1996). *Rapport sur la qualité des fichiers du Registre des événements démographiques, Québec, 1994*, Québec, BSQ.

Fichier des établissements de santé et des services sociaux du Québec :

- MSSS (1996). *Rapport financier annuel : établissements publics et privés conventionnés, année financière terminée le 31 mars 1996*, Québec, MSSS.

Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO :

- MSSS (1995). *Statistiques MED-ÉCHO 1989-1990 à 1993-1994 : Les soins hospitaliers de courte durée au Québec*, Québec, MSSS, Direction générale de la planification et de l'évaluation.

Fichier des tumeurs :

- BEAUPRÉ, M. (1995). *Rapport annuel des nouveaux cas de cancer déclarés au fichier des tumeurs du Québec, année 1992*, Québec, MSSS.

Fichier des effectifs de population (Service de l'analyse statistique) :

- PELLETIER, G. (1995). *La population du Québec par territoire de CLSC, de DSC et de RSS, pour la période 1981 à 2016*, Québec, MSSS, Direction générale de la planification et de l'évaluation.

Système d'information financière et opérationnelle (SIFO) :

- MSSS (1996). *SIFO Système d'information financière et opération. Méthodologie*, Québec, MSSS, Service des études opérationnelles et données statistiques.

Ministère de la Sécurité du revenu

- GAGNÉ, P., DESLAURIERS, J., BERNIER, J. (1996). *De l'aide sociale à la sécurité du revenu : rapport statistique 1994-95*, Québec, Ministère de la Sécurité du revenu.

Ministère de la Sécurité publique

- MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC (1996). *Statistiques 1995. Criminalité et application des règlements de la circulation au Québec*, Québec, Ministère de la Sécurité publique du Québec, Direction des affaires policières et de la sécurité incendie.

Ministère des Affaires municipales

- MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES (1996). *Répertoire des municipalités du Québec*, Québec, Les Publications du Québec.
- MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (1992). *État de l'environnement au Québec*, Montréal, Guérin.

Régie de l'assurance-maladie du Québec

- RAMQ (1996). *Statistiques annuelles 1995*, Québec, RAMQ.

Régie des rentes du Québec

- RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC (1996). *Les allocations d'aide aux familles — Statistiques 1995*, Québec, RRQ.

Santé Canada et Statistique Canada

Enquêtes de santé :

- TAMBAY, J.-L., CATLIN, G. (1995). « Plan d'échantillonnage de l'Enquête nationale sur la santé de la population », *Rapports sur la santé*, n° 7, p. 31-43.
- SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA, Stephens, T., Fowler, D., Graham, P. (sous la direction de) (1993). *Enquête Promotion de santé Canada 1990 : Rapport technique*, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services Canada (cat. H 39-263/2-1990F).
- SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA (1988). *Rapport technique : Enquête Promotion Santé Canada* (1985), Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services Canada.

Santé Québec

- SANTÉ QUÉBEC (1996). *Cahier technique et méthodologique, Enquête sociale et de santé 1992-1993*, 2 tomes, Montréal.
- SANTÉ QUÉBEC (1995). *Et la santé, ça va en 1992-1993 ? Rapport de l'enquête sociale et de santé 1992-1993*, 3 volumes, Québec, Santé Québec.
- SANTÉ QUÉBEC (1994a). *Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik, 1992*, Cahier technique, 92-01 (première version), Montréal.
- SANTÉ QUÉBEC (1994b). *Et la santé des Cris, ça va ? Rapport de l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James, 1991*, Montréal, MSSS, Gouvernement du Québec.
- SANTÉ QUÉBEC (1994c). *Et la santé des Inuits, ça va ? Rapport de l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik, 1992*, 2 tomes, Montréal, MSSS, Gouvernement du Québec.
- MSSS (1988). *Et la santé, ça va ? Rapport de l'enquête Santé Québec 1987*, Tome 1, Québec, MSSS.

Société de l'assurance automobile du Québec

Enquêtes sur l'utilisation des dispositifs de retenue :

- SAAQ (1995). *Évolution des taux d'utilisation des dispositifs de retenue dans les véhicules routiers du Québec*, Québec, SAAQ.

Registre des rapports d'accidents et fichier de l'immatriculation :

- SAAQ (1996). *Dossiers statistiques, Bilan 1995. Accidents, parc automobile, permis de conduire*, Québec, SAAQ.

Statistique Canada

Recensements :

- STATISTIQUE CANADA (1994). *Échantillonnage et pondération. Rapport technique du recensement de 1991, Série des produits de référence*, Ottawa, Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (cat. 92-342F).
- STATISTIQUE CANADA (1992). *Dictionnaire du recensement de 1991*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-301F).

Enquêtes sur la population active et enquêtes sur les finances des consommateurs :

- STATISTIQUE CANADA (1987). *Méthodologie de l'enquête sur la population active du Canada, 1984-1990*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 71-526).
- STATISTIQUE CANADA (1994). *Couverture. Rapport technique du recensement de 1991, Série des produits de référence*, Ottawa, Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (cat. 92-341F).

PARTIE

2

FICHES DESCRIPTIVES

1. DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement

*Environnement physique et écologie
Environnement social*

***Comportements,
habitudes de vie
et facteurs de risque***

Organisation des soins

1. DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Les déterminants de la santé sont regroupés sous trois rubriques : l'**Environnement**, les **Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque** ainsi que l'**Organisation des soins**.

L'**Environnement** est constitué des facteurs, extérieurs au corps humain, qui présentent une incidence sur la santé et qui échappent, en tout ou en partie, au contrôle de l'individu. Ces facteurs ne se limitent pas à l'*environnement physique* et à l'*écologie*; ils comprennent tout autant l'*environnement social* qui, lui-même, inclut la composition sociodémographique du milieu social, la situation économique générale, le contexte politique, les conditions de travail, etc. Bref, les facteurs en cause incluent tous les éléments qui contribuent à façonner la société dans laquelle évolue un individu et qui peuvent compromettre la santé.

Les indicateurs d'*environnement physique* et d'*écologie*, en rapport avec la santé, commencent à peine à se développer. Il s'agit d'un univers vaste et complexe où il n'existe pas encore de consensus sur le choix des sous-dimensions et, *a fortiori*, des indicateurs afférents; dans certains cas, les indicateurs ne sont pas disponibles sur des bases géographiques restreintes — leur pertinence semble même être contestée quant à leur utilisation sur de telles bases. Les indicateurs employés dans cette sous-section, au nombre de trois, ont fait l'objet d'un relatif consensus parmi les experts.

Les indicateurs d'*environnement social* sont présentés en trois volets : les indicateurs *démographiques* font référence à des phénomènes démographiques tels que l'accroissement de la population et la structure par âge et qui ne sont pas essentiellement interprétés dans un contexte sanitaire; les indicateurs *sociodémographiques* sont ceux pour lesquels l'interprétation courante est plus souvent sociale que démographique (comme la *proportion de familles monoparentales*); et les indicateurs *socio-économiques* servent à circonscrire diverses dimensions de la pauvreté (par exemple, le *taux de chômage*).

Les **Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque** représentent les décisions prises par les individus et qui ont, tôt ou tard, des incidences sur leur propre santé et sur celle de leurs proches. Cet ensemble forme, en quelque sorte, un continuum avec l'environnement et l'organisation des soins. À un pôle de ce continuum, l'individu peut ou pourrait, de lui-même, agir sur les éléments préjudiciables à sa santé et les modifier; à l'autre, il en est incapable. La section regroupe un nombre important d'indicateurs connus et fréquemment utilisés comme la *proportion de fumeurs réguliers* ou encore la *proportion de femmes ayant subi une mammographie*.

L'**Organisation des soins** de santé peut être examinée sous plusieurs angles : la quantité, la qualité, la continuité, l'agencement, la disponibilité, l'accessibilité, l'efficacité et la nature des soins, et aussi selon les rapports existants entre la population et les ressources engagées dans la prestation des soins de santé. L'organisation des soins peut aussi être conçue comme un des éléments de l'environnement social. Elle induit cependant un tel système de contraintes à la santé des personnes et des populations qu'elle a fait l'objet d'une dimension à part.

Comme dans la sous-section portant sur l'*environnement physique* et l'*écologie*, il ne se dégage aucun consensus quant au choix d'indicateurs décrivant le système de soins influant sur l'état de santé d'une population. Les indicateurs utilisés traitent à la fois du nombre de ressources (lits, professionnels) et des dépenses consacrées au domaine de la santé.

1. PROPORTION DE LA POPULATION DESSERVIE PAR DES ÉQUIPEMENTS DE COLLECTE SÉLECTIVE

Définition¹ : Proportion, pour une période donnée, de la population desservie par des équipements de collecte sélective par rapport à la population totale au milieu de la période.

- Les équipements de collecte sélective des municipalités visent essentiellement la récupération des déchets d'origine domestique.
- Les produits recueillis le plus souvent par la collecte sélective sont les journaux, les canettes et les boîtes de conserve (aluminium et acier), les contenants de verre et parfois certains types de plastique.
- Ne pas confondre la population ayant accès à des équipements de collecte sélective avec la population utilisant effectivement ce type de service.

Méthode de calcul :


$$\frac{\text{Population desservie par des équipements de collecte sélective, pour une période donnée}}{\text{Population totale au milieu de la période}} \times 100$$

Sources : Numérateur : Direction de la récupération et du recyclage, ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec (1980 à 1993), Collecte sélective Québec (1994 et 1995).
Dénominateur : Ministère des Affaires municipales.


Faits saillants : De plus en plus de Québécois disposent d'équipements de collecte sélective. En 1995, les deux tiers de la population étaient desservis par des équipements de collecte sélective alors qu'en 1980, à peine 2 % bénéficiaient de ces mêmes équipements.

- En 1995, la collecte sélective de porte-à-porte était offerte à près de la moitié de la population alors que 19 % de la population pouvait se prévaloir d'équipements de collecte sélective par apport volontaire.
- En 1995, la collecte sélective était largement implantée dans les régions de Québec (89 %) et de la Mauricie—Bois-Francs (87 %). La population n'avait accès à aucun équipement de collecte sélective dans les régions du Nord-du-Québec, du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.
- Entre 1993 et 1995, la collecte sélective a progressé au Québec de 79 %. Elle s'est accrue dans l'ensemble des régions, à l'exception du Saguenay—Lac-Saint-Jean, où elle a diminué de 10 %.


1. Proportion de la population desservie par des équipements de collecte sélective, Québec, 1980 à 1995²



2. Proportion de la population desservie par des équipements de collecte sélective selon le type de collecte, Québec, 1993 à 1995



3. Proportion de la population desservie par des équipements de collecte sélective selon la région, Québec, 1995



4. Proportion de la population desservie par des équipements de collecte sélective selon le type de collecte et la région, Québec, 1993 et 1995

Région	1993 %	1995			Variation de 1993 à 1995 %	
		Porte-à- porte %	Apport volontaire %	Total		
				Nombre		%
Bas-Saint-Laurent (01)	18,6	5,3	31,4	77 636	36,8	98
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	87,8	77,8	1,1	232 217	78,9	-10
Québec (03)	25,9	67,1	22,2	578 175	89,3	245
Mauricie — Bois-Francis (04)	33,5	43,3	44,1	425 349	87,4	161
Estrie (05)	38,5	35,4	38,6	206 274	74,0	92
Montréal-Centre (06)	37,3	51,9	8,9	1 095 218	60,9	63
Outaouais (07)	51,5	62,4	4,3	204 405	66,8	30
Abitibi-Témiscamingue (08)	7,4	0,0	53,8	83 433	53,8	630
Côte-Nord (09)	0,7	0,0	25,3	26 905	25,3	3 672
Nord-du-Québec (10)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	n.a.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	0,0	8,3	50,5	63 855	58,8	n.a.
Chaudière-Appalaches (12)	44,6	52,5	5,9	223 395	58,4	31
Laval (13)	2,9	15,4	11,9	91 333	27,3	89
Lanaudière (14)	26,5	53,1	15,0	253 021	68,1	61
Laurentides (15)	16,8	17,6	62,3	331 093	79,9	79
Montérégie (16)	59,1	65,6	0,0	917 288	72,0	18
Nunavik (17)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	n.a.
Terres-Cries (18)	0,0	0,0	0,0	0	0,0	n.a.
Ensemble du Québec	37,2	48,2	18,5	4 809 606	66,7	79

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 54-55.
- Les données sur les municipalités ayant des programmes de collecte sélective sont colligées de façon systématique depuis l'été 1992. Avant cette date, les données statistiques sont des estimations faites par le ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec.

n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

2. PROPORTION DE LA POPULATION DESSERVIE PAR DES INSTALLATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES

Définition¹ : Proportion, pour une période donnée, de la population desservie par des installations d'épuration des eaux usées par rapport à la population totale, au milieu de la période, des municipalités dotées de réseaux d'égout.

– La population desservie par des installations d'épuration des eaux usées est uniquement celle des municipalités dotées de réseaux d'égout conformes aux normes gouvernementales.

Méthode de calcul :

$$\frac{\text{Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées pour une période donnée}}{\text{Population totale des municipalités dotées de réseaux d'égout au milieu de la période}} \times 100$$

Sources : Service du contrôle budgétaire, ministère des Affaires municipales.

Faits saillants : Le Québec a réalisé d'importants progrès dans l'assainissement de ses eaux usées. À la suite de l'instauration du programme d'assainissement des eaux du Québec (PAEQ) en 1981, la proportion de la population desservie par des installations d'épuration des eaux usées est passée de 8 % en 1985 à 77 % en 1994.

- En 1994, la proportion de la population desservie par des installations d'épuration des eaux usées variait énormément d'une région à l'autre. Plus de 90 % de la population de Montréal-Centre, de l'Estrie et de Québec avait des installations pour traiter les eaux usées, alors que moins de 20 % de la population des régions de Lanaudière et de Laval bénéficiait de ces installations.
- L'accroissement remarquable à l'échelle du Québec est imputable en grande partie au progrès observé dans les trois régions les plus peuplées : Montréal-Centre, Montérégie et Québec.


1. Proportion² de la population desservie par des installations d'épuration des eaux usées, Québec, 1985 à 1994



2. Proportion² de la population desservie par des installations d'épuration des eaux usées, Québec, 1985 à 1994

Année	Population desservie	
	Nombre	%
1985	456 709	7,7
1986	835 252	14,1
1987	975 750	16,5
1988	1 883 614	31,8
1989	1 958 827	33,1
1990	2 114 458	35,7
1991	2 390 783	40,3
1992	3 650 213	61,6
1993	3 843 443	64,9
1994	4 539 412	76,6

3. Proportion² de la population desservie par des installations d'épuration des eaux usées selon la région³, Québec, 1994



4. Proportion² de la population desservie par des installations d'épuration des eaux usées selon la région³, Québec, 1990 à 1994

Région	1990	1991	1992	1993	1994	
	%	%	%	%	Nombre	%
Bas-Saint-Laurent (01)	53,1	56,7	56,7	65,8	97 376	67,5
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	63,5	64,0	64,7	65,7	157 402	67,0
Québec (03)	3,6	4,8	93,0	93,0	542 264	93,1
Mauricie — Bois-Francs (04)	28,1	29,0	29,0	59,9	208 615	60,8
Estrie (05)	41,3	92,5	94,1	95,1	192 124	95,5
Montréal-Centre (06)	47,3	47,3	66,8	66,8	1 796 984	100,0
Outaouais (07)	85,7	86,0	86,0	89,0	203 019	89,0
Abitibi-Témiscamingue (08)	27,7	28,1	30,9	42,9	50 504	48,2
Côte-Nord (09)	0,0	33,3	33,3	33,3	31 301	38,8
Nord-du-Québec (10)	57,0	57,0	57,0	78,9	12 441	78,9
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	10,0	15,1	23,5	32,6	21 403	37,6
Chaudière-Appalaches (12)	44,7	66,9	66,9	70,5	200 319	77,4
Laval (13)	11,1	11,1	11,1	19,0	63 566	19,0
Lanaudière (14)	14,9	15,8	15,8	16,8	42 780	17,4
Laurentides (15)	12,4	18,2	20,1	21,0	107 895	35,8
Montérégie (16)	37,4	42,3	80,2	80,3	811 419	81,5
Nunavik (17)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Terres-Cries (18)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Ensemble du Québec	35,7	40,3	61,6	64,9	4 539 412	76,6

Notes :

1. Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 56-57.
2. Le calcul des proportions a été fait à partir des effectifs de population de 1995 des municipalités, diffusés par le ministère des Affaires municipales.
3. En 1994, il n'existait aucun réseau d'égout conforme aux normes gouvernementales dans les régions du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

3. TAUX DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de véhicules automobiles à la population totale au milieu de la période.

– Le terme « véhicules automobiles » désigne les taxis et les voitures de promenade des particuliers, c'est-à-dire les automobiles, les camions légers et les voitures de location.

Méthode de calcul : $\frac{\text{Nombre annuel moyen de véhicules automobiles, pour une période donnée}}{\text{Population totale au milieu de la période}} \times 100$


Sources : Numérateur : Fichier de l'immatriculation, Société de l'assurance automobile du Québec.

Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.

Faits saillants : Au Québec, un peu plus de quatre personnes sur dix possèdent une automobile. En 1995, 43 % de la population québécoise avait une automobile, comparativement à 34 % en 1985.

- Le taux de véhicules automobiles était, en 1995, sensiblement le même d'une région à l'autre, soit environ 45 %. Seule exception, Montréal-Centre, où le nombre de personnes possédant une automobile était de 32 %.
- Entre 1990 et 1995, le taux de véhicules automobiles a augmenté considérablement dans la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent tandis que, pour la même période, il a diminué légèrement à Montréal-Centre, à Laval et dans Lanaudière.


1. Taux de véhicules automobiles, Québec, 1985 à 1995



2. Taux de véhicules automobiles, Québec, 1985 à 1995

Année	Véhicules automobiles	
	Nombre	%
1985	2 294 143	34,3
1986	2 456 055	36,5
1987	2 642 938	38,8
1988	2 770 864	40,4
1989	2 842 588	40,9
1990	2 917 255	41,6
1991	2 978 336	42,1
1992	3 031 193	42,4
1993	3 070 130	42,6
1994	3 107 133	42,7
1995	3 132 615	42,7

3. Taux de véhicules automobiles selon la région², Québec, 1995



4. Taux de véhicules automobiles selon la région², Québec, 1990 à 1995

Région	1990	1991	1992	1993	1994	1995		Variation de 1990 à 1995 (%)
	%	%	%	%	%	Nombre	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	41,5	42,8	44,2	45,3	46,3	96 753	47,0	13
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	41,6	42,5	43,1	44,0	44,7	125 459	43,2	4
Québec (03)	42,9	43,5	44,1	44,4	44,6	287 029	44,5	4
Mauricie — Bois-Francs (04)	45,4	46,3	47,0	47,5	47,8	233 292	48,0	6
Estrie (05)	43,6	44,4	45,1	45,8	46,5	131 655	46,9	8
Montréal-Centre (06)	32,6	32,7	32,4	32,1	31,8	585 215	31,7	-3
Outaouais (07)	44,7	45,4	45,8	46,1	46,0	141 395	45,2	1
Abitibi-Témiscamingue (08)	42,7	42,8	43,5	44,0	44,9	71 860	45,4	6
Côte-Nord (09)	37,9	39,7	40,6	40,9	42,2	45 328	43,2	14
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	40,5	42,3	44,1	45,4	46,7	49 962	47,6	18
Chaudière-Appalaches (12)	45,3	46,3	47,2	47,8	48,4	186 056	48,4	7
Laval (13)	45,9	46,0	45,8	45,6	45,3	153 992	45,0	-2
Lanaudière (14)	47,6	48,2	48,8	48,8	48,9	178 109	46,9	-2
Laurentides (15)	48,9	49,1	49,4	49,5	49,6	213 571	48,9	0
Montérégie (16)	46,0	46,3	46,3	46,3	46,1	606 467	45,9	0
Nunavik (17)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terres-Cries (18)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Ensemble du Québec	41,6	42,1	42,4	42,6	42,7	3 132 615	42,7	3

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 58-59.
- Les données sur les véhicules automobiles sont disponibles à l'échelle des régions administratives. La région administrative du Nord-du-Québec correspond à la somme de trois régions sociosanitaires : Nord-du-Québec, Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James. Les données ne sont donc pas disponibles pour ces trois régions prises séparément.

n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

4. RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON L'ÂGE ET LE SEXE


Définition¹ : Proportion de la population d'un groupe d'âge et d'un sexe donnés par rapport à la population totale.

Méthode de calcul : $\frac{\text{Population d'un groupe d'âge pour un sexe donné} \times 100}{\text{Population totale}}$

Sources : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS².

Faits saillants : Le Québec vieillit. De 1976 à 1991, la proportion des personnes de 65 ans et plus est passée de 7,6 % à 11,0 %. À l'inverse, on constate que la part des jeunes (0 à 14 ans) s'amenuise constamment : 24,6 % en 1976 contre 19,8 % en 1991.

- Ce vieillissement est observé tant chez les hommes que chez les femmes. Le vieillissement est toutefois plus prononcé chez les femmes. En 1991, 12,9 % des femmes avaient plus de 65 ans comparativement à 9,1 % des hommes.
- En 1991, les régions nordiques (Nunavik, Terres-Cries-de-la-Baie-James et Nord-du-Québec) se distinguaient des autres avec un important contingent d'enfants de 0 à 14 ans. Par contre, l'effet du vieillissement de la population se faisait particulièrement sentir dans les régions de Montréal-Centre, du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie—Bois-Francs et de l'Estrie.
- Entre 1981 et 1991, la proportion des jeunes de 0 à 14 ans a diminué dans toutes les régions. À l'inverse, la proportion des aînés (65 ans et plus) a augmenté partout, sauf au Nunavik où elle a légèrement régressé (2,8 % en 1981 comparativement à 2,1 % en 1991).



2. Répartition de la population selon l'âge et le sexe, Québec, 1976, 1981, 1986 et 1991

Hommes

1976	25,3	68,1	6,6
1981	22,3	70,4	7,3
1986	21,0	71,0	8,0
1991	20,6	70,4	9,1

Femmes


1976	23,9	67,4	8,7
1981	20,7	69,2	10,1
1986	19,4	69,1	11,5
1991	19,1	68,0	12,9

0-14 ans

15-64 ans

65 ans et +

3. Répartition de la population selon l'âge et la région, Québec, 1991



4. Répartition de la population selon l'âge et la région, Québec, 1981 et 1991

Région	0-14 ans		15-64 ans		65 ans et +		Total	
	1981	1991	1981	1991	1981	1991	1981	1991
	%	%	%	%	%	%	Nombre	Nombre
Bas-Saint-Laurent (01)	22,8	21,1	67,7	66,0	9,5	12,9	215 805	210 036
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	25,0	23,3	69,2	67,9	5,9	8,8	292 020	293 273
Québec (03)	20,4	17,7	70,9	70,9	8,8	11,4	588 632	632 815
Mauricie — Bois-Francis (04)	21,5	20,5	68,7	67,0	9,7	12,6	457 819	477 596
Estrie (05)	22,8	20,9	67,3	66,7	9,9	12,4	261 119	275 092
Montréal-Centre (06)	16,8	15,7	71,8	70,2	11,4	14,0	1 795 073	1 822 516
Outaouais (07)	23,5	21,1	69,5	70,5	7,0	8,4	247 060	291 556
Abitibi-Témiscamingue (08)	25,7	23,6	67,7	67,8	6,6	8,7	148 195	155 886
Côte-Nord (09)	27,5	22,7	68,9	71,3	3,6	6,0	119 900	105 904
Nord-du-Québec (10)	30,0	27,7	68,4	69,8	1,6	2,5	28 408	20 778
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	24,8	20,4	66,4	67,8	8,9	11,8	114 901	108 507
Chaudière-Appalaches (12)	24,2	22,4	67,1	66,6	8,7	10,9	356 440	377 051
Laval (13)	21,4	19,8	72,9	71,3	5,7	9,0	273 941	322 444
Lanaudière (14)	24,4	23,1	68,2	68,5	7,4	8,4	261 683	344 052
Laurentides (15)	23,4	21,9	68,8	68,8	7,8	9,3	313 531	391 195
Montérégie (16)	23,6	21,5	69,2	69,3	7,2	9,2	1 081 307	1 236 013
Nunavik (17)	41,9	39,5	55,3	58,4	2,8	2,1	4 815	7 794
Terres-Cries (18)	43,0	35,0	52,9	60,2	4,1	4,7	7 157	8 725
Ensemble du Québec	21,5	19,8	69,8	69,2	8,7	11,0	6 567 806	7 081 233

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 60-61.
- Les données du MSSS sont corrigées pour tenir compte du sous-dénombrement, du surdénombrement et des résidents non permanents (Pelletier, 1996).

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

5. TAUX D'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, de la différence d'effectifs de population au début et à la fin de la période, à la population au début de la période.

– Le taux d'accroissement correspond à la somme du taux d'accroissement naturel (naissances moins décès) et du taux d'accroissement migratoire (immigrants moins émigrants).


Méthode de calcul :
$$\frac{\text{Population à la fin de la période} - \text{Population au début de la période}}{\text{Population au début de la période}} \times 100$$

Sources : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS².

Faits saillants : Au cours des périodes 1976-1981 et 1981-1986, la population du Québec s'est accrue respectivement de 2,3 % et 2,5 %. Pour la période 1986-1991, l'augmentation fut de 5,2 % et pour 1991-1996, on prévoit une augmentation de l'ordre de 4,5 %.

- Le taux d'accroissement de la population varie énormément d'un groupe d'âge à l'autre. Pour chacune des périodes, il est égal ou supérieur à 15 % chez les 65 ans et plus, alors que chez les 0-14 ans, il est négatif pour 1976-1981 et 1981-1986, pour redevenir positif en 1986-1991.
- Le taux d'accroissement varie aussi passablement d'une région à l'autre. Pour la période 1986-1991, le taux d'accroissement de la population fut très prononcé dans les régions du Nunavik, de Lanaudière et des Laurentides, alors qu'au cours de la même période, la population diminuait sensiblement dans le Nord-du-Québec, la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord.
- Pour les trois périodes (1976-1981, 1981-1986 et 1986-1991), seule la Côte-Nord a vu sa population diminuer systématiquement. À l'opposé, le Nunavik enregistrait une croissance soutenue, passant de 3 059 personnes en 1976 à 7 794 en 1991.


1. Taux d'accroissement de la population, Québec, 1976-1981 à 1991-1996



2. Taux d'accroissement de la population selon l'âge, Québec, 1976-1981 à 1986-1991

Groupe d'âge	Taux d'accroissement (%)			Population			
	1976-1981	1981-1986	1986-1991	1976	1981	1986	1991
0-14 ans	-10,7	-3,5	3,1	1 579 900	1 410 379	1 360 395	1 402 825
15-64 ans	5,4	2,9	3,9	4 350 800	4 583 728	4 715 108	4 897 236
65 ans et +	17,1	14,8	18,6	489 900	573 699	658 806	781 172
Total	2,3	2,5	5,2	6 420 500	6 567 806	6 734 309	7 081 233

3. Taux d'accroissement de la population selon la région³, Québec, 1986-1991



4. Taux d'accroissement de la population selon la région³, Québec, 1976-1981 à 1986-1991

Région	Taux d'accroissement (%)			Population			
	1976-1981	1981-1986	1986-1991	1976	1981	1986	1991
Bas-Saint-Laurent (01)	2,6	0,4	-3,1	210 401	215 805	216 723	210 036
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	5,1	0,7	-0,3	277 749	292 020	294 109	293 273
Québec (03)	2,7	2,6	4,8	573 025	588 632	604 112	632 815
Mauricie — Bois-Francs (04)	3,5	2,0	2,3	442 216	457 819	466 842	477 596
Estrie (05)	3,1	1,6	3,7	253 287	261 119	265 327	275 092
Montréal-Centre (06)	-6,8	0,6	0,9	1 926 044	1 795 073	1 805 884	1 822 516
Outaouais (07)	-1,2	7,0	10,3	250 059	247 060	264 405	291 556
Abitibi-Témiscamingue (08)	2,6	1,9	3,2	144 396	148 195	151 023	155 886
Côte-Nord (09)	-3,3	-9,9	-1,9	123 940	119 900	107 994	105 904
Nord-du-Québec (10)	7,8	-20,8	-7,7	26 351	28 408	22 512	20 778
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	-2,6	0,8	-6,3	117 972	114 901	115 793	108 507
Chaudière-Appalaches (12)	8,3	2,9	2,8	329 070	356 440	366 903	377 051
Laval (13)	8,2	6,9	10,1	253 240	273 941	292 824	322 444
Lanaudière (14)	19,2	9,7	19,9	219 573	261 683	287 050	344 052
Laurentides (15)	14,2	5,2	18,5	274 605	313 531	329 989	391 195
Montérégie (16)	9,2	4,3	9,6	990 037	1 081 307	1 128 166	1 236 013
Nunavik (17)	57,4	21,7	33,0	3 059	4 815	5 861	7 794
Terres-Cries (18)	23,1	22,8	-0,8	5 812	7 157	8 792	8 725
Ensemble du Québec	2,3	2,5	5,2	6 420 500	6 567 806	6 734 309	7 081 233

Notes :

1. Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 62-63.
2. Les données du MSSS sont corrigées pour tenir compte du sous-dénombrement, du surdénombrement et des résidents non permanents (Pelletier, 1996).
3. Malgré la correction des effectifs de population, il se peut que pour certaines régions, il subsiste une sous-estimation. C'est particulièrement le cas de la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James où l'effectif corrigé en 1991, soit 8 725, est nettement inférieur à celui estimé dans le cadre d'une étude sur la mortalité des huit villages cris, soit 9 567 (St-Pierre, 1995).

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

6. TAUX DE FÉCONDITÉ SELON L'ÂGE

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de naissances vivantes de mères d'un groupe d'âge déterminé à la population féminine totale de ce groupe d'âge au milieu de la période.

– L'indice synthétique de fécondité représente la somme des taux de fécondité par âge multipliée par l'amplitude des groupes d'âge (cinq ans en général).

Méthode de calcul :

$$\frac{\text{Nombre annuel moyen de naissances vivantes de mères d'un groupe d'âge, pour une période donnée} \times 1\ 000}{\text{Population féminine du même groupe d'âge au milieu de cette période}}$$


Sources : Numérateur : Fichier des naissances, MSSS.

Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : La fécondité des Québécoises s'est stabilisée au cours des dernières années. Après avoir connu, au milieu des années 80, un plancher de 1,4 enfant par femme, le nombre moyen d'enfants par femme se situe depuis le début des années 90 à un peu plus de 1,6.

- La fécondité suit sensiblement la même évolution d'un groupe d'âge à l'autre. Dans tous les groupes d'âge, la fécondité est à son plus bas niveau durant la période 1984-1986. La fécondité des femmes de 30 à 34 ans dépasse pour la première fois celle des 20-24 ans lors de la période 1993-1994.
- En 1990-1992, les deux régions autochtones (Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James) enregistrent les indices de fécondité les plus élevés, avec un nombre moyen d'enfants par femme supérieur à 3. Les régions de Lanaudière, des Laurentides, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec affichent également des valeurs nettement supérieures à la moyenne québécoise. Les régions de Québec et de Montréal-Centre montrent les indices les plus faibles.


1. Indice synthétique de fécondité, Québec, 1981-1983 à 1993-1994



2. Taux de fécondité selon l'âge, Québec, 1981-1983 à 1993-1994



3. Indice synthétique de fécondité selon la région, Québec, 1990-1992



4. Taux de fécondité selon l'âge de la mère et la région², Québec, 1990-1992 (taux annuel moyen pour 1 000)

Région	15-19 ans Taux	20-24 ans Taux	25-29 ans Taux	30-34 ans Taux	35-49 ans Taux	Indice synthétique ³	Nombre ⁴
Bas-Saint-Laurent (01)	11,9 (-)	81,1	131,4	71,1 (-)	8,0 (-)	1,58	2 461
Saguenay — Lac-Saint-Jean	12,6 (-)	97,5 (+)	147,8 (+)	64,6 (-)	6,5 (-)	1,70	3 861
Québec (03)	10,8 (-)	54,5 (-)	113,8 (-)	76,1	8,7 (-)	1,40	7 502
Mauricie — Bois-Francs (04)	19,3 (+)	92,4 (+)	137,5 (+)	67,4 (-)	6,2 (-)	1,67	5 892
Estrie (05)	20,9 (+)	99,6 (+)	138,7 (+)	66,8 (-)	7,5 (-)	1,73	3 696
Montréal-Centre (06)	20,4 (+)	59,8 (-)	99,1 (-)	83,3 (+)	14,6 (+)	1,52	24 102
Outaouais (07)	28,5 (+)	94,6 (+)	129,9	73,9 (-)	9,3	1,76	4 603
Abitibi-Témiscamingue (08)	28,8 (+)	126,0 (+)	140,0 (+)	60,8 (-)	6,6 (-)	1,86	2 375
Côte-Nord (09)	28,2 (+)	94,8 (+)	126,0	62,2 (-)	6,3 (-)	1,64	1 499
Nord-du-Québec (10)	19,8	144,4 (+)	139,5	53,5 (-)	5,7 (-)	1,86	336
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	17,1	88,7 (+)	132,3	62,8 (-)	6,6 (-)	1,59	1 316
Chaudière-Appalaches (12)	9,3 (-)	80,2	153,9 (+)	82,0 (+)	8,1 (-)	1,74	5 033
Laval (13)	11,3 (-)	68,7 (-)	139,0 (+)	89,7 (+)	10,3	1,69	4 607
Lanaudière (14)	16,7	107,4 (+)	161,5 (+)	79,8	7,8 (-)	1,93	5 350
Laurentides (15)	17,6	107,9 (+)	153,1 (+)	77,4	8,4 (-)	1,89	6 071
Montréal (16)	15,5 (-)	87,1 (+)	145,4 (+)	81,7 (+)	8,8 (-)	1,77	17 877
Nunavik (17)	194,1 (+)	239,6 (+)	192,8 (+)	94,9	*24,8 (+)	3,92	278
Terres-Cries (18)	142,5 (+)	215,7 (+)	179,0 (+)	121,1 (+)	*13,6	3,50	279
Ensemble du Québec	17,7	79,2	128,6	77,7	9,8	1,65	97 138

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 64-65.
 - En 1990 et 1991, un nombre élevé de naissances survenues en Ontario auraient été attribuées aléatoirement à l'Outaouais. Les taux de fécondité de l'Outaouais représentent donc une estimation.
 - Nombre moyen d'enfants par femme.
 - Nombre annuel moyen de naissances vivantes.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

7. PROPORTION DE LA POPULATION DONT LA LANGUE PARLÉE À LA MAISON N'EST NI LE FRANÇAIS NI L'ANGLAIS

Définition¹ : Proportion de la population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais par rapport à la population totale non institutionnelle ayant déclaré une seule langue parlée à la maison.

– Dans ce cas-ci, le terme « allophone » désigne la population utilisant une langue autre que le français ou l'anglais.

Méthode de calcul :


$$\frac{\text{Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (réponses uniques)}}{\text{Population non institutionnelle ayant déclaré une seule langue parlée à la maison}} \times 100$$

Sources : Recensements de Statistique Canada.


Faits saillants : La proportion de la population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais a légèrement augmenté au Québec, passant de 4,6 % en 1981 à 5,4 % en 1991.

- En 1991, la langue la plus répandue chez les allophones est l'italien, suivie de l'espagnol, du grec et de l'arabe. L'arabe, l'espagnol, le chinois et le vietnamien étaient, entre 1981 et 1991, en nette progression, alors que l'italien et le grec diminuaient.
- Dans la plupart des régions, la proportion de la population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais est très faible en 1991. Toutefois, cinq régions se démarquent et dépassent largement la proportion de l'ensemble du Québec. Pour trois d'entre elles, Terres-Cries-de-la-Baie-James, Nunavik et Côte-Nord, c'est la présence autochtone qui explique la proportion élevée de la population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais. Pour les deux autres, Montréal-Centre et Laval, c'est plutôt le fort contingent d'immigrants qui hausse les proportions d'allophones.


1. Proportion de la population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais, Québec, 1981, 1986 et 1991



2. Répartition de la population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais selon la langue parlée à la maison, Québec, 1981 et 1991



3. Proportion de la population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais selon la région, Québec, 1991



4. Proportion de la population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais selon la région, Québec, 1986 et 1991

Région	1986		1991	
	Nombre	%	Nombre	%
Bas-Saint-Laurent (01)	70	0,0	115	0,1
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	585	0,2	495	0,2
Québec (03)	3 360	0,6	3 995	0,7
Mauricie — Bois-Francis (04)	2 490	0,6	3 100	0,7
Estrie (05)	960	0,4	2 115	0,8
Montréal-Centre (06)	205 815	13,0	265 560	15,9
Outaouais (07)	3 735	1,6	6 250	2,3
Abitibi-Témiscamingue (08)	1 425	1,0	920	0,6
Côte-Nord (09)	5 315	5,2	6 265	6,2
Nord-du-Québec (10)	190	0,9	240	1,2
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	320	0,3	425	0,4
Chaudière-Appalaches (12)	380	0,1	455	0,1
Laval (13)	16 530	6,3	27 320	9,1
Lanaudière (14)	2 300	0,8	2 600	0,8
Laurentides (15)	2 735	0,9	3 395	0,9
Montérégie (16)	17 620	1,7	25 520	2,2
Nunavik (17)	4 820	91,2	6 255	83,5
Terres-Cries (18)	6 045	92,7	5 930	92,5
Ensemble du Québec	274 695	4,5	360 955	5,4

Note :

1. Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p 66-67.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

8. PROPORTION D'IMMIGRANTS

Définition¹ : Proportion d'immigrants reçus par rapport à la population totale non institutionnelle.

- Un immigrant reçu est une personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne par naissance, mais à laquelle les autorités canadiennes de l'immigration ont accordé le droit de vivre au Canada en permanence.
- Ne sont pas inclus les enfants nés au Canada de parents immigrants, les revendicateurs du statut de réfugié et les titulaires d'un permis de séjour pour étudiant, d'un permis de travail ou d'un permis ministériel.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population des immigrants reçus}}{\text{Population totale non institutionnelle}} \times 100$

Sources : Recensements de Statistique Canada.


Faits saillants : En 1991, les immigrants constituaient 8,7 % de la population québécoise. D'un recensement à l'autre, la proportion d'immigrants a peu fluctué : 8,7 % en 1991 comparativement à 8,3 % en 1981.


- Si au cours des dernières années, la proportion d'immigrants a peu changé, il en va tout autrement du lieu de provenance. En 1991, le continent européen dominait encore largement, mais sa part s'amenuisait (62 % en 1981 comparativement à 49 % en 1991) au profit du continent asiatique, qui progressait fortement (12 % en 1981 contre 22 % en 1991).
- Les immigrants constituaient en 1991 24 % de la population de la région de Montréal-Centre et 13 % de celle de Laval. Ils sont toutefois relativement peu nombreux dans la plupart des autres régions.

1. Proportion d'immigrants, Québec, 1981, 1986 et 1991



2. Répartition des immigrants selon le lieu de provenance, Québec, 1981 et 1991



3. Proportion d'immigrants selon la région², Québec, 19914. Proportion d'immigrants selon la région², Québec, 1986 et 1991

Région	1986		1991	
	Nombre	%	Nombre	%
Bas-Saint-Laurent (01)	1 235	0,6	985	0,5
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	1 710	0,6	1 640	0,6
Québec (03)	12 845	2,2	13 125	2,2
Mauricie — Bois-Francs (04)	5 325	1,2	5 680	1,2
Estrie (05)	8 150	3,2	8 380	3,2
Montréal-Centre (06)	373 755	21,6	411 455	23,6
Outaouais (07)	9 820	3,9	12 830	4,6
Abitibi-Témiscamingue (08)	2 150	1,5	1 890	1,3
Côte-Nord (09)	1 065	1,0	980	1,0
Nord-du-Québec (10)	215	1,0	175	0,9
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	605	0,5	320	0,3
Chaudière-Appalaches (12)	3 345	0,9	3 215	0,9
Laval (13)	29 955	10,7	41 700	13,4
Lanaudière (14)	5 140	1,9	6 630	2,0
Laurentides (15)	10 185	3,2	11 715	3,1
Montérégie (16)	61 420	5,7	69 435	5,9
Nunavik (17)	55	1,0	90	1,2
Terres-Cries ² (18)	25	0,3	n.d.	n.d.
Ensemble du Québec	527 000	8,2	590 255	8,7

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 68-69.
- Les questions sur la citoyenneté et l'immigration n'ont pas été posées dans les réserves indiennes et les établissements indiens qui ont été dénombrés à l'aide du questionnaire 2D du recensement de 1991. Conséquemment, les données ne sont pas présentées pour ces unités géographiques (Statistique Canada, 1993a).

n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

9. PROPORTION DE FAMILLES MONOPARENTALES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS

Définition¹ : Proportion de familles de recensement composées d'un parent seul avec au moins un enfant jamais marié de 17 ans ou moins, par rapport au total des familles de recensement avec au moins un enfant jamais marié de 17 ans ou moins.

- Les familles monoparentales sont constituées d'un parent seul avec au moins un enfant jamais marié, relié biologiquement ou par adoption ou provenant d'unions précédentes et vivant dans le même logement.
- Les familles de recensement sont constituées d'un couple actuellement marié, d'un couple vivant en union libre ou d'un parent seul demeurant avec au moins un enfant jamais marié.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Nombre de familles monoparentales avec au moins un enfant âgé de 17 ans ou moins}}{\text{Total des familles de recensement avec au moins un enfant âgé de 17 ans ou moins}} \times 100$

Sources : Recensements de Statistique Canada.


Faits saillants : Au Québec, de plus en plus de familles avec enfants de moins de 18 ans sont monoparentales : 18 % en 1991 comparativement à 14 % en 1981.

- Un peu plus de 80 % des familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans ont une femme comme parent.
- En 1991, près d'une famille sur quatre vivait en situation de monoparentalité dans les régions de Montréal-Centre et du Nunavik. La monoparentalité était moins répandue dans les régions du Nord-du-Québec, de la Chaudière-Appalaches et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.
- Entre 1981 et 1991, la proportion de familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans s'est accrue d'une façon considérable au Québec (30 %). L'augmentation était particulièrement importante dans les régions de la Côte-Nord, du Saguenay—Lac-Saint-Jean et de la Chaudière-Appalaches.


1. Proportion de familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans, Québec, 1981, 1986 et 1991



2. Répartition des familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans selon le sexe du parent, Québec, 1981, 1986 et 1991



3. Proportion de familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans selon la région, Québec, 1991



4. Proportion de familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans selon la région, Québec, 1981, 1986 et 1991

Région	1981	1986	1991		Variation de 1981 à 1991 (%)
	%	%	Nombre	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	10,2	12,9	4 095	14,2	39
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	9,6	12,7	6 135	14,0	46
Québec (03)	13,4	17,0	14 320	18,3	37
Mauricie — Bois-Francs (04)	12,1	15,2	10 865	17,0	40
Estrie (05)	13,2	17,2	6 600	13,9	5
Montréal-Centre (06)	20,1	24,4	50 550	24,9	24
Outaouais (07)	15,0	17,8	7 490	18,2	21
Abitibi-Témiscamingue (08)	13,4	14,9	3 475	15,1	13
Côte-Nord (09)	10,6	14,7	2 505	15,7	48
Nord-du-Québec (10)	6,8	8,6	330	9,5	40
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	10,3	13,6	2 175	14,3	39
Chaudière-Appalaches (12)	8,6	10,7	6 520	12,4	44
Laval (13)	12,1	15,2	7 030	16,3	35
Lanaudière (14)	9,7	12,9	7 005	13,5	38
Laurentides (15)	12,5	15,0	8 930	15,8	26
Montérégie (16)	12,1	15,0	28 130	16,1	33
Nunavik (17)	24,6	25,7	305	24,3	-1
Terres-Cries (18)	9,7	12,4	155	12,7	30
Ensemble du Québec	13,8	16,9	166 615	17,9	30

Note :

1. Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 70-71.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

10. PROPORTION DE LA POPULATION VIVANT SEULE

Définition¹ : Proportion des personnes de 15 ans et plus vivant seules dans leur logement par rapport au total des personnes de 15 ans et plus dans les ménages privés.

- Le nombre de personnes vivant seules dans leur logement est équivalent au nombre de ménages privés ne comprenant qu'une personne.
- Un ménage privé est formé d'une ou de plusieurs personnes occupant un logement privé. Le nombre de ménages privés est égal au nombre de logements privés.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population de 15 ans et plus vivant seule}}{\text{Population de 15 ans et plus dans les ménages privés}} \times 100$

Sources : Recensements de Statistique Canada.


Faits saillants : La proportion de la population vivant seule est à la hausse au Québec. En 1991, 12,1 % de la population québécoise vit seule comparativement à 8,7 % en 1981. Si cette hausse s'observe chez les deux sexes, les femmes sont toujours plus nombreuses en proportion que les hommes à vivre seules.

- Le pourcentage de personnes vivant seules tend à augmenter avec l'âge, particulièrement chez les femmes.
- En 1991, seules les régions de Montréal-Centre, de Québec et de l'Estrie présentent des pourcentages supérieurs à la moyenne québécoise. La région des Terres-Cries-de-la-Baie-James enregistre de loin la proportion la plus faible.
- Entre 1986 et 1991, quatre régions ont connu une augmentation au moins deux fois supérieure à celle observée pour le Québec dans son ensemble (20 %) : Nunavik, Saguenay—Lac-Saint-Jean, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et Côte-Nord. Une seule région, les Terres-Cries-de-la-Baie-James, a vu sa proportion diminuer.


1. Proportion de la population vivant seule selon le sexe, Québec, 1981, 1986 et 1991



2. Proportion de la population vivant seule selon l'âge et le sexe, Québec, 1991



3. Proportion de la population vivant seule selon la région, Québec, 1991



4. Proportion de la population vivant seule selon la région, Québec, 1986 et 1991

Région	1986		1991		Variation de 1986 à 1991 (%)
	Nombre	%	Nombre	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	11 695	7,4	15 875	10,2	38
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	11 685	5,6	17 330	8,1	46
Québec (03)	47 560	10,4	65 630	13,4	29
Mauricie — Bois-Francs (04)	31 920	9,2	43 280	12,1	31
Estrie (05)	19 850	10,2	25 900	12,7	24
Montréal-Centre (06)	224 760	15,7	255 555	17,6	12
Outaouais (07)	16 000	8,1	21 785	9,9	22
Abitibi-Témiscamingue (08)	8 990	8,4	12 055	10,6	27
Côte-Nord (09)	4 430	5,8	6 340	8,1	41
Nord-du-Québec (10)	900	6,0	1 085	7,5	27
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	4 385	5,1	6 070	7,4	43
Chaudière-Appalaches (12)	18 195	6,9	25 185	9,1	33
Laval (13)	14 675	6,6	21 010	8,5	29
Lanaudière (14)	12 710	6,1	19 385	7,7	26
Laurentides (15)	18 885	7,8	26 950	9,3	19
Montréal (16)	63 560	7,7	86 260	9,4	22
Nunavik (17)	130	4,1	345	7,5	85
Terres-Cries (18)	155	3,0	140	2,6	- 14
Ensemble du Québec	510 485	10,1	650 180	12,1	20

Note :

1. Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 72-73.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

11. PROPORTION DE LA POPULATION AYANT DÉMÉNAGÉ

Définition¹ : Proportion de la population de 5 ans et plus ayant déménagé depuis le recensement précédent par rapport à la population totale de 5 ans et plus non institutionnelle.

– Les personnes ayant déménagé sont celles qui, le jour du recensement, demeuraient à une autre adresse que celle où elles résidaient cinq ans plus tôt.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population de 5 ans et plus habitant à une autre adresse cinq ans auparavant}}{\text{Population totale de 5 ans et plus non institutionnelle}} \times 100$

Sources : Recensements de Statistique Canada.


Faits saillants : Au Québec, sur une période de cinq ans, un peu plus de quatre personnes sur dix déménagent. En 1991, la proportion de la population ayant déménagé au cours des cinq dernières années était de 44 %, comparativement à 41 % en 1986.

- Parmi les personnes ayant déménagé au cours de la période 1986-1991, un peu plus de la moitié résidaient auparavant dans la même municipalité, 42 % habitaient une autre municipalité du Québec, 3 % vivaient dans une autre province canadienne et 5 % demeuraient à l'extérieur du Canada.
- En 1991, la proportion de la population ayant déménagé au cours des cinq dernières années était particulièrement élevée (plus de 47 %) dans les régions du Nunavik, de Montréal-Centre, des Laurentides et de l'Outaouais. La population était à l'opposé plus sédentaire (moins de 35 %) dans les régions de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et des Terres-Cries-de-la-Baie-James.
- Entre les périodes 1981-1986 et 1986-1991, la population ayant déménagé a augmenté de plus de 15 % dans les régions du Nunavik, des Terres-Cries-de-la-Baie-James, des Laurentides et de Lanaudière.


1. Proportion de la population ayant déménagé, Québec, 1981, 1986 et 1991



2. Répartition de la population ayant déménagé selon le lieu de résidence cinq ans auparavant, Québec, 1981, 1986 et 1991



3. Proportion de la population ayant déménagé selon la région, Québec, 1991



4. Proportion de la population ayant déménagé selon la région, Québec, 1986 et 1991

Région	1986		1991		Variation de 1986 à 1991
	Nombre	%	Nombre	%	%
Bas-Saint-Laurent (01)	62 995	32,7	60 485	32,2	-1
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	91 770	35,3	94 100	35,8	1
Québec (03)	216 845	39,9	239 445	42,3	6
Mauricie — Bois-Francis (04)	144 555	34,8	161 805	37,9	9
Estrie (05)	96 620	41,1	103 810	42,7	4
Montréal-Centre (06)	792 685	48,5	810 835	49,6	2
Outaouais (07)	105 665	45,0	122 525	47,5	6
Abitibi-Témiscamingue (08)	56 375	42,3	59 570	43,4	3
Côte-Nord (09)	33 640	35,2	34 765	36,5	4
Nord-du-Québec (10)	9 725	49,8	7 855	43,2	-13
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	26 300	25,4	24 095	24,6	-3
Chaudière-Appalaches (12)	91 840	28,3	102 240	30,5	8
Laval (13)	106 920	40,8	129 340	44,8	10
Lanaudière (14)	98 230	38,6	137 420	45,1	17
Laurentides (15)	120 060	41,1	166 535	48,1	17
Montréal (16)	408 430	40,7	489 510	44,6	10
Nunavik (17)	2 170	45,8	4 155	64,2	40
Terres-Cries (18)	1 945	26,0	1 940	32,6	25
Ensemble du Québec	2 466 770	41,0	2 750 430	43,6	6

Note :

1. Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 74-75.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

12. PROPORTION DE LA POPULATION AYANT MOINS DE NEUF ANS DE SCOLARITÉ

Définition⁷ : Proportion de la population de 15 ans et plus dont le plus haut niveau de scolarité atteint (terminé ou non) est inférieur à la neuvième année par rapport à la population totale non institutionnelle de 15 ans et plus.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population de 15 ans et plus ayant moins de neuf ans de scolarité}}{\text{Population totale de 15 ans et plus non institutionnelle}} \times 100$

Sources : Recensements de Statistique Canada.


Faits saillants : Le pourcentage de personnes faiblement scolarisées diminue au Québec : 26 % en 1981 comparativement à 20 % en 1991. Même si cette baisse est observée pour les deux sexes, les femmes sont toujours plus nombreuses que les hommes à avoir moins de neuf ans de scolarité.

- La proportion de personnes ayant moins de neuf ans de scolarité s'accroît avec l'âge. En 1991, 6 % des 15-24 ans avaient moins d'une neuvième année comparativement à 55 % chez les 65 ans et plus.
- En 1991, les régions des Terres-Cries-de-la-Baie-James, du Nunavik et de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine enregistraient des valeurs supérieures à 30 %. En contrepartie, on observait les plus faibles proportions de personnes ayant moins de neuf ans de scolarité dans les régions de Laval et de Québec.
- Depuis 1981, la proportion de la population ayant moins de neuf ans de scolarité a diminué de 24 % au Québec. Cette tendance à la baisse fut observée dans toutes les régions, plus particulièrement au Nunavik avec une chute de 40 %.


1. Proportion de la population ayant moins de neuf ans de scolarité selon le sexe, Québec, 1981, 1986 et 1991



2. Proportion de la population ayant moins de neuf ans de scolarité selon l'âge, Québec, 1981, 1986 et 1991



3. Proportion de la population ayant moins de neuf ans de scolarité selon la région, Québec, 1991



4. Proportion de la population ayant moins de neuf ans de scolarité, selon la région, Québec, 1981, 1986 et 1991

Région	1981 %	1986 %	1991		Variation de 1981 à 1991 %
			Nombre	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	31,6	29,1	40 430	25,5	-19
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	24,3	22,3	41 405	19,2	-21
Québec (03)	23,0	20,4	82 460	16,6	-28
Mauricie — Bois-Francis (04)	29,6	27,3	87 095	24,1	-19
Estrie (05)	28,8	26,5	45 635	22,1	-23
Montréal-Centre (06)	25,9	23,2	285 380	19,5	-25
Outaouais (07)	25,6	22,6	40 240	18,3	-28
Abitibi-Témiscamingue (08)	32,3	29,0	28 180	24,9	-23
Côte-Nord (09)	26,6	25,9	18 325	23,2	-13
Nord-du-Québec (10)	23,3	22,8	2 645	18,3	-22
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	36,2	33,3	26 120	31,4	-13
Chaudière-Appalaches (12)	32,6	29,9	69 725	25,0	-23
Laval (13)	19,1	17,7	40 290	16,3	-15
Lanaudière (14)	28,3	25,5	52 280	20,6	-27
Laurentides (15)	27,4	24,7	58 500	20,0	-27
Montérégie (16)	24,2	21,9	167 910	18,1	-25
Nunavik (17)	69,1	57,8	1 925	41,7	-40
Terres-Cries (18)	52,8	56,7	1 940	44,5	-16
Ensemble du Québec	26,4	23,9	1 090 485	20,1	-24

Note :

1. Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 76-77.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

13. PROPORTION DE NAISSANCES VIVANTES DE MÈRES FAIBLEMENT SCOLARISÉES

Définition¹ : Proportion de naissances vivantes de mères ayant moins de onze ans de scolarité par rapport au total des naissances vivantes dont la scolarité de la mère est connue.

– Le nombre d'années de scolarité correspond au plus haut niveau de scolarité atteint avec succès.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Nombre de naissances vivantes de mères ayant moins de onze ans de scolarité}}{\text{Total des naissances vivantes de mères dont la scolarité est connue}} \times 100$

Sources : Fichier des naissances, MSSS.


Faits saillants : La proportion des naissances de mères faiblement scolarisées a diminué de façon considérable au Québec. En 1981-1983, 24 % des naissances provenaient de mères ayant moins de onze ans de scolarité alors qu'en 1993-1994, cette proportion était de 15 %. Durant le même intervalle, la proportion de naissances de mères ayant moins de neuf ans de scolarité passait de 8 % à 4 %.

- L'importance des naissances de mères peu scolarisées varie selon l'âge des femmes. Chez celles de moins de 20 ans, dont la scolarité n'est pas nécessairement terminée, la proportion est élevée; elle a augmenté entre 1981-1983 et 1984-1986, et depuis, elle se maintient autour de 74 %. À l'inverse, les femmes âgées de 20 ans et plus présentent des proportions beaucoup plus faibles, qui continuent toujours à diminuer.
- En 1990-1992, les quatre régions présentant les proportions les plus élevées sont : Terres-Cries-de-la-Baie-James, Nunavik, Côte-Nord et Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine. À l'opposé, les proportions les plus faibles se retrouvent dans les régions de Québec et de Laval.
- Dans toutes les régions, la proportion de naissances de mères faiblement scolarisées a diminué de façon importante entre 1981-1983 et 1990-1992.


1. Proportion de naissances vivantes de mères faiblement scolarisées selon le niveau de scolarité, Québec, 1981-1983 à 1993-1994



2. Proportion de naissances vivantes de mères faiblement scolarisées selon l'âge, Québec, 1981-1983 à 1993-1994



3. Proportion de naissances vivantes de mères faiblement scolarisées selon la région³, Québec, 1990-1992



4. Proportion de naissances vivantes de mères faiblement scolarisées selon la région³, Québec, 1981-1983 à 1990-1992

Région	1981-1983	1984-1986	1987-1989	1990-1992		Variation de 1981-1983 à 1990-1992 (%)
	%	%	%	Nombre ⁴	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	27,6 (+)	22,9 (+)	18,1 (+)	2 354	16,3 (+)	-41
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	22,9 (-)	19,7 (-)	15,2 (-)	3 783	13,2 (-)	-42
Québec (03)	17,5 (-)	13,3 (-)	11,0 (-)	7 282	9,3 (-)	-47
Mauricie — Bois-Francis (04)	25,7 (+)	21,1	16,4	5 795	15,3	-40
Estrie (05)	25,7 (+)	21,4	16,3	3 620	14,3 (-)	-44
Montréal-Centre (06)	24,6 (+)	21,4	18,9 (+)	23 010	17,5 (+)	-29
Outaouais (07)	27,4 (+)	23,0 (+)	19,0 (+)	3 643	18,2 (+)	-34
Abitibi-Témiscamingue (08)	26,1 (+)	24,4 (+)	20,6 (+)	2 202	20,2 (+)	-23
Côte-Nord (09)	32,0 (+)	31,6 (+)	30,9 (+)	1 429	27,2 (+)	-15
Nord-du-Québec (10)	30,3 (+)	26,1 (+)	25,8 (+)	318	19,7 (+)	-35
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	34,1 (+)	29,8 (+)	26,5 (+)	1 196	24,5 (+)	-28
Chaudière-Appalaches (12)	26,9 (+)	22,4 (+)	17,3	4 940	13,8 (-)	-49
Laval (13)	16,7 (-)	41,6 (+)	10,0 (-)	4 452	9,9 (-)	-41
Lanaudière (14)	22,6 (-)	18,5 (-)	15,0 (-)	5 238	13,7 (-)	-40
Laurentides (15)	22,5 (-)	18,7 (-)	14,8 (-)	5 788	13,5 (-)	-40
Montérégie (16)	22,1 (-)	18,2 (-)	15,0 (-)	17 158	12,9 (-)	-42
Nunavik (17)	79,4 (+)	77,7 (+)	67,6 (+)	158	59,1 (+)	-26
Terres-Cries (18)	83,1 (+)	77,3 (+)	72,8 (+)	264	65,8 (+)	-21
Ensemble du Québec	24,0	21,4	16,8	92 630	15,1	-37

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 78-79.
 - La proportion de naissances dont la scolarité de la mère est inconnue se situe entre 3 % et 5 % pour les années 1981 à 1994.
 - En 1990 et 1991, un nombre élevé de naissances survenues en Ontario auraient été attribuées aléatoirement à l'Outaouais. Les proportions de l'Outaouais représentent donc une estimation.
 - Nombre annuel moyen de naissances vivantes de mères dont la scolarité est connue.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

14. PROPORTION DE LA POPULATION INOCCUPÉE

Définition¹ : Proportion de la population de 15 ans et plus inoccupée par rapport à la population totale de 15 ans et plus non institutionnelle.

– La population inoccupée est constituée des personnes *inactives* et de celles qui sont en *chômage*. Les *inactifs* regroupent les personnes qui ne cherchaient pas un travail et les personnes qui ne pouvaient travailler en raison d'une maladie chronique ou d'une incapacité. Par ailleurs, les individus étaient considérés comme *chômeurs* s'ils n'avaient pas d'emploi durant la semaine de référence mais étaient à la recherche d'un emploi au cours des quatre semaines précédentes, attendaient un rappel à la suite d'une mise à pied temporaire ou attendaient un emploi devant débiter dans les quatre prochaines semaines. De plus, ils devaient être disponibles pour travailler dans la semaine de référence.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population de 15 ans et plus inoccupée}}{\text{Population totale de 15 ans et plus non institutionnelle}} \times 100$

Sources : Recensements et enquêtes sur la population active de Statistique Canada.


Faits saillants : Depuis 1993, la proportion de personnes inoccupées connaît au Québec une légère baisse, passant de 45,9 % à 44,8 % en 1995. Cette tendance récente vient interrompre l'augmentation observée depuis 1990. Auparavant, l'inoccupation n'avait cessé de régresser depuis le début des années 80.

- En 1995, l'inoccupation était plus élevée chez les plus âgés et chez les plus jeunes. Les femmes sont plus touchées que les hommes, sauf chez les 45-64 ans.
- Dans trois régions, au moins la moitié de la population était inoccupée au recensement de 1991 : Terres-Cries-de-la-Baie-James, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et Bas-Saint-Laurent. À l'opposé, quatre régions avaient un pourcentage inférieur à 40 % : Outaouais, Laval, Montérégie et Nord-du-Québec.
- Entre les recensements de 1981 et de 1991, la proportion de personnes inoccupées dans l'ensemble du Québec a baissé de 6 %. Cette réduction a été observée dans toutes les régions, sauf à Montréal-Centre, où l'on a noté une légère augmentation. La région qui a connu la plus forte diminution est le Nunavik.


1. Proportion de la population inoccupée², Québec, 1981 à 1995



2. Proportion de la population inoccupée³ selon l'âge et le sexe, Québec, 1995



3. Proportion de la population inoccupée⁴ selon la région⁵, Québec, 1991



4. Proportion de la population inoccupée⁴ selon la région⁵, Québec, 1981, 1986 et 1991

Région	1981 %	1986 %	1991		Variation de 1981 à 1991 %
			Nombre	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	54,6	53,4	79 040	49,9	-9
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	53,7	52,8	104 990	48,7	-9
Québec (03)	46,1	45,2	203 325	40,9	-11
Mauricie — Bois-Francs (04)	50,0	49,6	168 910	46,7	-7
Estrie (05)	46,5	46,0	89 505	43,3	-7
Montréal-Centre (06)	42,8	44,7	652 035	44,5	4
Outaouais (07)	44,0	41,6	82 435	37,5	-15
Abitibi-Témiscamingue (08)	48,6	48,8	53 090	46,8	-4
Côte-Nord (09)	51,2	51,9	35 960	45,6	-11
Nord-du-Québec (10)	41,4	43,1	5 685	39,3	-5
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	57,0	57,6	47 145	56,6	-1
Chaudière-Appalaches (12)	48,1	46,1	115 885	41,6	-14
Laval (13)	39,1	38,4	93 435	37,7	-4
Lanaudière (14)	44,4	44,0	102 575	40,5	-9
Laurentides (15)	46,1	45,4	120 175	41,1	-11
Montérégie (16)	41,7	41,6	357 575	38,6	-7
Nunavik (17)	66,6	58,9	2 250	48,9	-27
Terres-Cries (18)	64,5	68,7	2 495	57,0	-12
Ensemble du Québec	45,3	45,3	2 322 455	42,7	-6

Notes :

1. Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 80-81.
2. Non désaisonnalisée.
3. Moyenne annuelle non désaisonnalisée.
4. Mois de mai non désaisonnalisé.
5. La proportion de la population inoccupée peut être obtenue à partir de deux sources, le recensement et l'enquête sur la population active. Les données par région sociosanitaire ne sont disponibles qu'à partir des recensements de 1981, de 1986 et de 1991.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

15. TAUX DE CHÔMAGE

Définition¹ : Proportion de la population de 15 ans et plus en chômage par rapport à la population active de 15 ans et plus non institutionnelle.

- Les individus étaient considérés comme *chômeurs* s'ils n'avaient pas d'emploi durant la semaine de référence mais étaient à la recherche d'un emploi au cours des quatre semaines précédentes, attendaient un rappel à la suite d'une mise à pied temporaire ou attendaient un emploi devant débiter dans les quatre prochaines semaines. De plus, ils devaient être disponibles pour travailler dans la semaine de référence.
- Le nombre de chômeurs ne correspond pas au nombre de prestataires de l'assurance-chômage. De plus, on ne doit pas additionner les assistés sociaux aux chômeurs ou à toute autre catégorie liée à l'activité puisque les assistés sociaux peuvent se retrouver parmi les actifs ou les inactifs.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population de 15 ans et plus en chômage}}{\text{Population active de 15 ans et plus non institutionnelle}} \times 100$

Sources : Recensements et enquêtes sur la population active de Statistique Canada.


Faits saillants : Le taux annuel moyen de chômage est à la baisse au Québec. Après avoir connu une augmentation régulière entre 1989 et 1993, le taux de chômage a diminué, passant de 13,1 % en 1993 à 11,3 % en 1995. Cependant, il est encore plus élevé qu'en 1989.


- En 1995, le taux de chômage diminue avec l'âge chez les personnes des deux sexes. Quel que soit le groupe d'âge, les hommes sont plus touchés par le chômage que les femmes.
- Au recensement de 1991, la région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine enregistrait le taux de chômage le plus élevé, soit 25 %. Cinq autres régions avaient des taux supérieurs à 15 % : Terres-Cries-de-la-Baie-James, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent et Saguenay—Lac-Saint-Jean. Le taux le plus faible était observé dans la région de la Chaudière-Appalaches (9,3 %).
- Entre les recensements de 1981 et de 1991, le taux de chômage a augmenté de 11 % dans l'ensemble du Québec. Les augmentations les plus fortes se sont produites dans les régions des Terres-Cries-de-la-Baie-James, du Nunavik, du Nord-du-Québec et de Montréal-Centre. Les baisses les plus importantes ont été observées dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de Québec et de l'Outaouais.

1. Taux de chômage², Québec, 1981 à 1995



2. Taux de chômage³ selon l'âge et le sexe, Québec, 1995



3. Taux de chômage⁴ selon la région⁵, Québec, 19914. Taux de chômage⁴ selon la région⁵, Québec, 1981, 1986 et 1991

Région	1981 %	1986 %	1991		Variation de 1981 à 1991 %
			Nombre	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	18,0	19,6	15 250	16,1	-11
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	17,0	19,4	20 300	15,5	-9
Québec (03)	11,8	12,9	32 205	9,9	-16
Mauricie — Bois-Francs (04)	12,8	14,7	28 140	12,7	-1
Estrie (05)	11,5	12,0	14 640	11,1	-3
Montréal-Centre (06)	9,1	12,4	123 095	13,2	45
Outaouais (07)	11,7	12,3	15 180	9,9	-15
Abitibi-Témiscamingue (08)	13,6	17,1	12 680	17,4	28
Côte-Nord (09)	18,7	23,6	8 970	17,3	-7
Nord-du-Québec (10)	9,0	13,8	1 375	13,5	51
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	22,5	27,4	12 050	25,1	11
Chaudière-Appalaches (12)	11,7	11,7	16 700	9,3	-21
Laval (13)	7,6	9,4	17 320	10,1	33
Lanaudière (14)	9,3	10,6	18 420	10,9	17
Laurentides (15)	11,1	12,8	23 840	12,2	10
Montérégie (16)	8,5	10,4	65 070	10,3	21
Nunavik (17)	9,1	13,4	405	14,7	61
Terres-Cries (18)	11,9	30,3	450	19,3	62
Ensemble du Québec	10,9	13,0	426 845	12,1	11

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs socio-sanitaires. Définitions et interprétations*, p. 82-83.
 - Non désaisonnalisé.
 - Moyenne annuelle non désaisonnalisée.
 - Mois de mai non désaisonnalisé.
 - Le taux de chômage peut être obtenu à partir de deux sources, le recensement et l'enquête sur la population active. Les données par région socio-sanitaire ne sont disponibles qu'à partir des recensements de 1981, de 1986 et de 1991.
- # L'estimation n'est pas publiée par Statistique Canada étant donné que l'erreur d'échantillonnage est trop élevée (Statistique Canada, 1994a).

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

16. PROPORTION DE LA POPULATION VIVANT SOUS LE SEUIL DE FAIBLE REVENU

Définition¹ : Proportion de la population à faible revenu dans les ménages privés par rapport à la population totale dans les ménages privés.

- Cette définition est celle employée par Statistique Canada sous l'appellation « seuils de faible revenu » ou « taux SFR ». Sont considérés comme étant à faible revenu les ménages dont le revenu brut annuel durant l'année civile précédant l'enquête est inférieur à celui nécessaire à la satisfaction de certains besoins de base (nourriture, vêtement et logement). La méthode fixe une série de seuils en tenant compte de la taille du ménage et de la taille de la région de résidence².


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population dans les ménages privés à faible revenu}}{\text{Population totale dans les ménages privés}} \times 100$

Sources : Recensements et enquêtes sur les finances des consommateurs de Statistique Canada.


Faits saillants : En 1994, une personne sur cinq vivait dans la pauvreté au Québec. Entre 1989 et 1994, le pourcentage d'individus à faible revenu a connu une tendance générale à la hausse, passant de 17 % à 20 %. Le pourcentage observé en 1989 était le plus faible depuis 1980.

- Selon le recensement, en 1990, une plus forte proportion de femmes vivaient sous le seuil de faible revenu, et cela, quel que soit le groupe d'âge. Le pourcentage de personnes de faible revenu était davantage élevé chez les personnes de 65 ans et plus et moindre chez celles de 25 à 44 ans.
- En 1990, selon le recensement, la région de Montréal-Centre se démarquait avec la proportion la plus élevée (28 %) alors que la plus faible était enregistrée dans la région du Nord-du-Québec (10 %).
- Entre 1985 et 1990, d'un recensement à l'autre, le pourcentage de personnes à faible revenu a diminué de 14 % dans l'ensemble du Québec. Une seule région, les Terres-Cries-de-la-Baie-James, a connu une augmentation pendant cette période. Dans les autres, la diminution oscille entre 47 % pour le Nunavik et 5 % pour Montréal-Centre.


1. Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu, Québec, 1980 à 1994



2. Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu selon l'âge et le sexe, Québec, 1990



3. Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu selon la région³, Québec, 1990



4. Proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu selon la région³, Québec, 1985 et 1990

Région	1985	1990		Variation de 1985 à 1990
	%	Nombre	%	%
Bas-Saint-Laurent (01)	22,8	36 225	18,1	-20
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	20,4	44 205	15,7	-23
Québec (03)	22,3	114 650	19,2	-14
Mauricie — Bois-Francs (04)	22,0	82 405	18,2	-18
Estrie (05)	22,1	46 300	17,8	-19
Montréal-Centre (06)	29,2	481 510	27,8	-5
Outaouais (07)	20,7	46 235	16,5	-20
Abitibi-Témiscamingue (08)	19,9	22 390	15,0	-24
Côte-Nord (09)	19,4	15 610	15,3	-21
Nord-du-Québec (10)	12,4	1 930	9,7	-22
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	23,3	20 375	19,5	-16
Chaudière-Appalaches (12)	18,5	50 645	14,1	-24
Laval (13)	17,8	50 100	16,2	-9
Lanaudière (14)	17,4	47 895	14,5	-17
Laurentides (15)	20,8	59 535	15,9	-23
Montérégie (16)	17,4	171 725	14,6	-16
Nunavik (17)	31,7	1 290	16,8	-47
Terres-Cries (18)	13,0	1 385	16,6	28
Ensemble du Québec	22,3	1 294 490	19,2	-14

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs socio-sanitaires. Définitions et interprétations*, p. 84-85.
- Afin de permettre les comparaisons temporelles, les données présentées sont toutes basées sur les seuils révisés de 1986 indexés selon l'indice des prix à la consommation. En ce qui a trait aux données du recensement, celles-ci sont tirées d'une demande spéciale faite à Statistique Canada. Elles portent sur l'ensemble de la population, incluant celle habitant les terres et réserves indiennes, ce qui n'est pas le cas dans les publications de Statistique Canada sur le revenu basées aussi sur le recensement (MSSS, 1996a).
- La proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu peut être obtenue à partir de deux sources, le recensement et l'enquête sur les finances des consommateurs. Les données par région socio-sanitaire ne sont disponibles qu'à partir des recensements de 1986 et de 1991. Les estimations pour les territoires comprenant une proportion importante d'autochtones, en particulier les régions des Terres-Cries-de-la-Baie-James et du Nunavik, doivent être interprétées avec prudence. La mesure de suffisance du revenu est conceptuellement moins appropriée dans le cas de ces communautés (Statistique Canada, 1992a). Ainsi, certaines activités de subsistance, telles la chasse, la pêche ou le troc, qui sont encore très répandues dans certaines communautés autochtones, ne sont pas prises en compte dans le calcul des nécessités de base ni dans l'établissement des revenus (Statistique Canada, 1994c; Brassard, 1987).

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

17. PROPORTION D'ASSISTÉS SOCIAUX

Définition¹ : Proportion de la population ayant bénéficié de l'aide de dernier recours, durant une période donnée, par rapport à la population totale âgée de moins de 65 ans pendant cette période.

– Le montant de l'aide accordée à une famille ou une personne seule correspond au manque à gagner entre un seuil déterminé pour satisfaire les besoins essentiels et l'ensemble des avoirs du ménage. Les avoirs du ménage comprennent les biens immobiliers personnels ainsi que les avoirs liquides.

Méthode de calcul : $\frac{\text{Population ayant bénéficié de l'aide de dernier recours}}{\text{Population totale âgée de moins de 65 ans}} \times 100$


Sources : Numérateur : Direction de la recherche, de l'évaluation et de la statistique, ministère de la Sécurité du revenu.

Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : Depuis 1990, la proportion d'assistés sociaux augmente de façon constante au Québec. Après une baisse régulière entre 1985 et 1990, le pourcentage est passé de 8,9 % en 1990 à 12,5 % en 1996, soit une croissance de 40 %.


- La proportion d'assistés sociaux diminue avec l'âge, passant, en 1996, de 18 % chez les moins de 6 ans à 5 % chez les 55 ans et plus. À l'exception des 55 ans et plus, toutes les catégories d'âge ont connu une augmentation entre 1991 et 1996.
- En 1996, trois régions enregistrent des pourcentages au-dessus de 15 % : Nunavik, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et Montréal-Centre. À l'opposé, cinq régions ont des proportions inférieures à 10 % : Nord-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Laval, Montérégie et Terres-Cries-de-la-Baie-James.
- Entre 1991 et 1996, la proportion d'assistés sociaux a augmenté dans toutes les régions, à l'exception du Nunavik où l'on a observé une diminution de 9 %. Des hausses supérieures à 40 % se sont produites dans les régions de Laval, de Montréal-Centre et de Lanaudière.

1. Proportion d'assistés sociaux², Québec, 1981 à 1996



2. Proportion d'assistés sociaux² selon l'âge¹, Québec, 1991 et 1996



3. Proportion d'assistés sociaux selon la région^{3,4}, Québec, 19964. Proportion d'assistés sociaux selon la région^{3,4}, Québec, 1991 à 1996

Région	1991 %	1992 %	1993 %	1994 %	1995 %	1996		Variation de 1991 à 1996 %
						Nombre	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	11,8	12,2	12,8	13,1	13,0	22 737	13,0	10
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	9,7	10,8	12,1	12,6	12,5	31 599	12,2	25
Québec (03)	8,6	9,5	10,0	10,5	10,8	62 369	11,0	28
Mauricie — Bois-Francs (04)	10,9	12,0	12,9	13,4	13,3	56 096	13,4	22
Estrie (05)	10,1	11,4	12,3	12,4	12,5	31 141	12,7	26
Montréal-Centre (06)	12,2	14,0	15,7	16,5	17,1	275 659	17,5	44
Outaouais (07)	9,6	10,6	11,3	11,6	12,0	36 245	12,6	31
Abitibi-Témiscamingue (08)	9,4	11,0	12,0	12,0	11,4	15 461	10,8	14
Côte-Nord (09)	10,0	10,3	11,0	11,7	11,2	10 099	10,5	4
Nord-du-Québec (10)	5,7	5,6	7,0	6,9	6,4	1 179	6,1	7
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	16,3	16,9	17,9	18,3	18,7	17 209	19,1	18
Chaudière-Appalaches (12)	7,2	7,6	8,0	8,1	8,0	27 373	8,1	13
Laval (13)	5,4	6,5	7,3	7,9	8,2	25 519	8,2	53
Lanaudière (14)	7,3	8,4	9,4	10,0	10,2	36 896	10,5	44
Laurentides (15)	8,7	10,0	11,0	11,4	11,3	45 244	11,2	30
Montérégie (16)	6,8	7,8	8,6	9,0	9,0	108 306	9,0	33
Nunavik (17)	21,7	22,4	20,9	22,4	21,6	1 812	19,8	-9
Terres-Cries (18)	7,7	8,9	10,3	11,1	10,9	792	9,9	29
Ensemble du Québec	9,4	10,6	11,6	12,2	12,4	813 218	12,5	33

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 86-87. À noter que les personnes de 65 ans et plus sont prises en compte au numérateur (elles représentent environ 1 % des bénéficiaires). D'autre part, le croisement selon le sexe n'est pas présenté, étant donné qu'à partir de 1991, l'information n'est disponible que pour le requérant et le conjoint.
- Données pour le mois de mars.
- À partir de 1994, les données régionales ne comprennent pas les assistés sociaux hébergés, qui représentent moins de 1 % de l'ensemble des assistés sociaux.
- Les données régionales sont présentées pour le mois de mars, à l'exception des régions du Nord-du-Québec, du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James où les données sont fournies pour le mois d'avril entre 1991 et 1995. Avant 1996, les estimations pour ces trois régions ne pouvaient être obtenues qu'à partir des bilans statistiques par municipalités disponibles pour le mois d'avril seulement.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

18. PROPORTION DE FUMEURS RÉGULIERS

Définition¹ : Proportion de la population de 15 ans et plus fumant régulièrement la cigarette par rapport à la population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés.

– Les fumeurs réguliers correspondent aux personnes qui déclarent fumer au moins une cigarette par jour, à tous les jours et excluent les fumeurs occasionnels.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Fumeurs réguliers de 15 ans et plus}}{\text{Population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés}} \times 100$

Sources : Enquêtes de Santé Québec, enquêtes de Santé Canada et enquêtes de Statistique Canada.


Faits saillants : Au Québec en 1994, 30 % des personnes de 15 ans et plus étaient fumeurs réguliers. Au cours de la période de 1978 à 1991, cette proportion, généralement plus élevée chez les hommes que chez les femmes, a présenté une tendance constante à la baisse. En 1993 et 1994, on assiste à une légère remontée chez les hommes.

- En 1993, les proportions sont plus élevées chez les 25-44 ans et plus faibles chez les 65 ans et plus. Elles sont également supérieures chez les hommes par rapport aux femmes, et ceci, particulièrement chez les 45 ans et plus.
- En 1993, cinq régions se distinguent du Québec par des proportions significativement plus élevées; ce sont le Nunavik, les Terres-Cries-de-la-Baie-James, Lanaudière, la Côte-Nord et les Laurentides.
- En 1987, deux régions présentaient des proportions significativement supérieures à celle de l'ensemble du Québec (Outaouais et Abitibi-Témiscamingue) tandis que deux autres offraient des valeurs inférieures (Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches). Entre 1987 et 1993, la proportion a diminué au Québec ainsi que dans huit régions, soit : Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, Saguenay—Lac-Saint-Jean, Mauricie—Bois-Francs, Montérégie, Montréal-Centre et Québec.


1. Proportion de fumeurs réguliers selon le sexe, Québec, 1978 à 1994



2. Proportion de fumeurs réguliers selon l'âge et le sexe, Québec, 1992-1993



3. Proportion de fumeurs réguliers selon la région, Québec, 1992-1993



4. Proportion de fumeurs réguliers selon la région, Québec, 1987 et 1992-1993

Région	1987	1992-1993		Variation de 1987 à 1992-1993
	%	Nombre estimé	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	30,7 (-)	47 052	30,0	
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	37,1	70 073	32,2	↓
Québec (03)	31,9	134 556	27,2	↓
Mauricie — Bois-Francis (04)	37,2	115 439	31,7	↓
Estrie (05)	31,7	63 671	30,5	
Montréal-Centre ² (06)	33,9	415 742	28,6	↓
Outaouais (07)	41,0 (+)	79 623	34,5	↓
Abitibi-Témiscamingue (08)	39,4 (+)	39 436	33,9	↓
Côte-Nord (09)	38,2	28 046	35,5 (+)	
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	37,4	26 694	32,3	↓
Chaudière-Appalaches (12)	28,4 (-)	77 415	27,7	
Laval (13)	34,1	77 597	30,2	
Lanaudière (14)	39,9	98 966	36,2 (+)	
Laurentides (15)	38,9	106 568	34,7 (+)	
Montérégie ² (16)	36,0	286 195	29,9	↓
Nunavik ³ (17)	n.d.	2 825	68,9 (+)	n.a.
Terres-Cries ⁴ (18)	n.d.	2 502	41,7 (+)	n.a.
Ensemble du Québec⁵	35,0	1 667 074	30,4	↓

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 88-89.
- Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
- Données pour 1992 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik.
- Données pour 1991 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James.
- Ce total ne comprend pas les régions 17 et 18, celles-ci ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes à des moments différents. Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

↓ ↑ Diminution ou augmentation significative entre les deux périodes.

n.a. Non applicable.

n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

19. PROPORTION DE LA POPULATION PRENANT 14 CONSOMMATIONS D'ALCOOL ET PLUS PAR SEMAINE

Définition¹ : Proportion de la population de 15 ans et plus prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine par rapport à la population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés.

– Selon Santé Québec, une consommation d'alcool équivaut à 360 ml (12 oz) de bière, 42 ml (1,0 à 1,5 oz) de spiritueux ou 120 à 150 ml (4 à 5 oz) de vin.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population de 15 ans et plus prenant 14 consommations et plus par semaine}}{\text{Population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés}} \times 100$

Sources : Enquêtes de Santé Québec, enquêtes de Santé Canada et enquêtes de Statistique Canada.


Faits saillants : Au Québec en 1994, 5 % des personnes de 15 ans et plus prenaient 14 consommations d'alcool et plus par semaine. Cette proportion est plus faible que celle observée en 1985 (6 %). La proportion des hommes qui prennent 14 consommations d'alcool et plus par semaine est, peu importe l'année, au moins cinq fois plus grande que celle des femmes.

- En 1993, à tous les âges, les hommes présentent des valeurs supérieures à celles des femmes et c'est dans le groupe des hommes de 25 à 44 ans que la proportion est la plus élevée.
- En 1993, deux régions se distinguent de façon significative de l'ensemble du Québec : Lanaudière avec une proportion supérieure (9 %) et la Montérégie avec un pourcentage inférieur (5 %).
- En 1987, aucune des régions ne se démarquait significativement du Québec. Entre 1987 et 1993, une seule région, Lanaudière, a vu sa proportion augmenter significativement. À l'inverse, deux régions, Montréal-Centre et la Montérégie, présentent une diminution significative de buveurs de 14 consommations et plus.


1. Proportion de la population prenant 14 consommations² et plus par semaine selon le sexe, Québec, 1985 à 1994



2. Proportion de la population prenant 14 consommations et plus par semaine selon l'âge et le sexe, Québec, 1992-1993



3. Proportion de la population prenant 14 consommations et plus par semaine selon la région, Québec, 1992-1993



4. Proportion de la population prenant 14 consommations et plus par semaine selon la région, Québec, 1987 et 1992-1993

Région	1987 %	1992-1993		Variation de 1987 à 1992-1993
		Nombre estimé	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	6,4	10 871	6,8	
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	7,0	18 165	8,2	
Québec (03)	7,2	36 287	7,3	
Mauricie — Bois-Francs (04)	6,2	22 000	6,0	
Estrie (05)	7,4	14 052	6,7	
Montréal-Centre ³ (06)	8,5	84 889	5,8	↓
Outaouais (07)	9,9	15 354	6,7	
Abitibi-Témiscamingue (08)	8,2	7 959	6,8	
Côte-Nord (09)	7,3	6 306	7,9	
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	*5,7	5 053	6,1	
Chaudière-Appalaches (12)	7,8	16 704	5,9	
Laval (13)	*6,3	19 791	7,8	
Lanaudière (14)	*5,8	23 935	8,8 (+)	↑
Laurentides (15)	*6,7	23 937	7,8	
Montérégie ³ (16)	7,0	48 100	5,0 (-)	↓
Nunavik (17)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terres-Cries (18)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Ensemble du Québec⁴	7,4	353 402	6,4	↓

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 90-91.
 - On note de légères différences entre la définition de Santé Québec pour 1987 et 1993 et celles utilisées dans les autres enquêtes. En 1994, la définition de base est la même, sauf qu'il n'est pas fait mention de quantité et qu'on ajoute un verre de boisson au vin (« cooler ») à la liste (Statistique Canada, 1995a). En 1991, un verre équivalait à une bière (Statistique Canada, 1994b). En 1985, on entend par verre d'alcool une chopine de bière (Statistique Canada, 1987a).
 - Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
 - Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 ↓ ↑ Diminution ou augmentation significative entre les deux périodes.
 n.a. Non applicable.
 n.d. Non disponible.
 * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

20. PROPORTION DE LA POPULATION N'AYANT JAMAIS CONSOMMÉ DE DROGUES ILLICITES

Définition¹ : Proportion de la population de 15 ans et plus n'ayant jamais consommé de drogues illicites au cours de leur vie par rapport à la population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés.

– Les drogues généralement concernées sont le cannabis ou le haschich, la cocaïne, le crack, les amphétamines ou les stimulants, les substances psychédéliques, les barbituriques, les tranquillisants et les opiacés (héroïne, opium, etc.). Les médicaments doivent avoir été consommés sans ordonnance médicale.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population de 15 ans et plus n'ayant jamais consommé de drogues}}{\text{Population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés}} \times 100$

Sources : Enquête de Santé Québec.


Faits saillants : Au Québec en 1993, plus des deux tiers des personnes de 15 ans et plus rapportent n'avoir jamais consommé de drogues illicites au cours de leur vie. Les femmes sont légèrement plus nombreuses (72 %) à n'avoir jamais consommé de drogues que les hommes (66 %).

- En 1993, la proportion des abstinentes chez les 45 ans et plus est supérieure à celle observée dans les autres groupes d'âge. C'est uniquement dans le groupe des 25-44 ans que les femmes ont des pourcentages nettement plus élevés que les hommes.
- Trois régions se distinguent significativement du Québec dans son ensemble. La Côte-Nord et l'Outaouais affichent des proportions inférieures à celle du Québec tandis que le Bas-Saint-Laurent présente une valeur plus élevée.
- En 1993, chez les hommes, aucune région ne présente de différence significative par rapport au Québec. Chez les femmes, seule la région de la Côte-Nord affiche une proportion inférieure d'abstinentes à vie de drogues illicites.


1. Proportion de la population n'ayant jamais consommé de drogues illicites selon le sexe, Québec, 1992-1993



2. Proportion de la population n'ayant jamais consommé de drogues illicites selon l'âge et le sexe, Québec, 1992-1993



3. Proportion de la population n'ayant jamais consommé de drogues illicites selon la région, Québec, 1992-1993



4. Proportion de la population n'ayant jamais consommé de drogues illicites selon le sexe et la région, Québec, 1992-1993

Région	Hommes	Femmes	Total	
	%	%	Nombre estimé	Total %
Bas-Saint-Laurent (01)	69,5	75,8	111 792	72,7 (+)
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	67,0	74,0	147 159	70,4
Québec (03)	61,1	70,4	316 708	65,8
Mauricie — Bois-Francs (04)	70,1	73,5	257 263	71,8
Estrie (05)	66,3	70,4	140 014	68,4
Montréal-Centre ² (06)	65,8	70,3	960 289	68,1
Outaouais (07)	62,0	65,8	141 991	63,9 (-)
Abitibi-Témiscamingue (08)	63,5	71,5	76 203	67,4
Côte-Nord (09)	63,2	64,4 (-)	48 936	63,8 (-)
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	66,4	75,6	56 461	70,9
Chaudière-Appalaches (12)	69,4	74,8	196 501	72,1
Laval (13)	69,6	74,4	181 035	72,0
Lanaudière (14)	64,9	69,5	179 613	67,2
Laurentides (15)	65,3	68,2	200 666	66,7
Montréal ² (16)	68,6	73,4	663 409	71,0
Nunavik (17)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terres-Cries (18)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Ensemble du Québec³	66,4	71,5	3 678 039	68,9

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs socio-santaires. Définitions et interprétations*, p. 92-93.
 - Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
 - Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

21. PROPORTION DE LA POPULATION PRÉSENTANT UN EXCÈS DE POIDS

Définition¹ : Proportion de la population de 15 ans et plus présentant un indice de masse corporelle égal ou plus élevé que 27, par rapport à la population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés.

- L'indice de masse corporelle (IMC) est défini à partir de l'indice Quételet basé sur le rapport entre le poids (en kilogrammes) et le carré de la taille d'une personne (en mètres).
- Selon Santé Québec, l'excès de poids correspond à des seuils différents selon le groupe d'âge. Il réfère à la valeur 27 et plus pour les 20-80 ans, à la valeur 25 et plus pour les 15-19 ans, et à la valeur 29 et plus pour les 81 ans et plus².


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population avec excès de poids de 15 ans et plus}}{\text{Population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés}} \times 100$

Sources : Enquêtes de Santé Québec.


Faits saillants : Au Québec en 1993, une personne sur quatre de 15 ans et plus présente un excès de poids. Cette proportion constitue une hausse par rapport à 1987 (19 %). Les hommes présentent, lors des deux enquêtes, des proportions d'excès de poids supérieures à celles des femmes.

- En 1993, on constate que l'excès de poids est plus fréquent chez les hommes de 45-64 ans et chez les femmes de 65 ans et plus. Pour tous les groupes d'âge, à l'exception des 65 ans et plus, les proportions sont plus élevées chez les hommes que chez les femmes.
- En 1993, trois régions présentent des valeurs significativement plus élevées que celle de l'ensemble du Québec : Terres-Cries-de-la-Baie-James, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et Outaouais.
- En 1987, les régions de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et de l'Outaouais présentaient déjà des proportions significativement supérieures à celle du Québec. Entre 1987 et 1993, à l'exception de Lanaudière et des Laurentides, toutes les régions ont présenté un accroissement de leur proportion de personnes avec excès de poids.


1. Proportion de la population présentant un excès de poids selon le sexe, Québec, 1987 et 1992-1993



2. Proportion de la population présentant un excès de poids selon l'âge et le sexe, Québec, 1992-1993



3. Proportion de la population présentant un excès de poids selon la région, Québec, 1992-1993



4. Proportion de la population présentant un excès de poids selon la région, Québec, 1987 et 1992-1993

Région	1987 %	1992-1993		Variation de 1987 à 1992-1993
		Nombre estimé	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	18,7	37 292	23,6	↑
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	17,1	50 984	23,7	↑
Québec (03)	16,0 (-)	107 416	21,5	↑
Mauricie — Bois-Francs (04)	19,6	92 292	25,3	↑
Estrie (05)	18,3	50 834	24,6	↑
Montréal-Centre ³ (06)	19,7	337 011	23,3	↑
Outaouais (07)	23,7 (+)	65 777	29,4 (+)	↑
Abitibi-Témiscamingue (08)	20,5	32 671	28,1	↑
Côte-Nord (09)	19,5	22 147	28,1	↑
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	24,1 (+)	25 803	31,5 (+)	↑
Chaudière-Appalaches (12)	17,7	66 751	23,6	↑
Laval (13)	18,3	68 392	27,0	↑
Lanaudière (14)	21,9	62 082	22,9	
Laurentides (15)	21,6	71 815	23,5	
Montréal ³ (16)	19,7	260 320	27,1	↑
Nunavik (17)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terres-Cries ⁴ (18)	n.d.	2 363	60,6 (+)	n.a.
Ensemble du Québec⁵	19,4	1 351 588	24,7	↑

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs socio-santaires. Définitions et interprétations*, p. 94-95.
 - Ces normes sont celles utilisées pour 1987 et 1992-1993 et portent sur la population de 15 ans et plus, excluant les femmes enceintes (Audet, 1996).
 - Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
 - Données pour 1991 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James.
 - Ce total ne comprend pas la région 18, celle-ci ayant fait l'objet d'une enquête distincte à un moment différent. Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 ↓ ↑ Diminution ou augmentation significative entre les deux périodes.
 n.a. Non applicable.
 n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

22. PROPORTION DES OCCUPANTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES UTILISANT UN DISPOSITIF DE RETENUE

Définition¹ : Proportion des occupants avant de véhicules automobiles² âgés de 5 ans et plus utilisant un dispositif de retenue par rapport au total des occupants avant de véhicules automobiles âgés de 5 ans et plus.

- Les dispositifs de retenue ne comprennent ici que les ceintures de sécurité avec baudrier et excluent les sièges d'auto pour enfants.
- Le terme « occupant » comprend seulement le conducteur et le passager assis à l'extrême droite de la banquette avant du véhicule.
- Les données sont disponibles selon la région d'observation et non selon la région de résidence des occupants.

Méthode de calcul :


$$\frac{\text{Occupants avant de véhicules automobiles de 5 ans et plus utilisant un dispositif de retenue}}{\text{Total des occupants avant de véhicules automobiles âgés de 5 ans et plus}} \times 100$$

Sources : Enquêtes de la Société de l'assurance automobile du Québec.


Faits saillants : Au Québec en 1995, 90 % des occupants avant des véhicules automobiles portaient leur ceinture de sécurité. Cette proportion a plus que doublé depuis 1981, année où elle se situait à seulement 44 %.

- Le taux de port de la ceinture a augmenté autant chez les conducteurs que chez les passagers avant, et ceci, tant en milieu urbain que sur les autoroutes et routes principales.
- En 1995, cinq régions présentent un taux de port de la ceinture significativement inférieur à celui du Québec : Saguenay—Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Estrie, Abitibi-Témiscamingue et Chaudière-Appalaches. À l'inverse, quatre régions présentent un taux significativement supérieur : Outaouais, Lanaudière, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et Mauricie—Bois-Francs.
- Entre 1990 et 1995, en milieu urbain pour l'ensemble du Québec, on observe une augmentation du port de la ceinture chez les passagers avant et chez les conducteurs. Cet accroissement significatif est présent dans presque toutes les régions et pour les deux types d'occupants.


1. Proportion des occupants³ de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue, Québec, 1981 à 1995



2. Proportion des occupants de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue selon le type d'occupant et le milieu, Québec, 1981 à 1995



3. Proportion des conducteurs en milieu urbain utilisant un dispositif de retenue selon la région d'observation⁴, Québec, 1995



4. Proportion des occupants de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue en milieu urbain selon le type d'occupant et la région d'observation⁴, Québec, 1990 et 1995

Région	Conducteurs			Passagers avant		
	1990 %	1995 %	Variation de 1990 à 1995	1990 %	1995 %	Variation de 1990 à 1995
Bas-Saint-Laurent (01)	86,0 (+)	86,5 (-)		85,0 (+)	86,2	
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	74,6 (-)	83,2 (-)	↑	73,8 (-)	82,5 (-)	↑
Québec (03)	83,0	90,4	↑	80,7	90,0	↑
Mauricie — Bois-Francs (04)	85,9 (+)	92,4 (+)	↑	82,9	89,8	↑
Estrie (05)	78,3 (-)	86,7 (-)	↑	72,7 (-)	84,8 (-)	↑
Montréal-Centre (06)	86,1 (+)	90,4	↑	81,7	88,3	↑
Outaouais (07)	88,8 (+)	94,6 (+)	↑	85,1 (+)	91,3 (+)	↑
Abitibi-Témiscamingue (08)	68,4 (-)	87,3 (-)	↑	67,5 (-)	84,5 (-)	↑
Côte-Nord (09)	82,0 (-)	89,0	↑	80,2	86,8	↑
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	88,0 (+)	92,8 (+)	↑	86,2 (+)	89,7	
Chaudière-Appalaches (12)	81,0 (-)	87,9 (-)	↑	81,0	87,6	↑
Laval (13)	84,6	90,2	↑	79,9	87,4	↑
Lanaudière (14)	82,1 (-)	92,9 (+)	↑	79,1	90,5 (+)	↑
Laurentides (15)	78,6 (-)	89,2	↑	77,9 (-)	87,0	↑
Montérégie (16)	83,5	90,8	↑	83,4 (+)	86,1	
Nunavik (17)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terres-Cries (18)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Ensemble du Québec	83,7	90,2	↑	80,9	87,8	↑

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 96-97. Voir aussi la section méthodologique du dossier statistique de 1995 sur l'évolution du taux d'utilisation des dispositifs de retenue dans les véhicules routiers au Québec de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ, 1995a).
- Avant 1988, les véhicules retenus étaient les véhicules de promenade (automobile, « jeep », camion léger) utilisés à des fins non commerciales et immatriculés au Québec. À partir de 1988, les véhicules de police, les ambulances, les petits véhicules commerciaux et les camions lourds sur les routes et autoroutes ont été ajoutés aux observations. Les camions lourds en milieu urbain ainsi que les taxis ne sont inclus dans aucune enquête (SAAQ, 1995a).
- Proportion obtenue à partir d'une pondération de résultats observés auprès des types d'occupants (conducteur, passager avant) et des milieux (urbain, routes et autoroutes). Cette donnée n'est pas disponible par région administrative.
- Les données sur les véhicules automobiles sont disponibles à l'échelle des régions administratives. La région administrative du Nord-du-Québec correspond à la somme de trois régions sociosanitaires : Nord-du-Québec, Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James. Les données ne sont donc pas disponibles pour ces trois régions prises séparément.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

↓ ↑ Diminution ou augmentation significative entre les deux périodes.

n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

23. PROPORTION DE NAISSANCES DE FAIBLE POIDS

Définition¹ : Proportion de naissances vivantes de poids inférieur à 2 500 grammes par rapport au total des naissances vivantes dont le poids à la naissance est connu.

– Les nouveau-nés pesant moins de 2 500 grammes à la naissance sont considérés comme étant de faible poids et ceux pesant moins de 1 500 grammes sont considérés comme étant de très faible poids.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Nombre de naissances vivantes de poids inférieur à 2 500 grammes}}{\text{Total des naissances vivantes dont le poids à la naissance est connu}} \times 100$

Sources : Fichier des naissances, MSSS.


Faits saillants : La proportion de naissances de faible poids est à la baisse au Québec jusqu'en 1993. Elle est passée de 6,4 % en 1981 à 5,7 % en 1993. On assiste cependant à une hausse entre 1993 et 1994. D'autre part, l'importance des naissances de très faible poids (moins de 1 500 grammes) est demeurée constante à près de 0,8 %.

- Ce sont les mères les plus jeunes et les plus âgées qui enregistrent les plus fortes proportions de naissances de faible poids. Sur l'ensemble de la période, les proportions ont diminué dans tous les groupes d'âge. Cependant, on observe une légère augmentation des naissances de faible poids au cours de la dernière période, sauf chez les mères de 20 à 34 ans.
- En 1990-1992, deux régions, l'Outaouais et Montréal-Centre, montrent des proportions de naissances de faible poids significativement plus élevées que celle de l'ensemble du Québec. À l'inverse, les régions des Terres-Cries-de-la-Baie-James, du Nunavik, de l'Estrie et de Québec obtiennent des valeurs significativement inférieures à la moyenne québécoise.
- Entre 1981-1983 et 1990-1992, la proportion de naissances de faible poids a diminué de 9 % à l'échelle du Québec. De très faibles baisses ont été enregistrées dans la Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord et le Saguenay—Lac-Saint-Jean. Les trois régions nordiques (Terres-Cries-de-la-Baie-James, Nunavik et Nord-du-Québec) ont bénéficié des réductions les plus fortes de la proportion de naissances de faible poids.


1. Proportion de naissances vivantes de faible poids et de très faible poids, Québec, 1981 à 1994³



2. Proportion de naissances vivantes de faible poids selon l'âge de la mère, Québec, 1981-1983 à 1993-1994³



3. Proportion de naissances vivantes de faible poids selon la région⁴, Québec, 1990-1992



4. Proportion de naissances vivantes de faible poids selon la région⁴, Québec, 1981-1983 à 1990-1992³

Région	1981-1983				1984-1986		1987-1989		1990-1992		Variation de 1981-1983 à 1990-1992 (%)
	%		%		%		%		%		
Bas-Saint-Laurent (01)	5,9 (-)	6,2	6,2	2 426	5,5	-7					
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	6,0 (-)	5,9	5,9	3 826	5,7	-4					
Québec (03)	6,1 (-)	5,9 (-)	6,0	7 458	5,4 (-)	-11					
Mauricie — Bois-Francs (04)	6,7	6,5	6,0	5 825	6,1	-9					
Estrie (05)	5,9 (-)	6,1	5,5 (-)	3 679	5,3 (-)	-10					
Montréal-Centre (06)	6,9 (+)	6,7 (+)	6,4 (+)	23 834	6,2 (+)	-9					
Outaouais (07)	7,9 (+)	7,4 (+)	6,9 (+)	4 504	6,5 (+)	-17					
Abitibi-Témiscamingue (08)	7,2 (+)	7,0 (+)	6,6	2 321	6,0	-17					
Côte-Nord (09)	6,2	5,3 (-)	5,6	1 485	5,9	-3					
Nord-du-Québec (10)	7,4	7,1	5,6	331	5,1	-30					
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	6,7	6,3	5,5	1 307	5,5	-18					
Chaudière-Appalaches (12)	5,6 (-)	5,2 (-)	5,8	5 001	5,5	-1					
Laval (13)	6,2	6,0	6,1	4 541	5,6	-10					
Lanaudière (14)	6,5	6,4	6,3	5 284	5,6	-14					
Laurentides (15)	6,5	6,4	6,5	6 021	6,1	-6					
Montréal (16)	6,2	6,0 (-)	5,9	17 679	5,8	-7					
Nunavik (17)	8,7	*6,9	6,8	263	*4,3 (-)	-50					
Terres-Cries (18)	*3,9 (-)	*4,0 (-)	*3,0 (-)	270	*1,2 (-)	-68					
Ensemble du Québec	6,4	6,3	6,1	96 056	5,9	-9					

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 98-99.
 - La proportion de naissances dont le poids est inconnu varie entre un minimum de 0,1 % en 1994 et un maximum de 1,5 % en 1989.
 - Avant 1988, les naissances de poids inférieur à 500 grammes ne sont pas comprises dans les statistiques publiées par le BSQ ainsi que dans les fichiers du MSSS. De 1988 à 1994, le nombre de naissances de poids inférieur à 500 grammes se situe entre 24 et 66 naissances.
 - En 1990 et 1991, un nombre élevé de naissances survenues en Ontario auraient été attribuées aléatoirement à l'Outaouais. Les proportions de l'Outaouais représentent donc une estimation.
 - Nombre annuel moyen de naissances vivantes dont le poids à la naissance est connu.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

24. TAUX DE GROSSESSES À L'ADOLESCENCE

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de grossesses d'adolescentes de 14 à 19 ans, à la population d'adolescentes de 14 à 19 ans au milieu de la période.

– Le nombre de grossesses à l'adolescence regroupe l'ensemble des événements suivants ayant fait l'objet d'une déclaration : les naissances vivantes, les mortinaissances survenues après au moins 20 semaines de gestation, les interruptions volontaires de grossesses (IVG) pratiquées en clinique ou à l'hôpital et les avortements spontanés².

Méthode de calcul :


$$\frac{\text{Nombre annuel moyen de grossesses d'adolescentes de 14 à 19 ans, pour une période donnée}}{\text{Total des adolescentes de 14 à 19 ans}} \times 1\,000$$

Sources : Numérateur : Fichiers des naissances et des mortinaissances, MSSS.
Direction générale de la planification et de l'évaluation, MSSS.
Fichier des services professionnels rémunérés à l'acte, RAMQ.
Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : Le taux de grossesses chez les adolescentes du Québec a peu varié depuis 1992. Après s'être accru de plus de 40 % entre 1980 et 1990, le taux est en très légère hausse depuis le début des années 90. À partir de 1985, la grossesse à l'adolescence se solde plus souvent par une interruption volontaire de grossesse que par une naissance.

- Le taux de grossesses augmente rapidement avec l'âge. En 1993-1994, il est près de trois fois plus élevé chez les filles de 18 à 19 ans que chez celles de 15 à 17 ans. Avant 18 ans, la grossesse se termine beaucoup plus fréquemment par une interruption volontaire de grossesse que par une naissance. Dans le groupe des 18-19 ans, on observe autant de naissances que d'interruptions volontaires de grossesses.
- En 1993-1994, des taux de grossesses à l'adolescence significativement supérieurs à la moyenne québécoise sont observés dans le Nunavik, dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James, à Montréal-Centre, en Abitibi-Témiscamingue, dans l'Outaouais et sur la Côte-Nord. Ces régions enregistrent également des taux de naissances significativement supérieurs à la moyenne. Mais c'est seulement à Montréal-Centre et au Nunavik que l'on retrouve aussi des taux d'interruptions volontaires de grossesses significativement plus élevés.


1. Taux de grossesses à l'adolescence selon l'issue, Québec, 1980, 1985, 1990, 1992 à 1994³



2. Taux de grossesses à l'adolescence selon l'âge⁴ et l'issue, Québec, 1993-1994



3. Taux de grossesses à l'adolescence selon la région, Québec, 1993-1994

4. Taux de grossesses à l'adolescence selon l'âge⁴, l'issue et la région, Québec, 1993-1994
(taux annuel moyen pour 1 000 adolescentes)

Région	14-17 ans	18-19 ans	Total				
			Naissances totales ⁵	Avortements spontanés	Interruptions volontaires de grossesses	Grossesses totales	
						Taux	Nombre ⁶
Bas-Saint-Laurent (01)	11,4 (-)	45,3 (-)	11,4 (-)	*1,0 (-)	9,5 (-)	21,9 (-)	201
Saguenay — Lac-Saint-Jean	14,6 (-)	63,0 (-)	11,3 (-)	2,1	16,0 (-)	29,4 (-)	414
Québec (03)	14,9 (-)	50,1 (-)	8,7 (-)	1,2 (-)	16,9 (-)	26,9 (-)	670
Mauricie — Bois-Francs (04)	16,7 (-)	62,6 (-)	15,4	2,0	13,6 (-)	31,0 (-)	629
Estrie (05)	20,1	71,4	16,6 (+)	*1,5 (-)	18,8	36,8	434
Montréal-Centre (06)	27,4 (+)	87,0 (+)	16,9 (+)	2,5 (+)	29,1 (+)	48,6 (+)	2 950
Outaouais (07)	22,1 (+)	81,5 (+)	18,8 (+)	2,8	20,5	42,1 (+)	496
Abitibi-Témiscamingue (08)	20,8	88,2 (+)	25,8 (+)	*2,4	14,0 (-)	42,1 (+)	304
Côte-Nord (09)	24,4 (+)	73,6	24,5 (+)	*3,4 (+)	13,0 (-)	40,9 (+)	199
Nord-du-Québec (10)	*11,1 (-)	*40,3 (-)	*10,3	**1,4	*8,9 (-)	20,6 (-)	22
Gaspésie — îles-de-la-Mad. (11)	17,9	60,7	15,4	*1,3 (-)	15,6 (-)	32,3	148
Chaudière-Appalaches (12)	10,2 (-)	39,3 (-)	7,4 (-)	1,3 (-)	10,6 (-)	19,3 (-)	329
Laval (13)	16,6 (-)	65,6	9,9 (-)	2,1	20,8	32,7 (-)	423
Lanaudière (14)	16,9 (-)	66,1	13,2	2,2	16,8 (-)	32,2 (-)	470
Laurentides (15)	18,2	74,0	15,3	1,9	18,8	35,9	578
Montérégie (16)	18,5	64,2 (-)	12,7 (-)	2,7 (+)	17,7 (-)	33,1 (-)	1 785
Nunavik (17)	138,1 (+)	261,1 (+)	146,6 (+)	**1,0	*31,9 (+)	179,5 (+)	90
Terres-Cries (18)	103,5 (+)	305,4 (+)	143,0 (+)	*1,4 (+)	*19,9	174,2 (+)	92
Ensemble du Québec	19,4	69,2	14,5	2,2	19,1	35,8	10 231

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 100-101.
 - Les fausses couches qui ne nécessitent pas d'intervention médicale, ainsi que les avortements pratiqués à l'étranger, échappent au calcul (Rochon, 1992).
 - Avant 1985, les interruptions volontaires de grossesses ne comprennent pas celles effectuées en CLSC.
 - Il s'agit de l'âge en fin de grossesse.
 - Naissances vivantes et mortinaissances.
 - Nombre annuel moyen de grossesses.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

25. PROPORTION DE FEMMES AYANT SUBI UN TEST DE PAP

Définition¹ : Proportion de la population féminine de 15 ans et plus déclarant avoir subi un test de dépistage du cancer du col utérin (test de Pap) au cours des deux dernières années par rapport à la population totale des femmes de 15 ans et plus dans les ménages privés.

Méthode de calcul :

$$\frac{\text{Population féminine de 15 ans et plus ayant subi un test de Pap au cours des deux dernières années}}{\text{Population féminine totale de 15 ans et plus dans les ménages privés}} \times 100$$

Sources : Enquêtes de Santé Québec.


Faits saillants : Au Québec en 1993, 66 % des femmes de 15 ans et plus ont subi un test de Pap au cours des deux dernières années. En 1987, la proportion était légèrement plus basse, soit 63 %.

- En 1993, on constate que plus de 80 % des femmes de 25 à 44 ans déclarent avoir subi un test de Pap tandis que moins de 32 % des femmes de 65 ans et plus ont fait de même.
- En 1993, une seule région, les Terres-Cries-de-la-Baie-James, se situe nettement sous la valeur québécoise avec 45 %. Trois régions présentent des proportions significativement supérieures à celle du Québec : Outaouais, Nunavik et Abitibi-Témiscamingue.
- En 1987, seule Laval (72 %) se démarquait avec une valeur significativement plus élevée. Entre 1987 et 1993, cinq régions ont connu une augmentation significative : Saguenay—Lac-Saint-Jean, Estrie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue et Lanaudière.


1. Proportion de femmes ayant subi un test de Pap, Québec, 1987 et 1992-1993



2. Proportion de femmes ayant subi un test de Pap selon l'âge, Québec, 1987 et 1992-1993



3. Proportion de femmes ayant subi un test de Pap selon la région, Québec, 1992-1993



4. Proportion de femmes ayant subi un test de Pap selon la région, Québec, 1987 et 1992-1993

Région	1987 %	1992-1993		Variation de 1987 à 1992-1993
		Nombre estimé	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	61,2	51 719	63,4	
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	58,2	70 394	64,3	↑
Québec (03)	63,3	173 048	66,5	
Mauricie — Bois-Francs (04)	58,7	119 068	63,3	
Estrie (05)	60,2	72 713	67,2	↑
Montréal-Centre ² (06)	62,9	492 138	64,0	
Outaouais (07)	66,7	87 489	74,3 (+)	↑
Abitibi-Témiscamingue (08)	65,7	41 875	72,0 (+)	↑
Côte-Nord (09)	68,4	27 799	70,7	
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	62,1	28 262	67,1	
Chaudière-Appalaches (12)	59,3	93 452	64,8	
Laval (13)	72,2 (+)	87 174	66,6	
Lanaudière (14)	61,8	97 337	71,0	↑
Laurentides (15)	60,7	106 534	67,8	
Montréal ² (16)	65,8	326 610	66,5	
Nunavik ³ (17)	n.d.	1 465	73,1 (+)	n.a.
Terres-Cries ⁴ (18)	n.d.	1 346	44,6 (-)	n.a.
Ensemble du Québec⁵	63,1	1 875 611	66,2	↑

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 102-103.
- Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
- Données pour 1992 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik.
- Données pour 1991 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James.
- Ce total ne comprend pas les régions 17 et 18, celles-ci ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes à des moments différents. Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

↓ ↑ Diminution ou augmentation significative entre les deux périodes.

n.a. Non applicable.

n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

26. PROPORTION DE FEMMES AYANT SUBI UNE MAMMOGRAPHIE

Définition¹ : Proportion de la population féminine de 50 ans et plus ayant subi une mammographie au cours des deux dernières années par rapport à la population féminine totale de 50 ans et plus dans les ménages privés.

– Cette mesure inclut les femmes ayant subi une mammographie comme examen de routine, c'est-à-dire pour des fins de dépistage, et celles qui ont passé l'examen pour des fins cliniques consécutivement à la détection ou à la suspicion d'un trouble au sein².

Méthode de calcul :


$\frac{\text{Population féminine de 50 ans et plus ayant subi une mammographie au cours des deux dernières années}}{\text{Population féminine totale de 50 ans et plus dans les ménages privés}} \times 100$

Sources : Enquêtes de Santé Québec, enquêtes de Santé Canada et enquêtes de Statistique Canada.


Faits saillants : Depuis 1987, le recours à la mammographie a doublé au Québec. En 1994, 44 % des femmes de 50 ans et plus ont subi une mammographie comparativement à 21 % en 1987.

- En 1987 et en 1993, les proportions diminuent avec l'âge. Par ailleurs, dans les trois groupes d'âge, on observe une augmentation de l'usage de la mammographie entre les deux enquêtes.
- En 1993, comparativement à l'ensemble du Québec, seule la Mauricie—Bois-Francs présente une valeur significativement inférieure et seule la Côte-Nord affiche une valeur supérieure.
- Entre 1987 et 1993, la majorité des régions ont enregistré une hausse significative de l'usage de la mammographie. On observe sensiblement les mêmes tendances chez les femmes de 50 à 69 ans que chez les femmes de 50 ans et plus.


1. Proportion de femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie, Québec, 1987 à 1994



2. Proportion de femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie selon l'âge, Québec, 1987 et 1992-1993



3. Proportion de femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie selon la région, Québec, 1992-1993



4. Proportion de femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie selon l'âge et la région, Québec, 1987 et 1992-1993

Région	50-69 ans ³			Variation de 1987 à 1992-1993	50 ans et plus			Variation de 1987 à 1992-1993
	1987	1992-1993			1987	1992-1993		
	%	Nombre estimé	%		%	Nombre estimé	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	*17,0	18 067	48,5	↑	*14,9	19 256	38,7	↑
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	**9,5	24 778	46,1	n.a.	*8,9 (-)	24 370	39,9	↑
Québec (03)	*16,4	61 368	41,3	↑	*13,5	57 681	39,4	↑
Mauricie — Bois-Francs (04)	*13,4 (-)	46 202	37,4 (-)	↑	*11,9 (-)	38 433	32,4 (-)	↑
Estrie (05)	*23,1	24 611	48,3	↑	*21,9	28 018	41,6	↑
Montréal-Centre ⁴ (06)	32,8 (+)	187 815	50,8	↑	27,1 (+)	215 530	44,0	↑
Outaouais (07)	*23,4	22 911	53,3	↑	*20,8	26 308	48,3	↑
Abitibi-Témiscamingue (08)	**11,1	11 788	56,3	n.a.	**10,5	13 654	48,4	n.a.
Côte-Nord (09)	**14,2	7 873	62,4 (+)	n.a.	**12,9	10 693	56,1 (+)	n.a.
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	*26,0	10 225	61,8 (+)	↑	*21,9	12 190	50,8	↑
Chaudière-Appalaches (12)	*18,5	30 307	53,5	↑	*14,8	32 147	42,8	↑
Laval (13)	*33,7	32 799	51,5	↑	*30,7	34 664	45,1	↑
Lanaudière (14)	**16,5	29 617	57,0	n.a.	**18,2	37 476	47,0	n.a.
Laurentides (15)	**24,2	33 800	50,8	n.a.	*21,9	39 590	43,2	↑
Montérégie ⁴ (16)	*19,7	104 252	50,0	↑	*18,9	128 749	43,7	↑
Nunavik (17)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terres-Cries (18)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Ensemble du Québec⁵	23,6	646 411	49,4	↑	20,7	718 761	42,8	↑

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 104-105.
 - En 1994, 19,7 % des Québécoises de 55 ans et plus donnent comme raison pour avoir subi leur dernière mammographie la présence d'un trouble au sein (Statistique Canada, 1995a).
 - Les femmes de 50 à 69 ans constituent le groupe qui risque le plus de développer un cancer du sein (MSSS, 1993).
 - Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
 - Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle du Québec.
 ↓ ↑ Diminution ou augmentation significative entre les deux périodes.
 * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.a. Non applicable.

n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

27. PROPORTION DE LA POPULATION PRÉSENTANT UN NIVEAU ÉLEVÉ DE DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

Définition¹ : Proportion de la population de 15 ans et plus présentant un niveau élevé de détresse psychologique par rapport à l'ensemble de la population de 15 ans et plus dans les ménages privés.

– La détresse psychologique est calculée à partir d'une version modifiée de l'échelle Psychiatric Symptom Index (PSI) de Ilfeld, composée de quatre facteurs : dépression, anxiété, troubles cognitifs et irritabilité. Le niveau élevé correspond au score de 22,6 et plus sur l'échelle.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population de 15 ans et plus ayant un niveau élevé de détresse psychologique}}{\text{Population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés}} \times 100$

Sources : Enquêtes de Santé Québec.


Faits saillants : Au Québec en 1993, 26 % des personnes de 15 ans et plus présentaient un niveau élevé de détresse psychologique. Cette proportion est plus élevée qu'en 1987 (19 %). Entre 1987 et 1993, elle a augmenté tant chez les hommes que chez les femmes. Elle est d'ailleurs, pour les deux enquêtes, plus élevée chez ces dernières.

- En 1993, la proportion de personnes avec un niveau élevé de détresse psychologique diminue avec l'âge. Dans tous les groupes d'âge, elle est plus forte chez les femmes.
- En 1993, seule la région de l'Abitibi-Témiscamingue se démarque de la valeur observée pour l'ensemble du Québec en présentant une proportion significativement plus élevée (31 %).
- Entre 1987 et 1993, on relève une hausse significative des pourcentages dans toutes les régions, sauf la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine.


1. Proportion de la population présentant un niveau élevé de détresse psychologique selon le sexe, Québec, 1987 et 1992-1993



2. Proportion de la population présentant un niveau élevé de détresse psychologique selon l'âge et le sexe, Québec, 1992-1993



3. Proportion de la population présentant un niveau élevé de détresse psychologique selon la région, Québec, 1992-1993



4. Proportion de la population présentant un niveau élevé de détresse psychologique selon la région, Québec, 1987 et 1992-1993

Région	1987	1992-1993		Variation de 1987 à 1992-1993
	%	Nombre estimé	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	17,9	39 147	24,6	↑
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	18,6	54 364	24,8	↑
Québec (03)	17,5	131 622	26,4	↑
Mauricie — Bois-Francs (04)	18,7	98 868	26,8	↑
Estrie (05)	17,9	52 006	24,8	↑
Montréal-Centre ² (06)	20,8	389 750	26,9	↑
Outaouais (07)	22,0	61 201	26,5	↑
Abitibi-Témiscamingue (08)	19,9	35 397	30,5 (+)	↑
Côte-Nord (09)	18,1	20 159	25,5	↑
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	21,0	20 634	25,2	↑
Chaudière-Appalaches (12)	18,9	75 006	26,5	↑
Laval (13)	20,8	68 535	26,6	↑
Lanaudière (14)	17,3	70 132	25,5	↑
Laurentides (15)	19,9	87 574	28,2	↑
Montréal ² (16)	18,8	245 622	25,3	↑
Nunavik (17)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terres-Cries ³ (18)	n.d.	1 516	25,2	n.a.
Ensemble du Québec⁴	19,4	1 450 015	26,3	↑

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 106-107.
 - Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
 - Données pour 1991 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James.
 - Ce total ne comprend pas la région 18, celle-ci ayant fait l'objet d'une enquête distincte à un moment différent. Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 ↓ ↑ Diminution ou augmentation significative entre les deux périodes.
 * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 n.a. Non applicable.
 n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

28. PROPORTION DE LA POPULATION PRÉSENTANT DES IDÉES SUICIDAIRES SÉRIEUSES

Définition¹ : Proportion de la population de 15 ans et plus ayant eu des idées suicidaires sérieuses au cours de la dernière année par rapport à l'ensemble de la population de 15 ans et plus dans les ménages privés.

– Les idées suicidaires comprennent à la fois les cas où il n'y a eu qu'idée sans geste suicidaire et les cas où la personne, en plus d'avoir eu des idées, déclare aussi avoir tenté de s'enlever la vie.

Méthode de calcul :


$$\frac{\text{Population de 15 ans et plus ayant eu des idées suicidaires sérieuses au cours de la dernière année}}{\text{Population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés}} \times 100$$

Sources : Enquêtes de Santé Québec.


Faits saillants : Au Québec en 1993, près de 4 % des personnes de 15 ans et plus rapportent avoir sérieusement songé au suicide au cours des douze derniers mois. Entre 1987 et 1993, cette situation s'est amplifiée tant chez les hommes que chez les femmes. D'autre part, on ne dénote pas de différence selon le sexe.

- En 1993, la proportion de personnes qui ont pensé à mettre fin à leurs jours est plus élevée chez les jeunes de 15 à 24 ans des deux sexes. Elle diminue progressivement à mesure que l'âge augmente. Les pourcentages sont semblables pour les deux sexes dans tous les groupes d'âge.
- En 1993, seule la région du Nunavik présente une proportion significativement plus élevée (8 %) que l'ensemble du Québec.
- En 1987, aucune des régions ne se différencie du Québec. Entre 1987 et 1993, on observe un accroissement significatif pour l'Estrie et la Mauricie—Bois-Francs.


1. Proportion de la population présentant des idées suicidaires sérieuses selon le sexe, Québec, 1987 et 1992-1993



2. Proportion de la population présentant des idées suicidaires sérieuses selon l'âge et le sexe, Québec, 1992-1993



3. Proportion de la population présentant des idées suicidaires sérieuses selon la région, Québec, 1992-1993



4. Proportion de la population présentant des idées suicidaires sérieuses selon la région, Québec, 1992-1993

Région	1987 %	1992-1993		Variation de 1987 à 1992-1993
		Nombre estimé	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	*2,0	5 605	*3,8	
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	3,1	8 254	*4,0	
Québec (03)	*3,7	19 253	*4,2	
Mauricie — Bois-Francs (04)	*2,4	14 641	4,3	↑
Estrie (05)	*3,3	10 800	5,6	↑
Montréal-Centre ² (06)	*3,8	47 364	*3,5	
Outaouais (07)	*3,5	8 071	*3,8	
Abitibi-Témiscamingue (08)	*4,3	5 466	5,2	
Côte-Nord (09)	*3,3	2 618	*3,6	
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	**2,6	2 865	*3,7	n.a.
Chaudière-Appalaches (12)	*3,3	10 374	*3,9	
Laval (13)	*3,3	6 858	*2,9	
Lanaudière (14)	*3,2	10 494	*4,1	
Laurentides (15)	**2,6	12 345	*4,3	n.a.
Montérégie ² (16)	*3,0	37 204	4,1	
Nunavik ³ (17)	n.d.	275	*8,3 (+)	n.a.
Terres-Cries ⁴ (18)	n.d.	183	*3,3	n.a.
Ensemble du Québec⁵	3,3	202 212	3,9	

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 108-109.
- Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
- Données pour 1992 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik.
- Données pour 1991 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James.
- Ce total ne comprend pas les régions 17 et 18, celles-ci ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes à des moments différents. Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

↓ ↑ Diminution ou augmentation significative entre les deux périodes.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.a. Non applicable.

n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

29. PROPORTION DE LA POPULATION INSATISFAITE DE SA VIE SOCIALE

Définition¹ : Proportion de la population se disant insatisfaite de sa vie sociale par rapport à la population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés.

- Les personnes insatisfaites de leur vie sociale incluent celles qui considèrent leur vie sociale comme plutôt insatisfaisante ou très insatisfaisante.
- Le niveau de satisfaction est fondé sur la perception qu'a chaque personne à l'égard de sa vie sociale en général.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population de 15 ans et plus insatisfaite de sa vie sociale}}{\text{Population de 15 ans et plus dans les ménages privés}} \times 100$

Sources : Enquêtes de Santé Québec.


Faits saillants : Une personne de 15 ans et plus sur neuf est insatisfaite de sa vie sociale en 1993. Ce pourcentage présente peu de différence avec 1987. Par ailleurs, la proportion est à peine plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

- L'insatisfaction de sa vie sociale ne présente pas de tendance particulière selon l'âge et le sexe.
- En 1993, seule la région de Montréal-Centre surpasse significativement la moyenne du Québec tandis que trois autres avaient des pourcentages inférieurs : Terres-Cries-de-la-Baie-James, Lanaudière et Saguenay—Lac-Saint-Jean.
- En 1987, Montréal-Centre présentait un pourcentage supérieur à l'ensemble du Québec alors que le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine avaient des proportions inférieures. Entre 1987 et 1993, trois régions ont connu une augmentation significative : Québec, Côte-Nord et Chaudière-Appalaches.


1. Proportion de la population insatisfaite de sa vie sociale selon le sexe, Québec, 1987 et 1992-1993



2. Proportion de la population insatisfaite de sa vie sociale selon l'âge et le sexe, Québec, 1992-1993



3. Proportion de la population insatisfaite de sa vie sociale selon la région, Québec, 1992-1993



4. Proportion de la population insatisfaite de sa vie sociale selon la région, Québec, 1987 à 1992-1993

Région	1987	1992-1993		Variation de 1987 à 1992-1993
	%	Nombre estimé	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	8,4 (-)	16 688	10,3	
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	8,7	18 537	8,3 (-)	
Québec (03)	9,5	62 522	12,4	↑
Mauricie — Bois-Francis (04)	9,0	38 392	10,3	
Estrie (05)	10,2	22 910	10,8	
Montréal-Centre ² (06)	13,7 (+)	195 478	13,2 (+)	
Outaouais (07)	10,9	28 942	12,4	
Abitibi-Témiscamingue (08)	8,8	12 878	10,9	
Côte-Nord (09)	8,1	8 998	11,1	↑
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	7,0 (-)	7 798	9,2	
Chaudière-Appalaches (12)	8,8	34 187	11,8	↑
Laval (13)	*10,9	27 929	10,8	
Lanaudière (14)	9,3	22 591	8,1 (-)	
Laurentides (15)	* 9,7	38 962	12,4	
Montréal ² (16)	9,4	100 495	10,3	
Nunavik ³ (17)	n.d.	371	9,4	n.a.
Terres-Cries ⁴ (18)	n.d.	252	4,3 (-)	n.a.
Ensemble du Québec ⁵	10,6	637 307	11,4	

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 110-111.
 - Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
 - Données pour 1992 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik.
 - Données pour 1991 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James.
 - Ce total ne comprend pas les régions 17 et 18, celles-ci ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes à des moments différents. Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.
- * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
- ↓ ↑ Diminution ou augmentation significative entre les deux périodes.
- n.d. Non disponible.
- n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

30. TAUX DE CRIMES CONTRE LA PERSONNE

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen d'infractions criminelles perpétrées contre les personnes, à la population totale au milieu de la période.

- Les crimes contre la personne comprennent les homicides, les voies de fait (agressions sexuelles et autres agressions), les vols qualifiés, et les autres infractions (exhibitionnisme, enlèvements, tentatives de meurtre).
- Lorsque plusieurs actes criminels sont commis lors d'un même incident, seule l'infraction la plus grave est enregistrée².
- Les statistiques compilées par le ministère de la Sécurité publique se rapportent à la région de l'événement et non à la région de résidence des victimes.

Méthode de calcul :


$$\frac{\text{Nombre annuel moyen d'infractions criminelles contre la personne, pour une période donnée}}{\text{Population totale au milieu de la période}} \times 100\,000$$

Sources : Numérateur : Ministère de la Sécurité publique du Québec.
Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : Depuis 1992, la criminalité est légèrement en baisse au Québec. Entre 1990 et 1992, le taux de crimes s'était accru de 13 % pour ensuite décliner, entre 1992 et 1995, de 16 %.

- De 1990 à 1995, les taux d'homicides, de vols qualifiés et d'agressions sexuelles ont diminué dans des proportions allant de 13 % à 26 %. Le taux des autres infractions a par contre augmenté de 15 % et celui des autres agressions, qui constituent les trois quarts des crimes, est demeuré stable.
- Pour 1995, une seule région présente un taux qui excède significativement celui du Québec, soit Montréal-Centre.
- En 1990, deux régions présentaient un excédent : Montréal-Centre et Outaouais. Entre 1990 et 1995, cinq régions ont vu leur taux s'accroître, soit le Saguenay—Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, Québec, la Chaudière-Appalaches et la Mauricie—Bois-Francs.


1. Taux de crimes contre la personne, Québec, 1990 à 1995



2. Taux de crimes contre la personne selon le type, Québec, 1990 à 1995



3. Indice comparatif de crimes contre la personne selon la région³ de l'événement, Québec, 1995



4. Taux de crimes contre la personne selon le type et la région³ de l'événement, Québec, 1990 à 1995 (taux pour 100 000)

Région	1990 Total	1995						Variation de 1990 à 1995 %	
		Homicides	Voies de fait		Vois qualifiés	Autres infractions	Total		
			Agressions sexuelles	Autres agressions			Nombre		Taux
Bas-Saint-Laurent (01)	392,3 (-)	**2,4	45,2	348,1 (-)	27,7 (-)	18,0	908	441,5 (-)	13
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	411,6 (-)	**0,3	42,0	437,3 (-)	28,6 (-)	*12,1 (-)	1 511	520,2 (-)	26
Québec (03)	541,6 (-)	**1,2	46,1	426,9 (-)	110, (-)	13,5 (-)	3 853	597,7 (-)	10
Mauricie — Bois-Francs (04)	400,6 (-)	**1,4	31,7 (-)	338,2 (-)	41,7 (-)	16,7	2 090	429,7 (-)	7
Estrie (05)	398,1 (-)	**0,4	32,7 (-)	298,3 (-)	44,1 (-)	*12,8 (-)	1 091	388,3 (-)	-2
Montréal-Centre (06)	1 299,9 (+)	3,3 (+)	55,4 (+)	759,4 (+)	327, (+)	19,5	21 495	1 (+)	-10
Outaouais (07)	763,8 (+)	**1,3	72,0 (+)	546,6 (+)	59,2 (-)	17,6	2 178	696,6	-9
Abitibi-Témiscamingue (08)	606,9 (-)	**3,2	73,3 (+)	468,3	32,2 (-)	*21,5	947	598,6 (-)	-1
Côte-Nord (09)	710,1	0,0	50,5	532,1 (+)	*12,4 (-)	*22,9	648	618,0 (-)	-13
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	550,2 (-)	**2,9	*29,5 (-)	404,0 (-)	*19,1 (-)	*18,1	497	473,5 (-)	-14
Chaudière-Appalaches (12)	281,7 (-)	**1,3	23,4 (-)	247,8 (-)	18,0 (-)	16,1	1 178	306,6 (-)	9
Laval (13)	493,4 (-)	**1,5	34,2 (-)	293,5 (-)	117,	14,3 (-)	1 577	460,5 (-)	-7
Lanaudière (14)	608,1 (-)	**0,5	34,7 (-)	391,4 (-)	50,0 (-)	22,9	1 898	499,6 (-)	-18
Laurentides (15)	564,2 (-)	**0,9	48,1	388,4 (-)	53,9 (-)	21,8	2 239	513,1 (-)	-9
Montérégie (16)	513,3 (-)	*1,8	36,1 (-)	351,0 (-)	67,5 (-)	20,6	6 308	476,9 (-)	-7
Nunavik (17)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terres-Cries (18)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Ensemble du Québec	710,4	1,9	45,2	478,0	126,	18,9	49 195	670,5	-6

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 111-112.
- Les données présentées ne comprennent pas les cas rapportés par la Gendarmerie royale dont le nombre est de 5 en 1990 et 10 en 1995. Sont également exclus les crimes rapportés par les polices amérindiennes dont le nombre s'établissait à 771 en 1995 (Ministère de la Sécurité publique, 1996).
- Les données sur les crimes contre la personne sont disponibles à l'échelle des régions administratives. La région administrative du Nord-du-Québec correspond à la somme de trois régions sociosanitaires : Nord-du-Québec, Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James. Les données ne sont donc pas disponibles pour ces trois régions prises séparément.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

31. NOMBRE DE LITS ET DE PLACES SELON LES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENT

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de lits et de places au permis (public ou privé) à la population totale au milieu de la période.

- Trois notions sont couramment utilisées lorsque l'on traite de la question des lits : *les lits dressés, les lits au permis ou approuvés* et *la capacité théorique en lits²*.
- Les lits de soins de courte durée comprennent les lits de soins de courte durée physiques ou psychiatriques alors que les lits et places d'hébergement comprennent les lits de soins de longue durée et les places d'hébergement.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Nombre de lits et de places au permis (public ou privé), pour une période donnée}}{\text{Population totale au milieu de la période}} \times 1\,000$

Sources : Numérateur : Fichier des établissements de santé et de services sociaux du Québec, MSSS.
Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : Le nombre de lits de courte durée pour 1 000 habitants a légèrement diminué au Québec, soit de 4,2 en 1986 à 4,0 en 1994. Le nombre de lits et places de longue durée pour 1 000 habitants a pour sa part fléchi de 11 %, passant de 9,1 en 1986 à 8,1 en 1994.

- En 1994, on observait une grande variabilité interrégionale du nombre de lits de courte durée, allant d'un minimum de 1,3 lit à Laval à un maximum de 6,3 lits à Montréal-Centre.
- Les différences régionales étaient encore plus importantes en ce qui concerne le nombre de lits et places de longue durée. En 1994, les régions du Nord (Nord-du-Québec, Terres-Cries-de-la-Baie-James et Nunavik) avaient peu de lits et places de longue durée alors que le Bas-Saint-Laurent et Montréal-Centre présentaient les taux les plus élevés.


1. Nombre de lits et de places au permis de courte durée³ et de longue durée pour 1 000 habitants, Québec, 1986 à 1994



2. Nombre de lits au permis de courte durée² pour 1 000 habitants selon la région, Québec, 1994



3. Nombre de lits et de places au permis de longue durée pour 1 000 habitants selon la région, Québec, 1994



4. Nombre de lits et de places au permis de courte durée³ et de longue durée pour 1 000 habitants selon la région, Québec, 1986 et 1994 (taux pour 1 000)

Région	Courte durée			Variation de 1986 à 1994 %	Longue durée			Variation de 1986 à 1994 %
	1986 Taux	1994 Nombre	1994 Taux		1986 Taux	1994 Nombre	1994 Taux	
Bas-Saint-Laurent (01)	4,3	962	4,7	7	12,4	2 594	12,5	1
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	4,7	1 420	4,9	3	7,3	1 846	6,3	-13
Québec (03)	6,0	3 764	5,9	-3	10,9	6 020	9,4	-14
Mauricie — Bois-Francs (04)	3,7	1 698	3,5	-4	10,5	4 619	9,5	-9
Estrie (05)	4,7	1 207	4,3	-8	10,3	2 622	9,4	-9
Montréal-Centre (06)	6,4	11 567	6,3	-2	11,7	20 255	11,0	-6
Outaouais (07)	3,7	986	3,2	-13	5,8	1 492	4,9	-17
Abitibi-Témiscamingue (08)	3,7	572	3,6	-3	6,9	1 091	6,9	0
Côte-Nord (09)	4,9	467	4,4	-9	4,1	414	3,9	-5
Nord-du-Québec (10)	4,1	97	4,8	15	0,6	14	0,7	10
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	4,5	521	4,9	10	8,2	919	8,7	5
Chaudière-Appalaches (12)	3,3	1 032	2,7	-18	10,1	3 615	9,4	-7
Laval (13)	1,5	431	1,3	-14	5,2	1 503	4,5	-15
Lanaudière (14)	2,4	673	1,8	-23	9,1	2 397	6,5	-29
Laurentides (15)	2,3	868	2,0	-10	6,7	2 332	5,5	-18
Montréal (16)	2,0	2 603	2,0	-2	6,0	6 826	5,2	-12
Nunavik (17)	3,9	54	6,1	56	2,0	18	2,0	0
Terres-Cries (18)	4,5	25	2,9	-36	1,9	7	0,8	-58
Ensemble du Québec	4,2	28 947	4,0	-6	9,1	58 584	8,1	-11

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 114-115.
- Les lits dressés désignent les lits qui peuvent accueillir des bénéficiaires et pour lesquels on dispose du personnel nécessaire pour fournir le niveau et le type de soins nécessaires. Les lits au permis ou approuvés sont ceux qui sont inscrits au permis d'exploitation de tous les établissements publics et privés du réseau. La capacité théorique en lits désigne le nombre de lits que l'établissement a eu l'autorisation d'installer, en fonction de la superficie de sol occupée par le lit (Mix, 1991).
- Les lits en pouponnière ne sont pas comptabilisés dans les lits de courte durée.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

32. NOMBRE D'HABITANTS PAR PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ SELON LE TYPE

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, de la population totale au milieu de la période au nombre annuel moyen de professionnels de la santé.

– Les professionnels de la santé sont comptabilisés indépendamment de leur mode de rémunération (paiement à l'acte, salaire ou vacation). Cependant, seuls les dispensateurs inscrits à la RAMQ et ayant reçu des honoraires de la RAMQ au cours de l'année sont intégrés au calcul.


Méthode de calcul :
$$\frac{\text{Population totale au milieu de la période}}{\text{Nombre annuel moyen de professionnels pour une période donnée}}$$

Sources : Numérateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.
Dénominateur : Fichier des dispensateurs de services, RAMQ.

Faits saillants : Au Québec, entre 1981 et 1994, le nombre d'habitants par médecin, le nombre d'habitants par dentiste et le nombre d'habitants par optométriste ont diminué de façon constante.

- En 1994, les régions de Lanaudière, des Laurentides, de Laval, de la Montérégie, de la Mauricie—Bois-Francs et de la Chaudière-Appalaches possèdent les ratios « population/médecin » les moins avantageux.
- En distinguant les médecins spécialistes des omnipraticiens et résidents, on constate qu'en 1994 le ratio « population/médecin spécialiste » est moins enviable dans les régions des Laurentides et de Lanaudière que dans les régions de Montréal-Centre et de Québec. En contrepartie, le ratio « population/omnipraticien et résident » est plus favorable dans les régions de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord, et moins avantageux dans Lanaudière et Laval. En 1994, le ratio « population/dentiste » avantage largement Montréal-Centre par rapport aux autres régions.


1. Nombre d'habitants par professionnel de la santé selon le type, Québec, 1981 à 1994



2. Nombre d'habitants par professionnel de la santé selon le type, Québec, 1981, 1986, 1991 et 1994

	1981	1986	1991	1994	Variation de 1981 à 1994 %
Ensemble des médecins	576	520	507	505	-13
Omnipraticiens et résidents	1 148	1 000	999	1 017	-12
Spécialistes	1 157	1 082	1 029	1 003	-11
Dentistes	2 297	2 028	1 926	1 867	-19
Optométristes	8 665	7 679	6 936	6 688	-23

3. Nombre d'habitants par médecin selon la région², Québec, 1994



4. Nombre d'habitants par professionnel de la santé selon le type et la région², Québec, 1994

Région	Médecins			Dentistes	Optométristes
	Omnipraticiens et résidents	Spécialistes	Ensemble des médecins		
Bas-Saint-Laurent (01)	949	1 326	553	2 687	5 444
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	1 134	1 381	623	2 174	6 776
Québec (03)	850	636	364	1 703	7 924
Mauricie — Bois-Francs (04)	1 230	1 599	695	2 341	6 212
Estrie (05)	874	871	436	2 237	6 354
Montréal-Centre (06)	875	515	324	1 289	6 408
Outaouais (07)	997	1 643	621	2 603	7 492
Abitibi-Témiscamingue (08)	1 005	1 562	611	2 354	6 572
Côte-Nord (09)	791	1 984	565	2 922	5 536
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	710	2 117	532	2 714	7 561
Chaudière-Appalaches (12)	1 015	1 953	668	2 695	8 699
Laval (13)	1 284	2 329	828	1 759	5 822
Lanaudière (14)	1 371	2 731	913	2 476	7 738
Laurentides (15)	1 192	2 745	831	2 149	5 828
Montérégie (16)	1 259	1 994	772	2 166	6 642
Nunavik (17)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terres-Cries (18)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Ensemble du Québec	1 017	1 003	505	1 867	6 688

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 116-117.
 - Afin d'assurer la confidentialité de certaines données, les régions du Nord-du-Québec, du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James furent regroupées. Aucune donnée n'est donc disponible pour ces trois régions sociosanitaires prises séparément (RAMQ, 1995).
- n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

33. DÉPENSES *PER CAPITA* CONSACRÉES AU DOMAINE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, de la moyenne annuelle des dépenses brutes générées par le système sociosanitaire, par composante de la structure d'activités, à la population totale au milieu de la période.

- Les dépenses brutes sont celles qui représentent l'ensemble des dépenses, sans toutefois tenir compte des revenus réalisés par les établissements ni des déficits d'exploitation.
- Les dépenses *per capita* sont rapportées à la population résidente et non à la population traitée.


Méthode de calcul : Dépenses annuelles moyennes brutes, pour une période donnée
Population totale au milieu de la période

Sources : Numérateur : Système d'information financière et opérationnelle (SIFO), MSSS.
Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.

Faits saillants : Les dépenses *per capita* consacrées au domaine de la santé et des services sociaux s'accroissent au Québec. En 1986-1987, on dépensait 1 353 \$ *per capita* alors qu'en 1994-1995, on déboursait 1 574 \$ pour l'ensemble des services.

- En 1994-1995, ce sont les « Activités thérapeutiques de santé physique en institution » qui nécessitent les dépenses les plus importantes. En dollars constants, entre 1986-1987 et 1994-1995, ce sont les dépenses allouées aux « Activités de maintien à domicile » qui ont le plus progressé. En contrepartie, les dépenses consacrées aux « Activités thérapeutiques de santé mentale en institution » et aux « Autres activités » ont diminué.
- En 1994-1995, les régions ayant des dépenses *per capita* les moins élevées sont, dans l'ordre, Lanaudière, la Montérégie, les Laurentides et Laval. À l'opposé, on retrouve les dépenses *per capita* les plus élevées dans le Nunavik, dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James, à Montréal-Centre et à Québec.
- Entre 1981-1982 et 1994-1995, seulement trois régions (Chaudière-Appalaches, Laval et Nunavik) ont vu leurs dépenses *per capita*, en dollars courants, s'accroître moins rapidement que celles de l'ensemble du Québec.


1. Évolution des dépenses *per capita* consacrées au domaine de la santé et des services sociaux, Québec, 1981-1982 à 1994-1995



2. Dépenses *per capita* consacrées à la santé et aux services sociaux selon le domaine d'activités, Québec, 1986-1987, 1991-1992 et 1994-1995

Domaine d'activités	1986-1987		1991-1992		1994-1995		Variation (%) de 1986-1987 à 1994-1995 (\$ constants)
	\$ constants	\$ courants	\$ constants	\$ courants	\$ constants	\$ courants	
Promotion de la santé	28		33		36	47	31
Diagnostique	100		112		116	150	17
Thérapeutique de santé physique en institution	359		421		445	573	24
Thérapeutique de santé mentale en institution	56		58		55	71	-2
Adaptation et réadaptation	87		107		124	159	42
Soutien, protection et hébergement	80		95		108	139	35
Maintien à domicile	25		38		42	54	64
Appoint	223		246		249	320	11
Administration	152		182		185	238	22
Autres activités	243		245		215	277	-12
Ensemble des domaines d'activités	1 353		1 535		1 574	2 028	16

3. Dépenses *per capita* consacrées au domaine de la santé et des services sociaux selon la région^{2,3}, Québec, 1994-1995



4. Dépenses *per capita* consacrées au domaine de la santé et des services sociaux selon la région^{2,3}, Québec, 1981-1982, 1986-1987, 1991-1992 et 1994-1995 (dollars courants)

	1981-1982	1986-1987	1991-1992	1994-1995	Variation de 1981-1982 à 1994-1995
	\$	\$	\$	\$	%
Bas-Saint-Laurent (01)	786	1 094	1 850	2 101	167
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	797	1 046	1 648	1 815	128
Québec (03)	1 235	1 643	2 453	2 577	109
Mauricie — Bois-Francs (04)	761	1 066	1 640	1 708	124
Estrie (05)	974	1 284	1 910	2 062	112
Montréal-Centre (06)	1 326	1 774	2 680	2 843	114
Outaouais (07)	689	1 003	1 490	1 478	114
Abitibi-Témiscamingue (08)	820	1 195	1 854	1 996	143
Côte-Nord (09)	804	1 260	2 082	2 062	156
Nord-du-Québec (10)	730	931	1 626	1 662	127
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	826	1 142	1 989	2 285	177
Chaudière-Appalaches (12)	741	1 020	1 362	1 478	99
Laval (13)	652	871	1 054	1 211	86
Lanaudière (14)	515	918	1 042	1 078	109
Laurentides (15)	570	781	1 150	1 210	112
Montérégie (16)	498	717	1 060	1 098	121
Nunavik (17)	2 589	3 990	4 812	4 579	77
Terres-Cries (18)	1 022	1 659	4 006	4 413	332
Ensemble du Québec	999	1 368	1 951	2 028	103

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 118-119. Les données se rapportent à des années financières, soit du 1^{er} avril au 31 mars.
- Une partie des dépenses consacrées au domaine de la santé ne peuvent être attribuées à une région particulière, mais plutôt à l'ensemble du Québec. En 1993-1994, 5 % des dépenses ne pouvaient être attribuées à une région particulière (St-Pierre, 1996).
- Compte tenu que l'indice des prix à la consommation (IPC) n'est pas disponible au niveau des régions sociosanitaires, les dépenses *per capita* des régions sont présentées en dollars courants.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

34. DURÉE MOYENNE D'HOSPITALISATION SELON LE DIAGNOSTIC

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre de journées d'hospitalisation, pour un diagnostic spécifique, au nombre d'hospitalisations, pour le même diagnostic, durant la même période.

– Les statistiques d'hospitalisation² présentées dans cette fiche ne se rapportent qu'aux soins de courte durée. De plus, parmi les soins de courte durée, elles excluent les données se rapportant aux hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux services psychiatriques des hôpitaux généraux. Le diagnostic retenu correspond au diagnostic principal défini selon la CIM-9.

Méthode de calcul :


$$\frac{\text{Nombre de journées d'hospitalisation, pour une période donnée, pour un diagnostic spécifique}}{\text{Nombre d'hospitalisations, pour le même diagnostic, durant la même période}}$$

Sources : Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, MSSS.


Faits saillants : Au cours des dernières années, la durée moyenne d'hospitalisation a diminué au Québec. De 1989-1991 à 1993-1995, le séjour moyen à l'hôpital est passé de neuf jours à huit jours. Cette diminution a été observée autant chez les hommes que chez les femmes. Ces dernières enregistrent des séjours moins longs que les hommes, peu importe la période.

- Parmi les principaux diagnostics d'hospitalisation, ce sont les tumeurs qui nécessitent les plus longs séjours, suivies des maladies de l'appareil circulatoire et des traumatismes. La durée moyenne d'hospitalisation tend à se raccourcir pour tous les principaux diagnostics, sauf pour les maladies de l'appareil respiratoire.
- En 1993-1995, les séjours moyens les plus longs sont enregistrés dans les régions de Québec et de Montréal-Centre. On retrouve les séjours les plus courts dans les trois régions nordiques (Nord-du-Québec, Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James) ainsi qu'en Abitibi-Témiscamingue.


1. Durée moyenne d'hospitalisation selon le sexe, Québec, 1989-1991 à 1993-1995



2. Durée moyenne d'hospitalisation selon le diagnostic principal³, Québec, 1989-1991 à 1993-1995



3. Durée moyenne d'hospitalisation selon la région⁴, Québec, 1993-1995



4. Durée moyenne d'hospitalisation selon le diagnostic principal³ et la région⁴, Québec, 1993-1995 (en journées)

Région	Tumeurs	Appareil	Appareil	Appareil	Organes	Trauma-	Ensemble des diagnostics	
		circulatoire	respiratoire	digestif	génito-urin.	tismes	Nombre ⁵	Durée
Bas-Saint-Laurent (01)	12,4	10,4	6,7	6,3	6,2	9,6	26 839	8,1
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	13,4	11,6	6,8	6,7	6,4	9,7	34 392	8,3
Québec (03)	14,5	11,8	8,1	7,0	6,5	11,2	63 681	9,2
Mauricie — Bois-Francs (04)	13,1	11,7	6,9	6,5	5,6	11,1	55 180	8,3
Estrie (05)	12,0	11,7	7,0	6,9	5,7	11,0	31 291	8,3
Montréal-Centre (06)	13,7	12,3	8,1	7,6	6,2	10,8	181 422	8,9
Outaouais (07)	12,0	11,8	6,2	5,9	4,9	8,8	28 470	7,4
Abitibi-Témiscamingue (08)	12,3	10,0	6,1	5,7	5,3	8,3	19 049	7,0
Côte-Nord (09)	11,7	10,0	6,0	6,0	6,0	8,0	14 943	7,4
Nord-du-Québec (10)	11,6	8,4	4,0	4,4	4,6	5,5	2 953	5,2
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	12,2	11,6	6,4	6,1	5,2	8,6	15 682	8,0
Chaudière-Appalaches (12)	13,2	11,3	6,3	6,1	6,0	10,0	39 741	8,2
Laval (13)	11,4	10,4	6,3	6,1	5,5	8,3	26 393	7,4
Lanaudière (14)	11,7	9,9	6,6	6,8	5,6	9,3	34 170	7,4
Laurentides (15)	12,0	10,7	6,1	5,8	5,3	8,4	38 116	7,3
Montréal (16)	12,0	10,8	6,0	6,6	5,6	9,4	119 031	7,6
Nunavik (17)	14,6	8,7	5,7	4,0	5,8	5,6	1 739	5,7
Terres-Cries (18)	13,5	9,6	4,9	5,3	5,5	6,3	1 571	6,5
Ensemble du Québec	12,8	11,4	6,9	6,7	5,8	9,9	734 659	8,2

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 120-121.
- La durée de l'hospitalisation correspond à la durée totale du séjour dans l'installation hospitalière, incluant le jour de l'admission et les jours de congé temporaire, mais excluant le jour de sortie. Les données se rapportent à des années financières, soit du 1^{er} avril au 31 mars (MSSS, 1995).
- Les diagnostics retenus sont définis selon la neuvième révision de la Classification internationale des maladies. Les codes utilisés sont : tumeurs (140-239); appareil circulatoire (390-459); appareil respiratoire (460-519); appareil digestif (520-579); organes génito-urinaires (580-629) et traumatismes (E800-E999).
- Les statistiques sur les hospitalisations ne comprennent que celles ayant eu lieu au Québec. Pour les régions limitrophes, en particulier l'Outaouais, où une partie importante des hospitalisations ont lieu dans une province voisine, les données peuvent présenter une certaine sous-déclaration (MSSS, 1991).
- Nombre annuel moyen d'hospitalisations.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

35. TAUX D'INCIDENCE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (MADO) ÉVITABLES PAR LA VACCINATION

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre de nouveaux cas de maladies transmissibles faisant l'objet d'un programme de vaccination systématique, à la population totale au milieu de la période.

– Les MADO évitables par la vaccination sont des maladies transmissibles (contagieuses) d'origine virale ou bactérienne qui doivent légalement faire l'objet d'une déclaration de la part des médecins et des laboratoires.

Méthode de calcul :


$$\frac{\text{Nombre de nouveaux cas d'une MADO évitable par la vaccination, pour une période donnée}}{\text{Population totale au milieu de la période}} \times 100\,000$$

Sources : Numérateur : Direction générale de la santé publique (novembre 1995), MSSS.
Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.

Faits saillants : En 1990 comme en 1994, la coqueluche est la MADO évitable par la vaccination la plus répandue au Québec. Cette dernière ainsi que la rougeole sont les deux seules maladies qui ont connu une augmentation significative de leur incidence entre 1990 et 1994. Les maladies dont le taux d'incidence a diminué sont l'hépatite B aiguë, l'infection à méningocoque, la rubéole et l'*haemophilus influenzae* (toutes formes).

- En 1994, pour tous les groupes d'âge, la coqueluche est la MADO évitable par la vaccination ayant le taux le plus élevé. Le taux pour cette dernière maladie atteint un sommet chez les enfants de moins de 10 ans.
- En 1994, l'incidence de la coqueluche surpasse significativement la moyenne du Québec dans sept régions, atteignant des taux particulièrement élevés pour la Côte-Nord et Lanaudière.
- En 1994, dix régions présentent au moins une maladie dont le taux d'incidence surpasse significativement celui de l'ensemble du Québec. Les régions de Lanaudière et des Laurentides sont les seules pour lesquelles deux maladies surpassent l'incidence du Québec.


1. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination², Québec, 1990 et 1994



2. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination² selon l'âge, Québec, 1994 (taux pour 100 000)

	0-10 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-59 ans	60 ans et +
Coqueluche	375,9	53,7	11,6	13,6	5,5	*1,7
Hépatite B aiguë	**0,7	*1,6	9,9	8,3	5,0	*1,6
Rougeole	5,5	7,2	**0,5	**0,2	0,0	0,0
Infection à méningocoque	4,8	*1,8	**0,5	*0,6	**0,5	**0,9
Oreillons	5,4	*1,6	*1,1	**0,4	**0,1	0,0
Rubéole	5,4	*1,0	**0,2	**0,2	0,0	0,0
H. influenzae (toutes formes)	**1,4	**0,4	0,0	**0,1	**0,2	**0,5

3. Indice comparatif d'incidence de la coqueluche selon la région, Québec, 1994



4. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination² selon la région, Québec, 1994 (taux pour 100 000)

Région	Coqueluche	Hépatite B aiguë	Rougeole	Infection à méningocoque	Oreillons	Rubéole	<i>Haemophilus influenzae</i> (toutes formes)
Bas-Saint-Laurent (01)	66,7	**1,0	0,0	**1,9	**0,5	0,0	**0,5
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	39,8 (-)	**0,7	0,0	**1,0	**1,4	**0,3	**0,7
Québec (03)	76,0 (+)	6,5	**0,5	**1,4	*1,7	*1,7	**0,2
Mauricie — Bois-Francis (04)	86,5 (+)	*2,1 (-)	**0,2	**0,6	**0,8	0,0	**0,4
Estrie (05)	57,6	**2,9	0,0	**1,8	**2,5	**0,4	**0,4
Montréal-Centre (06)	29,4 (-)	8,0 (+)	2,3	*1,4	*1,0	**0,4	**0,2
Outaouais (07)	43,6 (-)	**2,9	0,0	**2,0	**1,3	*3,3(+)	**0,7
Abitibi-Témiscamingue (08)	74,8 (+)	**0,6	0,0	**2,5	0,0	**0,6	**0,6
Côte-Nord (09)	237,7 (+)	0,0	0,0	**3,8	0,0	**1,0	0,0
Nord-du-Québec (10)	*83,4	**4,9	0,0	**4,9	0,0	0,0	0,0
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	*12,3 (-)	0,0	0,0	0,0	**1,9	**3,8	**1,9
Chaudière-Appalaches (12)	58,8	**2,1	14,9 (+)	**1,0	**1,3	**0,3	**1,0
Laval (13)	81,7 (+)	*6,5	**0,9	**0,6	**0,9	**2,7	**0,6
Lanaudière (14)	141,9 (+)	**2,4	*3,8 (+)	*2,7	**1,1	**1,9	0,0
Laurentides (15)	76,2 (+)	*8,0 (+)	0,0	**0,9	**1,4	**0,9	0,0
Montérégie (16)	52,5 (-)	3,8	**0,5	*0,8	*1,0	**0,5	**0,2
Nunavik (17)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	**11,3
Terres-Cries (18)	**23,4	0,0	**11,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble du Québec	60,9	4,8	1,8	1,3	1,1	0,9	*0,4

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 122-123.
 - Les taux pour la diphtérie, la poliomyélite, la rubéole congénitale et le tétanos ne sont pas présentés puisque ces MADO comptent chacune moins de cinq cas annuellement au Québec entre 1990 et 1994.
- * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

2. ÉTAT DE SANTÉ

État de santé subjectif

État de santé objectif

Morbidité extra-hospitalière

Morbidité hospitalière

Mortalité

2. ÉTAT DE SANTÉ

L'état de santé est divisé en deux sections : l'**État de santé subjectif** et l'**État de santé objectif**.

L'**État de santé subjectif** est l'évaluation, faite par l'individu, de sa propre santé. En plus de nous fournir une évaluation globale de l'état de santé d'une personne, cette dimension nous permet d'accéder à une information cruciale concernant des états pathologiques qui n'ont pas entraîné de consultations auprès de professionnels de la santé, de diagnostics ou de recours aux services de santé.

Les indicateurs de santé subjective sont moins nombreux que les indicateurs de santé objectivée; ceux qui sont présentés proviennent tous de données d'enquête.

L'**État de santé objectif** est l'état déterminé par l'évaluation d'un professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à établir la présence d'un problème de santé. Cette catégorie est subdivisée selon la gravité : la *morbidité extra-hospitalière*, la *morbidité hospitalière* et la *mortalité*.

Les indicateurs de santé objectivée sont surtout disponibles à partir de bases de données administratives; cependant, des efforts ont été consentis afin de diversifier le plus possible les sources de données.

Une partie de la *morbidité extra-hospitalière* est abordée dans la section qui porte sur l'état de santé objectif et chevauche donc la morbidité hospitalière. Dans cette section, on retrouve des indicateurs couvrant des champs spécifiques comme les lésions professionnelles, les maladies à déclaration obligatoire et les intoxications.

La *morbidité hospitalière* présente deux indicateurs calculés à partir des données des départs des hôpitaux : les taux d'hospitalisation selon la cause et le taux d'incidence du cancer.

Dans la sous-section sur la *mortalité*, on traite des indicateurs classiques de mortalité calculés à partir des données de l'état civil comme l'espérance de vie, le taux de mortalité infantile et le taux des années potentielles de vie perdues. On retrouve également des indicateurs relevant de sources plus spécifiques comme les données sur les victimes d'accidents de véhicules routiers.

36. PROPORTION DE LA POPULATION NE SE PERCEVANT PAS EN BONNE SANTÉ

Définition¹ : Proportion de la population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé par rapport à la population totale de 15 ans et plus dans les ménages privés.

- Le répondant doit qualifier son état de santé comparativement aux autres personnes du même âge.
- Les personnes qui ne se perçoivent pas en bonne santé sont celles qui ont déclaré un état de santé moyen ou mauvais.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population de 15 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé}}{\text{Population de 15 ans et plus dans les ménages privés}} \times 100$

Sources : Enquêtes de Santé Québec, enquête de Santé Canada et enquête de Statistique Canada.


Faits saillants : En 1994, une personne de 15 ans et plus sur dix ne se considère pas en bonne santé. Cette proportion est sensiblement la même pour les deux sexes et est équivalente à celle observée pour les autres années.

- La proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé augmente selon l'âge chez les personnes des deux sexes. D'autre part, pour chacun des groupes d'âge, on ne dénote aucune différence marquée selon le sexe.
- En 1993, trois régions se distinguent de l'ensemble du Québec avec des pourcentages significativement supérieurs : Nunavik, Terres-Cries-de-la-Baie-James et Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine.
- Entre 1987 et 1993, seule la région de la Côte-Nord a connu une augmentation significative de la proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé.


1. Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé selon le sexe, Québec, 1987 à 1994



2. Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé selon l'âge et le sexe, Québec, 1992-1993



3. Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé selon la région, Québec, 1992-1993



4. Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé selon la région, Québec, 1987 et 1992-1993

Région	1987 %	1992-1993		Variation de 1987 à 1992-1993
		Nombre estimé	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	13,5	18 770	11,6	
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	11,9	24 544	11,0	
Québec (03)	9,3	44 342	8,7	
Mauricie — Bois-Francs (04)	12,4	39 819	10,7	
Estrie (05)	13,6	24 015	11,2	
Montréal-Centre ² (06)	11,4	163 859	10,9	
Outaouais (07)	13,0	24 991	10,6	
Abitibi-Témiscamingue (08)	13,4	15 638	13,1	
Côte-Nord (09)	9,6	10 081	12,4	↑
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	13,4	13 796	16,2 (+)	
Chaudière-Appalaches (12)	11,5	33 859	11,7	
Laval (13)	9,1	28 531	10,9	
Lanaudière (14)	12,2	26 641	9,6	
Laurentides (15)	11,0	32 173	10,2	
Montérégie ² (16)	10,7	99 415	10,1	
Nunavik ³ (17)	n.d.	2 076	51,1 (+)	n.a.
Terres-Cries ⁴ (18)	n.d.	1 362	23,1 (+)	n.a.
Ensemble du Québec⁵	11,4	600 472	10,7	

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 126-127.
 - Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
 - Données pour 1992 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik.
 - Données pour 1991 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James.
 - Ce total ne comprend pas les régions 17 et 18, celles-ci ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes à des moments différents. Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.
- * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
- ↓ ↑ Diminution ou augmentation significative entre les deux périodes.
- n.d. Non disponible.
- n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

37. PROPORTION DE LA POPULATION AYANT AU MOINS UN PROBLÈME DE SANTÉ

Définition¹ : Proportion des personnes ayant déclaré au moins un problème de santé par rapport à la population totale dans les ménages privés.

– Les problèmes ont été déclarés par un répondant, pour l'ensemble du ménage, en raison de leur chronicité ou parce qu'ils ont amené une consultation médicale, une consommation de médicaments ou une limitation d'activité.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population ayant déclaré au moins un problème de santé}}{\text{Population totale dans les ménages privés}} \times 100$

Sources : Enquête de Santé Québec² et enquête de Santé Canada.


Faits saillants : En 1987, un peu plus de la moitié de la population du Québec avait déclaré au moins un problème de santé. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport à 1979, où la proportion était de 51 %. Les pourcentages observés lors des deux périodes sont légèrement plus élevés chez les femmes que chez les hommes.

- En 1987, la proportion de la population ayant au moins un problème de santé augmentait selon l'âge, passant de 40 % chez les 0-14 ans à 80 % chez les 65 ans et plus. Dans tous les cas, sauf chez les 0-14 ans, les pourcentages étaient plus élevés chez les femmes.
- En 1987, deux régions avaient une proportion significativement supérieure à l'ensemble du Québec, soit Montréal-Centre et l'Outaouais. À l'opposé, quatre régions présentaient une proportion significativement inférieure : la Chaudière-Appalaches, l'Abitibi-Témiscamingue, l'Estrie et Québec.


1. Proportion de la population ayant au moins un problème de santé selon le sexe, Québec, 1978-1979 et 1987



2. Proportion de la population ayant au moins un problème de santé selon l'âge et le sexe, Québec, 1987



3. Proportion de la population ayant au moins un problème de santé selon la région, Québec, 1987



4. Proportion de la population ayant au moins un problème de santé selon le sexe et la région, Québec, 1987

Région	Hommes		Femmes		Total	
	%		%		Nombre estimé	%
Bas-Saint-Laurent (01)	47,3		61,9		113 557	54,6
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	47,1		59,0		156 763	53,0
Québec (03)	44,3 (-)		58,2		295 593	51,5 (-)
Mauricie — Bois-Francs (04)	51,5		55,8		240 199	53,7
Estrie (05)	46,9		53,7 (-)		127 446	50,3 (-)
Montréal-Centre ³ (06)	53,8 (+)		64,5 (+)		1 029 156	59,4 (+)
Outaouais (07)	54,4 (+)		63,3		150 094	58,9 (+)
Abitibi-Témiscamingue (08)	45,1		54,1		75 228	49,5 (-)
Côte-Nord (09)	45,5		57,4		53 484	51,3
Nord-du-Québec (10)	n.d.		n.d.		n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	45,9		59,9		59 133	52,8
Chaudière-Appalaches (12)	46,1		52,1 (-)		173 176	49,1 (-)
Laval (13)	48,0		53,3		142 717	50,7
Lanaudière (14)	47,0		61,6		150 398	54,3
Laurentides (15)	54,8		60,1		182 066	57,5
Montréal ³ (16)	46,4		56,9		559 966	51,7
Nunavik ^{4,5} (17)	47,0		56,9		3 665	51,8
Terres-Cries ^{5,6} (18)	39,2		48,6		4 091	43,9
Ensemble du Québec ⁷	49,4		59,4		3 508 976	54,5

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 128-129.
 - Les données les plus récentes pour cet indicateur sont celles de l'année 1987. Toutefois, la prochaine enquête générale de Santé Québec, prévue pour 1998, permettra de mettre à jour l'information présentée dans cette fiche.
 - Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
 - Données pour 1992 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik.
 - La différence entre la région et l'ensemble du Québec n'est pas testée puisque les enquêtes sont trop éloignées dans le temps.
 - Données pour 1991 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James.
 - Ce total ne comprend pas les régions 17 et 18, celles-ci ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes à des moments différents. Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

38. PRÉVALENCE DES PRINCIPAUX PROBLÈMES DE SANTÉ

Définition¹ : Proportion de la population présentant un problème de santé déclaré par rapport à la population totale dans les ménages privés.

– Les problèmes ont été déclarés par un répondant, pour l'ensemble du ménage, en raison de leur chronicité ou parce qu'ils ont amené une consultation médicale, une consommation de médicaments ou une limitation d'activité.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population présentant un problème de santé déclaré}}{\text{Population totale dans les ménages privés}} \times 100$

Sources : Enquête de Santé Québec².


Faits saillants : En 1987, la catégorie de problèmes de santé la plus répandue dans la population était l'arthrite ou le rhumatisme. Les autres principaux problèmes déclarés touchaient chacun moins de 10 % de la population. Ce sont, dans l'ordre, les maux de tête, les allergies cutanées et autres maladies de la peau, les maux de dos, les troubles mentaux, les allergies autres que le rhume des foins et les allergies cutanées, l'hypertension, le rhume des foins, les lésions (accidents et blessures) et les maladies cardiaques.

- Pour tous les problèmes de santé, à l'exception des lésions, les femmes présentaient des proportions plus élevées que les hommes.
- La prévalence de l'arthrite ou du rhumatisme était significativement supérieure à la moyenne du Québec dans la région de Montréal-Centre et plus faible dans celles de Québec et de l'Abitibi-Témiscamingue.
- Pour l'un ou l'autre des dix problèmes de santé mentionnés, seules les régions de l'Outaouais et de Montréal-Centre enregistraient quelquefois des proportions significativement plus élevées que l'ensemble du Québec.


1. Prévalence des dix principaux problèmes de santé, Québec, 1987



2. Prévalence des dix principaux problèmes de santé selon le sexe, Québec, 1987



3. Proportion de la population présentant un problème d'arthrite ou de rhumatisme selon la région, Québec, 1987



4. Prévalence des dix principaux problèmes de santé selon la région, Québec, 1987

Région	Arthrite ou rhumatisme	Maux de tête	Allergies cutanées et autres affections de la peau	Maux de dos	Troubles mentaux	Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	Hypertension	Rhume des foins	Lésions (accidents et blessures)	Maladies cardiaques
Bas-Saint-Laurent (01)	11,0	8,7	7,7	8,1	8,2	6,0	7,3	4,9	4,9	4,1
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	8,6	9,0	8,0	6,2 (-)	5,5 (-)	5,1 (-)	6,5	4,5 (-)	4,4	4,1
Québec (03)	7,4 (-)	7,6	6,1 (-)	5,9 (-)	7,7	4,4 (-)	5,6	*3,6 (-)	4,4	*3,1
Mauricie — Bois-Francis (04)	8,7	7,1	8,3	6,9	8,1	5,5	5,2	5,0	5,4	3,6
Estrie (05)	9,0	8,2	6,4	6,5	6,5	5,6	6,6	4,8	3,8	4,4
Montréal-Centre ³ (06)	12,8 (+)	10,0 (+)	10,0 (+)	9,1 (+)	9,1 (+)	8,1 (+)	7,2	8,1 (+)	5,6	4,7
Outaouais (07)	12,4	10,4	9,8	9,0	8,9	8,8 (+)	6,9	6,4	6,6 (+)	4,1
Abitibi-Témiscamingue (08)	7,4 (-)	9,0	7,8	7,6	5,3 (-)	4,9	4,5 (-)	*2,5 (-)	*4,1	*3,7
Côte-Nord (09)	8,5	8,2	8,9	6,9	5,1 (-)	5,9	5,0	*2,8 (-)	5,3	*2,7
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	9,4	8,1	7,9	6,8	9,1	6,0	5,7	*3,2 (-)	5,4	*3,2
Chaudière-Appalaches (12)	8,9	6,2	6,1 (-)	6,4	6,2	*4,5 (-)	*5,3	*3,7 (-)	*4,0	*4,3
Laval (13)	*8,1	*7,0	*7,7	*6,8	**5,0	**4,1	*5,5	*7,2	**3,9	**4,1
Lanaudière (14)	9,6	8,4	7,5	8,3	8,1	7,8	*3,8 (-)	*6,8	*5,2	*4,1
Laurentides (15)	11,0	8,6	7,6	10,2	6,7	6,6	7,9	*5,3	*5,3	*4,6
Montérégie ³ (16)	8,3	7,4	6,2 (-)	7,0	5,8 (-)	6,6	6,5	6,8	4,5	3,8
Nunavik ^{4,5} (17)	4,0	7,7	4,7	4,3	3,2	5,3	5,2	**0,1	**0,9	*1,9
Terres-Cries ^{5,6} (18)	6,3	6,6	4,1	5,0	*1,9	6,5	4,5	*1,1	*2,5	*2,3
Ensemble du Québec ⁷	10,0	8,4	7,9	7,7	7,4	6,5	6,3	6,0	5,0	4,1

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 130-131.
- Les données les plus récentes pour cet indicateur sont celles de l'année 1987. Toutefois, la prochaine enquête générale de Santé Québec, prévue pour 1998, permettra de mettre à jour l'information présentée dans cette fiche.
- Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
- Données pour 1992 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik.
- La différence entre la région et l'ensemble du Québec n'est pas testée puisque les enquêtes sont trop éloignées dans le temps.
- Données pour 1991 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James.
- Ce total ne comprend pas les régions 17 et 18, celles-ci ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes à des moments différents. Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.
- Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
- Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
- n.d. Non disponible.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

39. TAUX DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES DÉCLARÉES ET INDEMNISÉES

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de lésions professionnelles déclarées et indemnisées, à la population de travailleurs de 15 ans et plus occupés au milieu de la période.

– Une lésion professionnelle se définit comme étant un accident de travail ou une maladie professionnelle. Les lésions déclarées et indemnisées sont celles ayant été admises par l'organisme payeur et ayant nécessité une indemnité de remplacement de revenu ou une indemnité pour dommages corporels.

Méthode de calcul :

$$\frac{\text{Nombre annuel moyen de lésions professionnelles déclarées et indemnisées pour une période donnée}}{\text{Population de travailleurs de 15 ans et plus au milieu de la période}} \times 100$$


Sources : Numérateur : Fichier des lésions professionnelles, CSST.
Dénominateur : Recensements de Statistique Canada.

Faits saillants : Le taux de lésions professionnelles a diminué considérablement au Québec au cours des dernières années. De 1988 à 1993, le taux a chuté de plus de 40 %. En 1993, le taux des hommes est 2,5 fois plus élevé que celui des femmes.

- En 1993, les taux les plus élevés sont observés dans le secteur manufacturier, puis dans le secteur primaire. Le secteur des services enregistre le taux le plus faible. Dans tous les secteurs, le taux de lésions a baissé depuis 1988.
- Le taux de lésions professionnelles est significativement plus élevé que celui de l'ensemble du Québec dans neuf régions. Les plus touchées sont le Nord-du-Québec, la Chaudière-Appalaches, Lanaudière et les Laurentides.
- Seule la région des Laurentides présente, pour chacun des secteurs d'activité, des taux significativement supérieurs à la moyenne québécoise.


1. Taux de lésions professionnelles déclarées et indemnisées selon le sexe, Québec, 1986 à 1993²

Taux pour 100 travailleurs




2. Taux de lésions professionnelles déclarées et indemnisées selon le secteur d'activité³, Québec, 1988 et 1993²

Taux pour 100 travailleurs



3. Taux de lésions professionnelles déclarées et indemnisées selon la région de résidence, Québec, 1993²



4. Taux de lésions professionnelles déclarées et indemnisées selon la région de résidence et le secteur d'activité³, Québec, 1993²

(taux pour 100 travailleurs)

Région	Secteur primaire	Secteur manufacturier	Construction	Transport et communication	Commerce	Services	Total	
							Nombre de lésions	Taux
Bas-Saint-Laurent (01)	5,5 (+)	9,1 (+)	2,9	2,9 (-)	3,3 (-)	2,4 (-)	3 498	3,8 (-)
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	6,4 (+)	4,6 (-)	2,5 (-)	3,7	3,4 (-)	2,1 (-)	4 101	3,2 (-)
Québec (03)	3,4 (-)	9,8 (+)	4,6 (+)	5,3 (+)	5,0 (+)	2,7 (+)	13 168	4,1 (+)
Mauricie — Bois-Francis (04)	2,8 (-)	8,8 (+)	2,6 (-)	4,4 (+)	3,2 (-)	2,5 (-)	9 252	4,3 (+)
Estrie (05)	4,2	8,9 (+)	2,8 (-)	3,1 (-)	3,4 (-)	2,7	5 634	4,4 (+)
Montréal-Centre (06)	1,2 (-)	5,4 (-)	2,7 (-)	3,0 (-)	3,4 (-)	2,4 (-)	29 871	3,3 (-)
Outaouais (07)	6,1 (+)	3,5 (-)	3,0	2,4 (-)	2,9 (-)	1,8 (-)	3 721	2,5 (-)
Abitibi-Témiscamingue (08)	6,3 (+)	3,1 (-)	3,4	3,9	3,6	2,7	2 627	3,7 (-)
Côte-Nord (09)	7,1 (+)	7,8	4,5 (+)	4,4	3,9	3,1 (+)	2 333	4,7 (+)
Nord-du-Québec (10)	14,7 (+)	3,0 (-)	*7,1 (+)	*3,3	4,1	2,4	599	6,0 (+)
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	5,7 (+)	2,7 (-)	2,7	3,0 (-)	3,3 (-)	2,2 (-)	1 358	3,0 (-)
Chaudière-Appalaches (12)	4,4	14,4 (+)	3,9 (+)	4,8 (+)	4,1 (+)	2,6	10 056	5,7 (+)
Laval (13)	*2,3 (-)	5,9 (-)	3,2	3,5 (-)	4,0	2,8 (+)	6 412	3,8 (-)
Lanaudière (14)	3,0 (-)	9,5 (+)	3,7 (+)	5,7 (+)	5,2 (+)	4,2 (+)	9 189	5,5 (+)
Laurentides (15)	5,0 (+)	9,6 (+)	3,6 (+)	4,7 (+)	4,4 (+)	3,7 (+)	9 906	5,2 (+)
Montérégie (16)	2,0 (-)	8,3 (+)	3,2	3,8	3,9	2,7 (+)	27 022	4,3 (+)
Nunavik (17)	0,0	**10,0	**1,3	0,0	**0,3	0,7 (-)	17	*0,6 (-)
Terres-Cries (18)	*4,3	0,0	**3,6	**1,1	**1,0	0,6 (-)	35	*1,2 (-)
Ensemble du Québec	4,4	7,6	3,2	3,8	3,8	2,6	138 799	4,0

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 132-133.
- Les taux de 1986 à 1988 ont été calculés en utilisant au dénominateur les données du recensement de 1986 et les taux de 1989 à 1993 à partir des données du recensement de 1991.
- Les secteurs d'activité ont été regroupés de la façon suivante : **Secteur primaire** : forêts et scieries; mines, carrières et puits de pétrole; agriculture; chasse et pêche. **Secteur manufacturier** : industrie chimique; fabrication de produits en métal; industrie du bois; industrie du caoutchouc et des produits en matière plastique; fabrication d'équipement de transport; première transformation des métaux; fabrication de produits minéraux non métalliques; industrie des aliments et boissons; industrie du meuble et des articles d'ameublement; industrie du papier et activités diverses; industrie du cuir; fabrication de machines; industrie du tabac; industrie textile; imprimerie, édition et activités connexes; fabrication de produits du pétrole et du charbon; fabrication de produits électriques; bonneterie et habillement; industries manufacturières diverses. **Construction** : bâtiments et travaux publics. **Transport et communication** : transport et entreposage; communication, transport d'énergie et autres services publics. **Commerce** : commerce. **Services** : administration publique; autres services commerciaux et personnels; enseignement et services annexes; finances, assurances et affaires immobilières.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

40. TAUX D'INTOXICATION

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen d'intoxications signalées à la population totale au milieu de cette période.

- Une intoxication est une action nocive qu'exerce une substance toxique (poison) sur l'organisme.
- L'intoxication est aiguë lorsque l'exposition à une substance est unique ou répétée pendant un intervalle de temps court (heures, jours), peu importe la voie de pénétration, la quantité, les circonstances, etc. L'exposition répétée pendant un intervalle de temps plus long (semaines, mois, années) correspond à ce qu'il est convenu d'appeler une intoxication chronique.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Nombre annuel moyen d'intoxications pour une période donnée}}{\text{Population totale au milieu de la période}} \times 100\,000$

Sources : Numérateur : Centre Anti-Poison du Québec.
Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : Au Québec, le taux d'intoxication est en constante augmentation. Entre 1989 et 1995, le taux s'est accru de plus de 75 %.


- Plus de 90 % des intoxications sont reliées aux produits domestiques et aux médicaments. En 1995, les produits domestiques sont à l'origine de 50 % des cas d'intoxication, les médicaments de 42 %, les pesticides de 5 % et les produits industriels de 2 %.
- En 1995, le taux d'intoxication est significativement plus élevé dans quatre régions : Terres-Cries-de-la-Baie-James, Laurentides, Québec et Lanaudière. Le taux d'intoxication est, par ailleurs, significativement plus faible dans onze régions, les taux les plus bas se retrouvant dans la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, à Laval et dans l'Outaouais.
- Entre 1992 et 1995, le taux d'intoxication s'est accru au Québec de 34 %. L'augmentation fut particulièrement forte dans les régions de Montréal-Centre, des Terres-Cries-de-la-Baie-James et de l'Abitibi-Témiscamingue avec des hausses de plus de 100 %. Durant cet intervalle, trois régions ont cependant connu une baisse : Chaudière-Appalaches, Outaouais et Nunavik.

1. Taux d'intoxication, Québec, 1989 à 1995



2. Répartition des cas d'intoxication selon la nature du produit, Québec, 1989 et 1995



3. Taux d'intoxication selon la région², Québec, 19954. Taux d'intoxication selon la région², Québec, 1992 à 1995

(Taux pour 100 000)

Région	1992	1993	1994	1995		Variation de 1992 à 1995 %
				Nombre	Taux	
Bas-Saint-Laurent (01)	597 (+)	696 (+)	794 (+)	1 237	601 (-)	1
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	589 (+)	609	722 (+)	1 944	669 (-)	14
Québec (03)	773 (+)	810 (+)	874 (+)	4 992	774 (+)	0
Mauricie — Bois-Francs (04)	350 (-)	405 (-)	484 (-)	2 878	592 (-)	69
Estrie (05)	364 (-)	415 (-)	482 (-)	1 844	656 (-)	80
Montréal-Centre (06)	224 (-)	269 (-)	320 (-)	11 154	604 (-)	170
Outaouais (07)	634 (+)	696 (+)	736 (+)	1 799	575 (-)	-9
Abitibi-Témiscamingue (08)	297 (-)	346 (-)	458 (-)	1 067	674	127
Côte-Nord (09)	540	587	636	682	650 (-)	20
Nord-du-Québec (10)	648 (+)	828 (+)	951 (+)	161	795	23
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	485 (-)	567 (-)	644	534	509 (-)	5
Chaudière-Appalaches (12)	695 (+)	711 (+)	865 (+)	2 414	628 (-)	-10
Laval (13)	420 (-)	473 (-)	527 (-)	1 890	552 (-)	31
Lanaudière (14)	562 (+)	601	711 (+)	2 861	753 (+)	34
Laurentides (15)	548	594 (-)	680	3 441	789 (+)	44
Montréal-Centre (16)	432 (-)	480 (-)	569 (-)	8 098	612 (-)	42
Nunavik (17)	798 (+)	706	714	70	766	-4
Terres-Cries (18)	600	790	972 (+)	123	1 451 (+)	142
Ensemble du Québec	531	620	662	52 197	711	34

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 134-135.
- La proportion de cas d'intoxication dont la région de résidence est inconnue varie selon les années de 9 % à 20 %. En 1995, cette proportion est de 9 %.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

41. TAUX D'INCIDENCE DES MALADIES INFECTIEUSES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre de nouveaux cas de maladies infectieuses à déclaration obligatoire à la population totale au milieu de la période.

– Les maladies infectieuses à déclaration obligatoire sont des maladies transmissibles (contagieuses) d'origine virale ou bactérienne qui doivent légalement faire l'objet d'une déclaration de la part des médecins et des laboratoires.

Méthode de calcul :


$$\frac{\text{Nombre de nouveaux cas de maladies infectieuses à déclaration obligatoire, pour une période donnée}}{\text{Population totale au milieu de la période}} \times 100\,000$$

Sources : Numérateur : Direction générale de la santé publique (novembre 1995), MSSS.

Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.

Faits saillants : En 1994 comme en 1990, la maladie infectieuse à déclaration obligatoire la plus répandue au Québec est la chlamydie (*chlamydia trachomatis*). Seul le taux de la coqueluche a augmenté de façon importante pendant cette période. À l'opposé, les taux d'incidence de trois maladies ont diminué : la chlamydie, la salmonellose et les infections gonococciques.

- En 1994, avant l'âge de 10 ans, les principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire sont la coqueluche et la scarlatine. Dans le groupe des 10-39 ans, la maladie infectieuse à déclaration obligatoire la plus répandue est la chlamydie. Chez les 40-59 ans, c'est l'hépatite B (porteur) qui se situe au premier rang tandis que c'est la campylobactériose qui affecte surtout les personnes de 60 ans et plus.
- En 1994, l'incidence de la chlamydie surpasse significativement la moyenne du Québec dans sept régions, atteignant des taux particulièrement élevés pour le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James.
- En 1994, Montréal-Centre est la région qui a le plus de maladies (cinq) dont l'incidence est significativement supérieure à l'ensemble du Québec, suivie des régions de Québec et de l'Outaouais, avec quatre maladies.




2. Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon l'âge, Québec, 1994

(taux pour 100 000)

	0-10 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-59 ans	60 ans et +
Chlamydie	4,7	284,4	362,8	70,0	15,6	*1,5
Coqueluche	375,9	53,7	11,6	13,6	5,5	*1,7
Campylobactériose	58,3	35,5	53,6	33,1	17,3	19,2
Scarlatine	124,1	12,9	*1,4	*1,1	**0,1	**0,1
Hépatite B porteur	*3,5	6,3	24,0	26,4	23,8	6,8
Salmonellose	42,6	12,6	16,6	12,7	10,2	13,4
Infection gonococcique	0,0	11,8	32,2	15,3	4,6	**0,2
Giardiase	25,7	7,6	12,8	9,6	5,8	*2,7
Sida	**0,1	**0,2	5,0	14,9	8,0	*1,2
Tuberculose	**0,4	*1,4	5,7	4,5	4,9	11,6

3. Indice comparatif de l'incidence de la chlamydie selon la région, Québec, 1994



4. Taux d'incidence des principales maladies infectieuses à déclaration obligatoire selon la région, Québec, 1994 (taux pour 100 000)

Région	Chlamydie	Coqueluche	Campylo-bactérie	Scarlatine	Hépatite B porteur	Salmonellose	Infection gonococcique	Giardiase	Sida	Tuberculose
Bas-Saint-Laurent (01)	105,4	66,7	44,0 (+)	*12,6 (-)	**3,4	39,2 (+)	**2,9	*8,2	0,0	*5,8
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	142,8 (+)	39,8 (-)	35,4	30,9 (+)	**2,4	12,7	*4,1 (-)	13,4	**1,4	*3,8
Québec (03)	116,8	76,0 (+)	59,4 (+)	22,4 (+)	9,3 (-)	25,1 (+)	8,6	*5,5 (-)	*3,1 (-)	*3,7
Mauricie — Bois-Francis (04)	102,8	86,5 (+)	35,9	35,5 (+)	*6,8 (-)	13,4	*3,9 (-)	8,3	*2,3 (-)	*2,7 (-)
Estrie (05)	106,6	57,6	46,1 (+)	*9,3 (-)	*11,8 (-)	15,7	*4,3 (-)	16,1 (+)	**1,8	**1,1
Montréal-Centre (06)	98,7 (-)	29,4 (-)	24,0 (-)	4,7 (-)	40,9 (+)	15,0	23,9 (+)	11,9 (+)	16,1 (+)	11,4 (+)
Outaouais (07)	123,1 (+)	43,6 (-)	46,9 (+)	32,2 (+)	*6,8 (-)	*11,4 (-)	*4,2 (-)	24,4 (+)	*3,9	**2,9
Abitibi-Témiscamingue (08)	230,2 (+)	74,8 (+)	*15,2 (-)	41,2 (+)	**2,5	*9,5 (-)	**3,2	*7,0	**1,3	**1,3
Côte-Nord (09)	285,2 (+)	237,7 (+)	*20,9 (-)	41,8 (+)	**5,7	*11,4	**5,7	**2,9	**1,0	**5,7
Nord-du-Québec (10)	206,0 (+)	*83,4	0,0	*103,0 (+)	**9,8	**14,7	**9,8	**4,9	0,0	**9,8
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	103,0	*12,3 (-)	41,6	39,7 (+)	0,0	*17,9	**0,9	**7,6	0,0	**2,8
Chaudière-Appalaches (12)	60,4 (-)	58,8	25,3 (-)	24,6 (+)	*3,4 (-)	15,9	*4,2 (-)	*6,3 (-)	**1,0	**0,8
Laval (13)	83,8 (-)	81,7 (+)	28,4	19,0	15,4	11,8 (-)	*5,9 (-)	*4,4 (-)	*3,3 (-)	*3,6
Lanaudière (14)	87,5 (-)	141,9 (+)	24,0 (-)	18,3	*7,5 (-)	12,1 (-)	*4,6 (-)	13,5	**1,6	**1,3
Laurentides (15)	116,6	76,2 (+)	39,3	23,3 (+)	13,2 (-)	28,9 (+)	*2,6 (-)	*6,6 (-)	*4,0	**2,1
Montérégie (16)	79,9 (-)	52,5 (-)	33,0	12,8 (-)	11,1 (-)	14,4	3,8 (-)	8,0 (-)	*1,8 (-)	*2,5 (-)
Nunavik (17)	3 037,5 (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	**11,3	646,0 (+)	**11,3	0,0	**56,7
Terres-Cries (18)	1 206,7 (+)	**23,4	**11,7	0,0	0,0	**35,1	*117,2 (+)	0,0	0,0	**35,1
Ensemble du Québec	109,0	60,9	33,4	17,9	16,8	16,6	10,3	9,8	5,7	5,0

Notes :

1. Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 136-137.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

42. TAUX D'HOSPITALISATION SELON LE DIAGNOSTIC

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen d'hospitalisations, pour un diagnostic spécifique, à la population totale au milieu de la période.

– Les statistiques d'hospitalisation² présentées dans cette fiche ne se rapportent qu'aux soins de courte durée. De plus, parmi les soins de courte durée, elles excluent les données se rapportant aux hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux services psychiatriques des hôpitaux généraux. Le diagnostic retenu correspond au diagnostic principal défini selon la CIM-9.

Méthode de calcul :

$$\frac{\text{Nombre annuel moyen d'hospitalisations, pour une période donnée, pour un diagnostic spécifique}}{\text{Population totale au milieu de la période}} \times 1\,000$$


Sources : Numérateur : Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, MSSS.

Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : Le taux d'hospitalisation a légèrement augmenté au Québec au cours des dernières années. Cette hausse s'observe autant chez les hommes que chez les femmes. Ces dernières enregistrent au cours de la dernière période un taux supérieur de 25 % à celui des hommes.

- En 1993-1995, les principaux diagnostics d'hospitalisation sont, par ordre d'importance, les maladies de l'appareil circulatoire, les maladies de l'appareil digestif, les maladies de l'appareil respiratoire, les tumeurs et les traumatismes. Pour deux diagnostics, les maladies de l'appareil circulatoire et les maladies de l'appareil respiratoire, les taux ont augmenté, tandis que pour les autres, ils sont demeurés relativement stables.
- Les trois régions nordiques (Nunavik, Terres-Cries-de-la-Baie-James et Nord-du-Québec) montrent les taux d'hospitalisation les plus élevés en 1993-1995. On observe également des taux dépassant d'au moins 25 % la moyenne québécoise dans les régions de la Côte-Nord, de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay—Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent. Les taux les plus faibles se retrouvent à Laval et à Montréal-Centre.
- En général, on retrouve d'un diagnostic à l'autre les mêmes tendances régionales observées pour l'ensemble des hospitalisations.


1. Taux ajusté³ d'hospitalisation selon le sexe, Québec, 1989-1991 à 1993-1995



2. Taux ajusté³ d'hospitalisation selon le diagnostic principal⁴, Québec, 1989-1991 à 1993-1995



3. Indice comparatif d'hospitalisation selon la région⁵, Québec, 1993-1995



4. Taux ajusté³ d'hospitalisation selon le diagnostic principal⁴ et la région⁵, Québec, 1993-1995 (taux annuel moyen pour 1 000)

Région	Tumeurs	Appareil	Appareil	Appareil	Organes	Trauma-	Ensemble des diagnostics	
		circulatoire	respiratoire	digestif	génito-urin.	tismes	Nombre ⁶	Taux
Bas-Saint-Laurent (01)	9,6	17,1	14,8	16,0	9,5	12,5	26 839	125,5
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	8,8	17,2	15,1	16,1	10,0	10,8	34 392	125,8
Québec (03)	7,8	15,4	10,6	13,0	6,8	7,0	63 681	96,4
Mauricie — Bois-Francis (04)	8,3	15,9	12,7	14,4	8,9	9,0	55 180	110,4
Estrie (05)	9,0	18,2	10,9	13,9	7,8	7,8	31 291	108,1
Montréal-Centre (06)	8,2	11,9	8,5	11,1	6,9	6,6	181 422	89,7
Outaouais (07)	8,4	12,8	12,4	13,6	8,2	8,9	28 470	98,6
Abitibi-Témiscamingue (08)	8,8	19,2	16,2	16,1	9,7	10,9	19 049	129,0
Côte-Nord (09)	11,5	25,0	20,3	19,6	10,1	11,8	14 943	159,5
Nord-du-Québec (10)	11,9	28,0	26,8	21,3	14,0	15,8	2 953	195,4
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	10,8	20,2	17,0	17,3	10,8	13,1	15 682	144,0
Chaudière-Appalaches (12)	7,4	18,1	12,7	12,7	7,4	10,4	39 741	105,2
Laval (13)	7,7	12,0	6,4	9,9	6,0	5,5	26 393	80,5
Lanaudière (14)	8,6	16,5	10,9	11,7	7,0	8,5	34 170	99,7
Laurentides (15)	8,6	14,3	8,8	11,6	7,0	8,0	38 116	94,7
Montérégie (16)	8,1	14,4	9,4	11,9	7,8	6,8	119 031	95,5
Nunavik (17)	8,1	21,7	53,0	28,9	12,4	21,9	1 739	250,3
Terres-Cries (18)	8,2	17,2	35,4	25,3	12,1	15,9	1 571	212,8
Ensemble du Québec	8,3	14,6	10,6	12,6	7,6	8,0	734 659	100,1

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 138-139.
- Les statistiques d'hospitalisation sont établies d'après les formulaires « abrégé admission/sortie » fournis par les hôpitaux de soins de courte durée. Les sorties sont occasionnées par le décès, la fin de l'hospitalisation ou le transfert vers un autre établissement. Une personne apparaît autant de fois dans le fichier qu'il y a de sorties établies à son nom. Les données se rapportent à des années financières, soit du 1^{er} avril au 31 mars (MSSS, 1995).
- Ajusté selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 1991.
- Les diagnostics retenus sont définis selon la neuvième révision de la Classification internationale des maladies. Les codes utilisés sont : tumeurs (140-239); appareil circulatoire (390-459); appareil respiratoire (460-519); appareil digestif (520-579); organes génito-urinaires (580-629) et traumatismes (E800-E999).
- Les statistiques sur les hospitalisations ne comprennent que celles ayant eu lieu au Québec. Pour les régions limitrophes, en particulier l'Outaouais, où une partie importante des hospitalisations ont lieu dans une province voisine, les données peuvent présenter une certaine sous-déclaration (MSSS, 1991).
- Nombre annuel moyen d'hospitalisations.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

43. TAUX D'INCIDENCE DU CANCER

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer à la population au milieu de cette période.

- Le terme « cancer » regroupe une soixantaine de tumeurs malignes comprises à l'intérieur des codes CIM-9 140 à 208. Les tumeurs bénignes (211-226), les tumeurs à évolution imprévisible (235-239), les carcinomes *in situ* (230-234) et ceux de la peau, à l'exception du mélanome (173), sont exclus.
- Les cas de cancer qui sont diagnostiqués en cabinet de médecin et traités à l'hôpital sur une base externe, sans passer par l'hospitalisation ou la chirurgie d'un jour, ne sont pas déclarés au fichier des tumeurs.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer pour une période donnée}}{\text{Population totale au milieu de la période}} \times 100\,000$

Sources : Numérateur : Fichier des tumeurs du Québec (version mai 1996), MSSS.
Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : Pour l'ensemble du Québec, de 1984-1986 à 1990-1992, le taux ajusté d'incidence du cancer est demeuré stable. Peu importe la période, le taux des hommes est toujours plus élevé que celui des femmes.

- Parmi les principaux sièges de cancer, seul celui de la prostate montre une augmentation sensible alors que les autres taux d'incidence sont demeurés relativement stables.
- Pour la période 1990-1992, les régions de la Côte-Nord, de l'Abitibi-Témiscamingue et du Saguenay—Lac-Saint-Jean présentent des taux significativement supérieurs à celui du Québec, tandis qu'une autre enregistre un taux inférieur : la Chaudière-Appalaches.
- En 1984-1986, trois régions présentaient un taux excédant celui du Québec : la Côte-Nord, le Saguenay—Lac-Saint-Jean, et Montréal-Centre. Entre 1984-1986 et 1990-1992, deux régions, le Nord-du-Québec et les Terres-Cries-de-la-Baie-James, ont vu leur taux augmenter de plus de 20 %.


1. Taux ajusté² d'incidence du cancer selon le sexe, Québec, 1984-1986 à 1990-1992



2. Taux ajusté² d'incidence du cancer selon le siège, Québec, 1984-1986 à 1990-1992



3. Indice comparatif d'incidence du cancer selon la région, Québec, 1990-1992



4. Taux ajusté² d'incidence du cancer selon le siège et la région, Québec, 1984-1986 à 1990-1992 (taux annuel moyen pour 100 000)

Région	1984-1986	1990-1992					Variation de 1984-1986 à 1990-1992	
	Ensemble des sièges	Côlon-rectum	Poumon	Sein la femme	Prostate	Ensemble des sièges		%
						Nombre ³	Taux	
Bas-Saint-Laurent (01)	376	55	71	106	76 (-)	887	388	3
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	441 (+)	55	86 (+)	103	70 (-)	1 056	421 (+)	-5
Québec (03)	393	52	70	93	90	2 497	384	-2
Mauricie — Bois-Francs (04)	366 (-)	52	67	84	102	1 984	381	4
Estrie (05)	392	53	68	93	99	1 126	385	-2
Montréal-Centre (06)	403 (+)	53	68	94	85	8 504	394	-2
Outaouais ⁴ (07)	310	50	77	87	76	853	355	15
Abitibi-Témiscamingue (08)	378	57	93 (+)	87	97	560	435 (+)	15
Côte-Nord (09)	508 (+)	47	108 (+)	99	127	372	493 (+)	-3
Nord-du-Québec (10)	*346	**59	**94	**59	**131	42	*480	38
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	429	44	84	94	83	449	396	-8
Chaudière-Appalaches (12)	364 (-)	52	64	83	74 (-)	1 320	360 (-)	-1
Laval (13)	406	57	71	106	95	1 190	405	0
Lanaudière (14)	403	58	79	89	92	1 182	408	1
Laurentides (15)	403	56	71	96	107	1 397	400	-1
Montérégie (16)	392	53	67	92	112 (+)	4 263	390	-1
Nunavik (17)	**567	**62	**177	**95	0	13	*490	n.a.
Terres-Cries (18)	*253	**59	**29	**115	**43	12	*308	22
Ensemble du Québec	393	53	70	93	92	27 707	391	0

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 140-141.
 - Ajusté selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 1991.
 - Nombre annuel moyen de nouveaux cas de cancer.
 - Les nouveaux cas de cancer diagnostiqués à l'extérieur du Québec ne sont pas inclus dans le fichier des tumeurs. Cette situation touche surtout la région de l'Outaouais où l'on retrouve une sous-déclaration de l'incidence d'au moins 20 % (Beaupré, 1995).
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

44. ESPÉRANCE DE VIE

Définition¹ : Nombre moyen d'années additionnelles à vivre à un âge donné dans l'hypothèse où les taux de mortalité par âge observés durant une année ou une période déterminée demeureraient stables dans le temps.

– Dans le calcul de l'espérance de vie à la naissance, on fait parcourir tous les âges de la vie à un effectif arbitraire de nouveau-nés, en lui faisant subir à ces divers âges les probabilités de décéder qui ont été observées durant une période donnée.

Méthode de calcul : Méthode actuarielle.


Sources : Numérateur : Fichiers des décès et des naissances, MSSS.

Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.

Faits saillants : L'espérance de vie à la naissance de la population québécoise continue d'augmenter au cours des ans. En 1993-1994, elle est de 81,0 ans chez les femmes et de 74,1 ans chez les hommes. Pour la première fois, l'écart entre les hommes et les femmes est inférieur à sept ans.

- Entre 1981-1983 et 1993-1994, à tous les âges, tant chez les hommes que chez les femmes, l'espérance de vie s'est accrue. En 1993-1994, à 65 ans, les femmes peuvent espérer vivre en moyenne près de 20 ans et les hommes, un peu plus de 15 ans.
- En 1990-1992, des espérances de vie à la naissance (sexes réunis) inférieures à 76 ans sont observées au Nunavik, dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James, dans le Nord-du-Québec et au Saguenay—Lac-Saint-Jean. Une seule région enregistre une longévité supérieure à 78 ans, soit la région de Laval.
- De 1981-1983 à 1990-1992, seule la région du Nunavik n'a pas bénéficié de la hausse de l'espérance de vie à la naissance observée dans l'ensemble du Québec.


1. Espérance de vie à la naissance selon le sexe, Québec, 1981-1983 à 1993-1994



2. Espérance de vie selon l'âge et le sexe, Québec, 1981-1983 et 1993-1994

		1981-1983 (ans)	1993-1994 (ans)	Gains (en années)
Hommes	0 an	71,6	74,1	2,5
	15 ans	57,6	59,8	2,2
	45 ans	29,6	31,7	2,1
	65 ans	14,2	15,3	1,1
	75 ans	8,9	9,4	0,5
Femmes	0 an	79,3	81,0	1,7
	15 ans	65,2	66,6	1,4
	45 ans	36,2	37,4	1,2
	65 ans	18,9	19,8	0,9
	75 ans	12,0	12,5	0,5

3. Espérance de vie à la naissance selon la région, Québec, 1990-1992



4. Espérance de vie à la naissance selon la région, Québec, 1981-1983 à 1990-1992 (en années)

Région	1981-1983	1984-1986	1987-1989	1990-1992			Variation de 1981-1983 à 1990-1992
				Hommes	Femmes	Total	
Bas-Saint-Laurent (01)	75,6	76,1	76,3	73,7	81,1	77,3	1,7
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	73,7 (-)	74,4 (-)	75,5 (-)	72,3 (-)	79,7 (-)	75,9 (-)	2,2
Québec (03)	75,5	75,9	76,5 (+)	73,6	81,1	77,5 (+)	2,1
Mauricie — Bois-Francis (04)	75,4	75,7	75,8 (-)	73,3 (-)	80,9	77,1	1,7
Estrie (05)	75,3	75,9	76,7 (+)	74,1	81,0	77,6	2,3
Montréal-Centre (06)	75,6 (+)	76,1 (+)	76,5 (+)	73,7	81,0	77,5 (+)	1,9
Outaouais (07)	74,3 (-)	74,6 (-)	75,7 (-)	72,9 (-)	80,3 (-)	76,5 (-)	2,2
Abitibi-Témiscamingue (08)	73,9 (-)	74,3 (-)	74,8 (-)	72,9 (-)	80,3	76,4 (-)	2,4
Côte-Nord (09)	74,5 (-)	74,3 (-)	75,5 (-)	73,0	80,4	76,4 (-)	1,8
Nord-du-Québec (10)	73,7 (-)	77,9 (+)	75,6	70,8 (-)	76,6 (-)	75,1 (-)	1,4
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	74,9	75,0 (-)	76,1	73,5	81,1	77,1	2,2
Chaudière-Appalaches (12)	76,0 (+)	76,3 (+)	76,8 (+)	73,6	81,5 (+)	77,4	1,5
Laval (13)	76,1 (+)	76,5 (+)	77,4 (+)	75,2 (+)	81,1	78,2 (+)	2,1
Lanaudière (14)	75,1	75,4 (-)	75,4 (-)	73,8	80,0 (-)	76,8 (-)	1,7
Laurentides (15)	74,7 (-)	75,7	75,9 (-)	73,6	80,5	76,9 (-)	2,2
Montérégie (16)	75,6 (+)	76,1 (+)	76,4	74,1 (+)	80,8	77,5	1,9
Nunavik (17)	64,5 (-)	61,5 (-)	67,5 (-)	60,5 (-)	65,4 (-)	63,6 (-)	-0,9
Terres-Cries (18)	72,7	72,1 (-)	74,3	70,8	75,6 (-)	73,3 (-)	0,7
Ensemble du Québec	75,4	75,8	76,3	73,7	80,8	77,3	1,9

Notes :

1. Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 142-143.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

45. TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, des décès d'enfants de moins d'un an aux naissances vivantes.

– La mortalité infantile peut être subdivisée en plusieurs catégories : néonatale précoce (moins de 7 jours), néonatale tardive (7-27 jours) et post-néonatale (28 jours et plus).


Méthode de calcul : $\frac{\text{Nombre de décès d'enfants de moins d'un an, pour une période donnée}}{\text{Total des naissances vivantes durant la même période}} \times 1\,000$

Sources : Numérateur : Fichier des décès, MSSS.
Dénominateur : Fichier des naissances, MSSS.


Faits saillants : La mortalité infantile et ses composantes n'ont cessé de chuter au Québec depuis le début des années 80. C'est la mortalité survenant au cours de la première semaine de vie (néonatale précoce) qui montre la plus forte diminution.

- Les principales causes de mortalité infantile sont les anomalies congénitales, les autres affections périnatales, la mort soudaine du nourrisson, la détresse respiratoire ainsi que la courte gestation et le faible poids. Deux causes, les anomalies congénitales et la mort soudaine du nourrisson, présentent une baisse importante entre 1981-1983 et 1993-1994 tandis que les autres causes ont peu varié durant cette période.
- En 1990-1992, deux régions subissent une mortalité infantile significativement supérieure à la moyenne québécoise : le Nunavik et le Saguenay—Lac-Saint-Jean. À l'opposé, seule la région de Lanaudière se distingue par une mortalité infantile significativement plus faible que celle de l'ensemble du Québec.
- De 1981-1983 à 1990-1992, le Nunavik est l'unique région à enregistrer une hausse du taux de mortalité infantile. En contrepartie, quatre régions (Terres-Cries-de-la-Baie-James, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, Abitibi-Témiscamingue et Outaouais) ont vu leur taux diminuer de plus de 40 %.


1. Taux de mortalité infantile selon ses composantes, Québec, 1981-1983 à 1993-1994



2. Taux de mortalité infantile selon la cause², Québec, 1981-1983 à 1993-1994



3. Taux de mortalité infantile selon la région, Québec, 1990-1992



4. Taux de mortalité infantile selon la région³, Québec, 1981-1983 à 1990-1992 (taux pour 1 000 naissances vivantes)

Région	1981-1983	1984-1986	1987-1989	1990-1992		Variation de 1981-1983 à 1990-1992
				Nombre ⁴	Taux	%
Bas-Saint-Laurent (01)	9,5	7,7	6,5	15	6,1	-36
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	10,1 (+)	8,7	6,2	31	8,1 (+)	-20
Québec (03)	8,1	6,4	6,8	40	5,3	-35
Mauricie — Bois-Francis (04)	8,6	8,0	7,6	33	5,5	-36
Estrie (05)	9,5	6,8	7,4	23	6,2	-35
Montréal-Centre (06)	8,5	7,6	6,9	153	6,3	-25
Outaouais (07)	8,6	7,4	7,1	23	5,0	-42
Abitibi-Témiscamingue (08)	10,0	7,9	10,1 (+)	14	5,8	-42
Côte-Nord (09)	8,3	*7,4	*7,8	9	*5,8	-30
Nord-du-Québec (10)	*15,3 (+)	*7,6	*8,3	2	**5,9	n.a.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	12,6 (+)	10,0	*6,0	9	*7,1	-44
Chaudière-Appalaches (12)	7,2	6,6	6,6	31	6,2	-15
Laval (13)	6,9	7,1	5,2 (-)	23	5,1	-27
Lanaudière (14)	5,9 (-)	6,0	6,3	25	4,6 (-)	-22
Laurentides (15)	7,2	7,6	7,4	35	5,8	-20
Montréal (16)	7,1 (-)	6,3 (-)	6,4	96	5,4	-24
Nunavik (17)	*31,0 (+)	*36,5 (+)	*26,5 (+)	9	*32,4 (+)	5
Terres-Cries (18)	*20,1 (+)	*14,5	**7,6	3	*10,8	-46
Ensemble du Québec	8,3	7,3	6,9	573	5,9	-29

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 144-145.
 - Les causes retenues sont définies selon la neuvième révision de la Classification internationale des maladies. Les codes utilisés sont : anomalies congénitales (740-759); courte gestation et faible poids (765); détresse respiratoire (769); autres affections périnatales (760-764, 766, 770-779) et mort soudaine du nourrisson (798.0).
 - En 1990 et 1991, un nombre élevé de naissances survenues en Ontario auraient été attribuées aléatoirement à l'Outaouais. Le taux de mortalité infantile de l'Outaouais obtenu pour la période 1990-1992 représente donc une estimation.
 - Nombre annuel moyen de décès infantiles.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

46. TAUX DE MORTALITÉ PÉRINATALE

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, de la somme des mortinaissances (enfants pesant au moins 500 grammes ou dont l'âge gestationnel est de plus de 22 semaines) et des décès d'enfants de moins de 7 jours aux naissances totales (mortinaissances et naissances vivantes).

– Le taux de mortinatalité correspond au rapport du nombre des mortinaissances aux naissances totales.

Méthode de calcul :

$$\frac{\text{Nombre de mortinaissances et de décès d'enfants de moins de 7 jours pour une période donnée}}{\text{Total des naissances vivantes et des mortinaissances durant la même période}} \times 1\,000$$

Sources : Numérateur : Fichiers des décès et des mortinaissances, MSSS.


Dénominateur : Fichiers des naissances et des mortinaissances, MSSS.

Faits saillants : La mortalité périnatale est à la baisse au Québec. Entre 1981-1983 et 1993-1994, le taux de mortalité périnatale ainsi que le taux de mortinatalité ont diminué du tiers.

- En 1993-1994, les principales causes de mortalité périnatale sont les autres affections périnatales, les anomalies congénitales, la courte gestation et faible poids, la détresse respiratoire, ainsi que l'hypoxie et asphyxie. À l'exception de l'hypoxie et asphyxie, toutes ces causes sont en diminution.
- En 1990-1992, seule la région du Nunavik montre un taux de mortalité périnatale significativement supérieur à la moyenne québécoise. À l'inverse, on retrouve également une seule région, la Montérégie, enregistrant un taux significativement plus bas que celui de l'ensemble du Québec.
- À l'exception de Lanaudière, toutes les régions ont bénéficié d'une diminution de la mortalité périnatale entre 1981-1983 et 1990-1992.


1. Taux de mortalité périnatale et de mortinatalité, Québec, 1981-1983 à 1993-1994

Taux pour 1 000 naissances




2. Taux de mortalité périnatale selon la cause², Québec, 1981-1983 à 1993-1994

Taux pour 1 000 naissances



3. Taux de mortalité périnatale selon la région, Québec, 1990-1992

4. Taux de mortalité périnatale selon la région³, Québec, 1981-1983 à 1990-1992
(taux pour 1 000 naissances)

Région	1981-1983	1984-1986	1987-1989	1990-1992		Variation de 1981-1983 à 1990-1992
				Nombre ⁴	Taux	%
Bas-Saint-Laurent (01)	13,1	9,1	9,1	20	8,1	-38
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	11,0	9,6	8,7	39	8,6	-21
Québec (03)	9,4 (-)	9,7	8,3	52	7,0	-26
Mauricie — Bois-Francs (04)	12,1	9,7	9,7	46	7,8	-36
Estrie (05)	11,3	8,7	10,5	27	7,3	-36
Montréal-Centre (06)	11,0	9,9	9,1	203	8,4	-24
Outaouais (07)	11,3	7,2 (-)	7,2 (-)	35	7,6	-33
Abitibi-Témiscamingue (08)	10,5	8,3	12,0 (+)	15	6,2	-42
Côte-Nord (09)	12,8	10,7	*7,5	14	9,5	-26
Nord-du-Québec (10)	*11,3	*9,1	*10,0	3	*8,9	-22
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	18,1 (+)	12,3	11,0	14	10,3	-43
Chaudière-Appalaches (12)	9,6	9,0	8,9	41	8,2	-15
Laval (13)	7,9 (-)	9,9	5,8 (-)	34	7,3	-8
Lanaudière (14)	7,6 (-)	8,9	7,8	44	8,2	7
Laurentides (15)	10,7	10,4	8,7	41	6,8	-37
Montérégie (16)	9,8 (-)	9,1	8,7	121	6,7 (-)	-31
Nunavik (17)	*24,0	*30,0 (+)	*16,1	5	*16,7 (+)	-31
Terres-Cries (18)	**10,7	**7,2	**7,5	1	**3,6	n.a.
Ensemble du Québec	10,8	9,6	8,9	755	7,7	-29

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 146-147.
 - Les causes retenues sont définies selon la neuvième révision de la Classification internationale des maladies. Les codes utilisés sont : anomalies congénitales (740-759); courte gestation et faible poids (765); hypoxie et asphyxie (768); détresse respiratoire (769) et autres affections périnatales (760-764, 766, 770-779).
 - En 1990 et 1991, un nombre élevé de naissances survenues en Ontario auraient été attribuées aléatoirement à l'Outaouais. Le taux de mortalité infantile de l'Outaouais obtenu pour la période 1990-1992 représente donc une estimation.
 - Nombre annuel moyen de mortinaissances et de décès d'enfants de moins de 7 jours.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

47. TAUX DE MORTALITÉ SELON LA CAUSE

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès, pour une cause spécifique, à la population totale au milieu de la période.

– La cause retenue correspond à la cause initiale du décès définie selon la neuvième révision de la Classification internationale des maladies de l'OMS.

Méthode de calcul :

$$\frac{\text{Nombre annuel moyen de décès, pour une cause spécifique, pour une période donnée}}{\text{Population totale au milieu de la période}} \times 100\,000$$


Sources : Numérateur : Fichier des décès, MSSS.

Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : Le taux de mortalité au Québec continue de régresser. Le taux ajusté de mortalité a diminué de 14 % entre 1981-1983 et 1993-1994. La baisse a été un peu plus forte chez les hommes (15 %) que chez les femmes (13 %). Malgré cela, les hommes présentent toujours une surmortalité importante par rapport aux femmes.

- Les principales causes de mortalité sont, dans l'ordre, les maladies de l'appareil circulatoire, les tumeurs, les maladies de l'appareil respiratoire et les traumatismes. Au cours des dernières années, les taux de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire et par traumatismes ont décliné, alors que les taux de décès par tumeurs et par maladies de l'appareil respiratoire sont demeurés relativement stables.
- En 1990-1992, six régions se démarquent par une mortalité significativement supérieure à la moyenne québécoise : Nunavik, Saguenay—Lac-Saint-Jean, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière et Laurentides. À l'opposé, les régions de Laval et de Montréal-Centre se retrouvent avec des valeurs significativement plus faibles.
- Seul le Nunavik montre une croissance de la mortalité entre 1981-1983 et 1990-1992. Le Saguenay—Lac-Saint-Jean et Lanaudière enregistrent pour toutes les causes, sauf pour les maladies de l'appareil circulatoire, des taux significativement supérieurs.


1. Taux ajusté² de mortalité selon le sexe, Québec, 1981-1983 à 1993-1994



2. Taux ajusté² de mortalité selon la cause³, Québec, 1981-1983 à 1993-1994



3. Indice comparatif de mortalité selon la région, Québec, 1990-1992



4. Taux ajusté² de mortalité selon la cause³ et la région, Québec, 1990-1992

(taux annuel moyen pour 100 000)

Région	1981-1983	1990-1992					Variation de 1981-1983 à 1990-1992	
	Ensemble des causes	Tumeurs	Appareil circulatoire	Appareil respiratoire	Traumatismes	Ensemble des causes	Nombre ^a	Taux
Bas-Saint-Laurent (01)	776	199	261	63	60	1 646	697	-10
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	935 (+)	238 (+)	273	66 (+)	61 (+)	1 805	771 (+)	-18
Québec (03)	792	211	255	59	44	4 470	684	-14
Mauricie — Bois-Francs (04)	784	203	264	60	57 (+)	3 671	696	-11
Estrie (05)	796	193 (-)	264	52	53	2 056	676	-15
Montréal-Centre (06)	772 (-)	206	251 (-)	52 (-)	40 (-)	15 210	674 (-)	-13
Outaouais (07)	864 (+)	211	285 (+)	62	46	1 712	741 (+)	-14
Abitibi-Témiscamingue (08)	875 (+)	225	284	61	66 (+)	914	740 (+)	-16
Côte-Nord (09)	894 (+)	251 (+)	235	66	72 (+)	495	740	-17
Nord-du-Québec (10)	903	*333	*299	**61	**38	56	823	-9
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	788	213	249	47	55	809	692	-12
Chaudière-Appalaches (12)	749 (-)	198	257	57	66 (+)	2 540	685	-9
Laval (13)	777	211	254	47 (-)	40 (-)	1 774	658 (-)	-15
Lanaudière (14)	829 (+)	226 (+)	275	66 (+)	59 (+)	1 975	736 (+)	-11
Laurentides (15)	863 (+)	211	278 (+)	57	55	2 395	724 (+)	-16
Montérégie (16)	796	210	272 (+)	53	47	7 334	695	-13
Nunavik (17)	*1 270 (+)	**322	*415	**329	*274 (+)	51	1 454 (+)	14
Terres-Cries (18)	*890	**199	*269	**140	*129	38	855	-4
Ensemble du Québec	793	209	261	56	49	48 952	691	-13

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 148-149.
 - Ajusté selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 1991.
 - Les causes retenues sont définies selon la neuvième révision de la Classification internationale des maladies. Les codes utilisés sont : tumeurs (140-239); appareil circulatoire (390-459); appareil respiratoire (460-519) et traumatismes (E800-E999).
 - Nombre annuel moyen de décès.
- (-) (+) Taux significativement plus faible ou plus élevé que celui de l'ensemble du Québec.
 * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

48. TAUX DE MORTALITÉ PAR SUICIDE

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de décès par suicide, à la population totale au milieu de la période.

– Le suicide est défini à partir de la cause initiale du décès et correspond aux codes E950.0 à 959.9 de la CIM-9.

Méthode de calcul : $\frac{\text{Nombre annuel moyen de décès par suicide durant une période donnée}}{\text{Population totale au milieu de la période}} \times 100\,000$


Sources : Numérateur : Fichier des décès, MSSS.

Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : Au Québec, après avoir légèrement diminué au cours des années 80, le suicide a repris sa croissance au cours des années 90. Le taux de mortalité par suicide est quatre fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes.

- En 1993-1994, à tous les âges, les hommes présentent des taux nettement supérieurs à ceux des femmes. Les taux les plus élevés sont observés chez les hommes de 20 à 24 ans puis chez ceux de 25 à 54 ans.
- La mortalité par suicide présente en 1990-1992 des différences importantes d'une région à l'autre. Cependant, une seule région, la Chaudière-Appalaches, se démarque par un taux significativement plus élevé que la moyenne québécoise. On retrouve également une seule région enregistrant un taux significativement plus faible, soit Montréal-Centre.
- Entre 1981-1983 et 1990-1992, le taux de suicide a diminué de 7 % à l'échelle de l'ensemble du Québec. Quatre régions ont présenté une hausse supérieure à 15 % : Côte-Nord, Saguenay—Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent et Chaudière-Appalaches.


1. Taux ajusté² de mortalité par suicide selon le sexe, Québec, 1981-1983 à 1993-1994



2. Taux ajusté² de mortalité par suicide selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1994



3. Indice comparatif de mortalité par suicide selon la région, Québec, 1990-1992



4. Taux ajusté² de mortalité par suicide selon la région, Québec, 1981-1983 à 1990-1992 (taux annuel moyen pour 100 000)

Région	1981-1983	1984-1986	1987-1989	1990-1992		Variation de 1981-1983 à 1990-1992 %
				Nombre ³	Taux	
Bas-Saint-Laurent (01)	*13,2	*18,1	*15,9	33	*16,5	25
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	14,8	17,9	17,2	52	18,7	26
Québec (03)	21,2	16,2	18,6	109	16,9	-20
Mauricie — Bois-Francs (04)	18,4	17,6	20,8 (+)	93	20,1	9
Estrie (05)	19,2	17,3	18,5	48	17,7	-8
Montréal-Centre (06)	17,8	15,9	13,7 (-)	245	13,0 (-)	-27
Outaouais (07)	*16,1	19,1	18,3	48	16,6	3
Abitibi-Témiscamingue (08)	*29,2 (+)	*27,1 (+)	*24,4	35	*23,3	-20
Côte-Nord (09)	*14,9	*18,5	*15,1	21	*19,9	34
Nord-du-Québec (10)	**13,4	**18,6	*18,9	3	**14,6	n.a.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	*17,6	*15,3	*16,1	15	*14,4	-18
Chaudière-Appalaches (12)	20,1	20,8	17,2	86	23,6 (+)	17
Laval (13)	*13,7	12,6 (-)	11,9	44	13,3	-3
Lanaudière (14)	20,3	18,0	16,7	60	18,3	-10
Laurentides (15)	18,7	16,5	17,6	77	19,9	7
Montréal-Centre (16)	14,0 (-)	15,8	14,6	175	14,3	2
Nunavik (17)	**30,3	**25,9	**38,8	7	**73,1	n.a.
Terres-Cries (18)	0,0	**17,8	*9,6	3	**26,0	n.a.
Ensemble du Québec	17,5	16,8	16,0	1 155	16,3	-7

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 150-151.
 - Ajusté selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 1991.
 - Nombre annuel moyen de suicides.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

49. ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ

Définition¹ : Nombre moyen d'années à vivre en bonne santé, à partir d'un âge donné, dans l'hypothèse d'une stabilisation des taux d'incapacité et de mortalité par âge observés durant une période déterminée.

– L'espérance de vie en bonne santé correspond à l'espérance de vie sans incapacité ou sans perte d'autonomie.

Méthode de calcul : Méthode de Sullivan.

Sources : Fichier des décès, MSSS.
Fichier des établissements, MSSS.
Enquêtes de Santé Québec.
Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.
Recensements de Statistique Canada.

Faits saillants : L'espérance de vie en bonne santé à la naissance est à la hausse au Québec. Elle est passée de 61,8 ans en 1978 à 67,4 ans en 1992-1993. Le retard des hommes sur les femmes est demeuré stable à près de 3 ans.

- En 1992-1993, l'espérance de vie totale à la naissance est de 77,7 ans. L'espérance de vie avec perte d'autonomie est de 10,3 ans. De ces 10,3 ans, 2,4 ans sont passés avec une perte d'autonomie lourde, 4,5 ans avec une perte modérée et 3,3 ans avec une perte légère. L'écart entre les hommes et les femmes est de près de 7 ans pour l'espérance de vie totale, mais elle n'est que de 3 ans pour l'espérance de vie en bonne santé. À 65 ans, l'espérance de vie totale est de 18 ans et l'écart entre les sexes est de 4,6 ans. Cet écart diminue à 1,7 an pour l'espérance de vie en bonne santé.
- En 1992-1993, l'espérance de vie en bonne santé à la naissance est plus faible dans les régions suivantes : Nunavik, Côte-Nord, Lanaudière, Outaouais, Saguenay—Lac-Saint-Jean et Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine. À l'inverse, Laval, Montréal-Centre, la Montérégie et Québec sont les régions où l'espérance de vie en bonne santé est la plus élevée.
- Entre 1987 et 1992-1993, quatre régions (Côte-Nord, Chaudière-Appalaches, Montérégie et Bas-Saint-Laurent) ont vu leur espérance de vie en santé à la naissance diminuer de plus d'un an.

1. Espérance de vie en bonne santé à la naissance selon le sexe, Québec, 1978 à 1992-1993²

(en années)


	Hommes	Femmes	Total
1978 (Santé Canada)	60,4	63,1	61,8
1986 (ESLA)	62,4	66,3	64,4
1987 (Santé Québec)	64,0	68,2	66,1
1992-1993 (Santé Québec)	65,9	68,8	67,4

2. Espérance de vie en bonne santé à la naissance et à 65 ans selon la sévérité et le sexe, Québec, 1992-1993²

(en années)

	Hommes	Femmes	Total
Espérance de vie à la naissance	74,2	81,1	77,7
Sans perte d'autonomie (en bonne santé)	65,9	68,8	67,4
Avec perte d'autonomie	8,2	12,3	10,3
lourde	1,8	3,0	2,4
modérée	3,6	5,4	4,5
légère	2,9	3,8	3,3
Espérance de vie à 65 ans	15,5	20,1	18,0
Sans perte d'autonomie (en bonne santé)	11,5	13,2	12,4
Avec perte d'autonomie	4,0	6,9	5,6
lourde	1,5	2,5	2,0
modérée	1,8	3,5	2,7
légère	0,6	0,9	0,8

3. Espérance de vie en bonne santé à la naissance selon la région³, Québec, 1992-1993²



4. Espérance de vie en bonne santé à la naissance selon la région³, Québec, 1987 et 1992-1993² (en années)

Région	1987	1992-1993		Variation de 1987 à 1992-1993
	Espérance de vie en bonne santé	Espérance de vie 1990-1992	Espérance de vie avec perte d'autonomie	
Bas-Saint-Laurent (01)	66,5	77,3	11,8	-1,1
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	64,7	75,9	11,2	0,0
Québec (03)	67,9	77,5	10,5	-0,8
Mauricie — Bois-Francs (04)	66,4	77,1	11,1	-0,3
Estrie (05)	66,5	77,6	11,9	-0,8
Montréal-Centre (06)	65,4	77,5	9,5	2,6
Outaouais (07)	62,7	76,5	12,1	1,7
Abitibi-Témiscamingue (08)	66,4	76,4	10,9	-0,9
Côte-Nord (09)	66,3	76,4	13,1	-3,1
Nord-du-Québec (10)	n.d.	75,1	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	65,7	77,1	12,2	-0,8
Chaudière-Appalaches (12)	67,6	77,4	11,5	-1,7
Laval (13)	68,4	78,2	8,9	0,9
Lanaudière (14)	64,1	76,8	12,7	0,0
Laurentides (15)	64,1	76,9	10,2	2,6
Montréal-Centre (16)	69,3	77,5	9,9	-1,7
Nunavik ⁴ (17)	n.d.	63,6	5,9	n.a.
Terres-Cries (18)	n.d.	73,3	n.d.	n.d.
Ensemble du Québec	66,1	77,3	10,5	0,7

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 152-153.
- Les valeurs de l'espérance de vie en bonne santé présentées dans les tableaux 1 et 2 ne sont pas comparables à celles du graphique 3 et du tableau 4. Dans les deux premiers tableaux, pour 1987 et 1992-1993, les données sur les personnes en institution proviennent du fichier des établissements alors que celles utilisées dans le graphique 3 et le tableau 4 ont été tirées du recensement.
- Pour 1987, les espérances de vie en bonne santé des régions ont été calculées en utilisant les tables de mortalité de la période 1987-1989, les taux d'institutionnalisation du recensement de 1986 et les prévalences de l'incapacité de l'enquête de Santé Québec de 1987. Pour 1992-1993, les tables de mortalité utilisées sont celles de la période 1990-1992, les taux d'institutionnalisation proviennent du recensement de 1991 et les prévalences de l'incapacité sont celles observées lors de l'enquête sociale et de santé de 1992-1993.
- Les données sur l'incapacité sont tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik de 1992.

ESLA Enquête sur la santé et les limitations d'activités.

n.d. Non disponible.

n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

50. TAUX DES ANNÉES POTENTIELLES DE VIE PERDUES

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, de la somme des années de vie perdues avant 75 ans, à la population âgée de moins de 75 ans au milieu de la période.

– Les années potentielles de vie perdues à la suite d'un décès sont estimées en multipliant, pour chaque groupe d'âge, le nombre de décès par la différence entre 75 ans et l'âge moyen du décès dans chaque groupe d'âge.

Méthode de calcul :

Nombre annuel moyen d'années potentielles de vie perdues, pour une période donnée x 100 000

Population âgée de moins de 75 ans au milieu de cette période


Sources : Numérateur : Fichier des décès, MSSS.

Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : La mortalité prématurée est à la baisse au Québec. De 1981-1983 à 1993-1994, le taux des années potentielles de vie perdues a diminué de plus de 20 %. La baisse a été un peu plus marquée chez les hommes que chez les femmes mais les hommes continuent de présenter une surmortalité prématurée importante par rapport aux femmes.

- En 1993-1994, les principales causes de mortalité prématurée sont, dans l'ordre, les tumeurs, les traumatismes, les maladies de l'appareil circulatoire et les maladies de l'appareil respiratoire. La diminution de la mortalité prématurée provient principalement d'une diminution de la mortalité par maladies de l'appareil circulatoire. La mortalité prématurée liée aux tumeurs est demeurée relativement stable.
- Les régions présentant les taux les plus élevés de mortalité prématurée sont en 1990-1992 le Nunavik, les Terres-Cries-de-la-Baie-James, le Saguenay—Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et l'Abitibi-Témiscamingue. À l'autre extrême, Laval et la Montérégie enregistrent les valeurs les plus basses.
- La mortalité prématurée a augmenté légèrement entre 1981-1983 et 1990-1992 dans le Nunavik et dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James alors qu'elle a diminué dans toutes les autres régions.


1. Taux ajusté² des années potentielles de vie perdues selon le sexe, Québec, 1981-1983 à 1993-1994



2. Taux ajusté² des années potentielles de vie perdues selon la cause³, Québec, 1981-1983 à 1993-1994



3. Indice comparatif des années potentielles de vie perdues selon la région, Québec, 1990-1992



4. Taux ajusté² des années potentielles de vie perdues selon la cause³ et la région, Québec, 1990-1992 (taux annuel moyen pour 100 000)

Région	1981-1983 Ensemble des causes	1990-1992						Variation de 1981-1983 à 1990-1992	
		Tumeurs	Appareil circulatoire	Appareil respiratoire	Trauma- tismes	Ensemble des causes		%	
						Nombre ⁴	Taux		
Bas-Saint-Laurent (01)	7 815	1 807 (-)	1 225	276 (+)	1 911 (+)	12 937	6 591	-16	
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	8 800 (+)	2 134 (+)	1 445 (+)	227	2 000 (+)	20 486	7 535 (+)	-14	
Québec (03)	7 856	1 999 (+)	1 279	209	1 371 (-)	37 995	6 245 (-)	-21	
Mauricie — Bois-Francis (04)	7 907	1 919	1 327 (+)	252 (+)	2 028 (+)	31 579	6 903 (+)	-13	
Estrie (05)	8 185 (+)	1 773 (-)	1 221 (-)	225	1 652 (+)	16 360	6 259 (-)	-24	
Montréal-Centre (06)	7 915	1 931	1 274	231 (+)	1 224 (-)	120 299	6 656 (+)	-16	
Outaouais (07)	8 499 (+)	1 875	1 476 (+)	216	1 543 (-)	18 282	6 765 (+)	-20	
Abitibi-Témiscamingue (08)	9 138 (+)	2 093 (+)	1 456 (+)	246	2 124 (+)	10 289	7 219 (+)	-21	
Côte-Nord (09)	8 523 (+)	2 352 (+)	1 016 (-)	224	2 507 (+)	7 301	7 453 (+)	-13	
Nord-du-Québec (10)	9 463 (+)	2 077	1 213	264	1 657	1 177	6 610	-30	
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	9 126 (+)	2 025 (+)	1 263	188 (-)	1 827 (+)	7 103	7 032 (+)	-23	
Chaudière-Appalaches (12)	7 689 (-)	1 718 (-)	1 169 (-)	220	2 259 (+)	23 235	6 627 (+)	-14	
Laval (13)	6 705 (-)	1 905	1 057 (-)	156 (-)	1 197 (-)	17 236	5 441 (-)	-19	
Lanaudière (14)	7 806 (-)	2 026 (+)	1 282	209	1 689 (+)	20 336	6 354 (-)	-19	
Laurentides (15)	8 069 (+)	1 930	1 298	188 (-)	1 768 (+)	24 512	6 595 (+)	-18	
Montréal (16)	7 396 (-)	1 874 (-)	1 241 (-)	213	1 475 (-)	70 171	6 063 (-)	-18	
Nunavik (17)	21 220 (+)	2 931 (+)	3 264 (+)	2 041 (+)	9 382 (+)	1 912	22 001 (+)	4	
Terres-Cries (18)	10 576 (+)	1 127 (-)	1 993 (+)	*582 (+)	5 486 (+)	950	10 746 (+)	2	
Ensemble du Québec	7 912	1 922	1 270	221	1 589	442 159	6 523	-18	

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 154-155.
 - Ajusté selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 1991.
 - Les causes retenues sont définies selon la Classification internationale des maladies. Les codes utilisés sont : tumeurs (140-239); appareil circulatoire (390-459); appareil respiratoire (460-519) et traumatismes (E800-E999).
 - Nombre annuel moyen d'années potentielles de vie perdues.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

51. TAUX DE VICTIMES D'ACCIDENTS DE VÉHICULES ROUTIERS

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de victimes d'accidents de véhicules routiers à la population totale au milieu de cette période.

- Un accident de véhicule routier est défini comme étant un événement au cours duquel un dommage est causé par un véhicule routier en mouvement².
- Les statistiques compilées par la SAAQ se rapportent à la région de l'événement et non à la région de résidence des victimes. Il n'est donc pas possible de calculer des taux se rapportant à la population résidente des différentes régions.

Méthode de calcul :

$$\frac{\text{Nombre annuel moyen de victimes d'accidents de véhicules routiers durant une période donnée}}{\text{Population totale au milieu de la période}} \times 100\,000$$


Sources : Numérateur : Registre des rapports d'accidents, SAAQ.

Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : Le taux de victimes d'accidents de véhicules routiers est à la baisse au Québec. Depuis 1986-1988, on assiste à une diminution constante du taux de victimes d'accidents de véhicules routiers. Cette diminution est observée tant pour les blessures mortelles que pour les blessures graves et légères.

- En 1992-1994, à tous les âges, à l'exception des 45-54 ans, les hommes présentent des taux plus élevés que les femmes. Chez les deux sexes, le taux de victimes d'accidents de véhicules routiers atteint un sommet dans le groupe des 15-19 ans et dans celui des 20-24 ans, pour ensuite diminuer avec l'âge.
- Pour l'ensemble du Québec, le nombre de victimes d'accidents de la route a régressé de 8 % entre 1989-1991 et 1992-1994. Dans une seule région, le Bas-Saint-Laurent, le nombre de victimes a progressé d'une période à l'autre. Trois autres régions enregistrent des baisses inférieures à 5 % : Chaudière-Appalaches, Mauricie—Bois-Francs et Abitibi-Témiscamingue. Des diminutions dépassant 10 % sont observées pour Montréal-Centre, les Laurentides et la Côte-Nord.


1. Taux de victimes d'accidents de véhicules routiers selon la nature des blessures³, Québec, 1980-1982 à 1992-1994



2. Taux de victimes d'accidents de véhicules routiers selon l'âge et le sexe, Québec, 1992-1994



3. Variation du nombre de victimes d'accidents de véhicules routiers selon la région³ de l'événement, Québec, 1989-1991 à 1992-1994



4. Répartition des victimes⁵ d'accidents de véhicules routiers selon la nature des blessures³ et la région⁴ de l'événement, Québec, 1989-1991 et 1992-1994

Région	1989-1991 N	1992-1994			Total		Variation de 1989-1991 à 1992-1994 %
		Mortelles %	Graves %	Légères %	N	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	1 647	3	18	79	1 675	100	2
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	2 281	3	16	81	2 076	100	-9
Québec (03)	4 107	2	14	85	3 916	100	-5
Mauricie — Bois-Francs (04)	3 630	3	16	82	3 563	100	-2
Estrie (05)	2 389	2	14	83	2 163	100	-9
Montréal-Centre (06)	13 457	1	9	90	11 870	100	-12
Outaouais (07)	2 524	2	12	86	2 401	100	-5
Abitibi-Témiscamingue (08)	1 223	4	16	80	1 169	100	-4
Côte-Nord (09)	880	3	17	80	790	100	-10
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	100	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	873	3	18	79	793	100	-9
Chaudière-Appalaches (12)	2 692	3	16	81	2 658	100	-1
Laval (13)	2 261	1	5	94	2 137	100	-5
Lanaudière (14)	3 410	2	14	84	3 133	100	-8
Laurentides (15)	3 719	2	14	84	3 328	100	-11
Montérégie (16)	9 524	2	14	85	8 723	100	-8
Nunavik (17)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	100	n.d.
Terres-Cries (18)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	100	n.d.
Ensemble du Québec	54 857	2	13	85	50 615	100	-8

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 156-157.
- Le type de véhicule impliqué dans les accidents est, à l'exception du taxi, déterminé par les policiers dans les rapports d'accidents. Ces types sont regroupés comme suit : automobile, autobus, autobus scolaire, taxi, camion léger, camion lourd, tracteur routier, véhicule d'équipement et véhicule-outil, motocyclette, cyclomoteur, motoneige, bicyclette, autres (incluant les véhicules d'urgence et de loisir) (SAAQ, 1995).
- Une blessure est dite grave ou légère selon qu'elle nécessite ou non l'hospitalisation de la victime (SAAQ, 1995).
- Les données sur les victimes d'accidents de véhicules routiers sont disponibles à l'échelle des régions administratives. La région administrative du Nord-du-Québec correspond à la somme de trois régions sociosanitaires : Nord-du-Québec, Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James. Ces données ne sont donc pas disponibles pour ces trois régions prises séparément.
- Nombre annuel moyen de victimes.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

3. CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ

Incapacité

Utilisation des services

*Consommation de
médicaments*

3. CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ

Les conséquences des problèmes de santé sont divisées en trois sections (qui ne sont pas mutuellement exclusives) : l'**Incapacité**, l'**Utilisation de services** et la **Consommation de médicaments**.

L'**Incapacité**, selon l'Organisation mondiale de la santé, « correspond à toute réduction [...] partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon normale ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain » (OMS, 1981). L'incapacité peut être permanente ou temporaire. Lorsqu'elle est temporaire, elle peut être de court ou de long terme. L'incapacité peut provenir d'un problème de santé physique, de santé mentale, ou peut même être induite socialement.

Dans cette section, un seul indicateur mesure spécifiquement l'incapacité à court terme (la *durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle*); cependant, certains éléments de ce type d'incapacité peuvent être retrouvés parmi les indicateurs suivants : la *prévalence des principaux problèmes de santé* (dans la section des indicateurs d'état de santé subjectif) ainsi que les deux indicateurs de morbidité hospitalière. Un indicateur de handicap se retrouve aussi dans la section des incapacités (la *proportion d'enfants handicapés*).

L'**Utilisation des services** résulte de l'interaction du comportement de l'individu « qui entreprend une démarche de recours à des soins et [...] du professionnel de la santé qui dirige le malade dans le système de soins » (Pineault, Daveluy, 1986). Par exemple, l'utilisation de services peut avoir trait au type, à la fréquence et à la durée des consultations auprès de professionnels de la santé ou auprès de thérapeutes alternatifs. Elle peut aussi avoir trait au nombre et à la durée des séjours en milieu hospitalier, au nombre et à la durée des visites en urgence ou en clinique externe — tant du point de vue des coûts économiques que du point de vue des ressources humaines, matérielles et techniques utilisées.

Dans la section sur l'utilisation des services, on retrouve un indicateur général touchant l'ensemble des consultations médicales et trois indicateurs traitant de l'utilisation des services hospitaliers.

La **Consommation de médicaments** renvoie à l'utilisation de médicaments prescrits par ordonnance ou non et englobe les notions de quantité, de type ainsi que de fréquence et de durée de consommation.

Deux indicateurs se rapportent à la consommation de médicaments. Le premier provient des enquêtes et le second, qui touche plus spécifiquement les personnes âgées, est tiré des fichiers administratifs.

52. DURÉE MOYENNE D'INDEMNISATION PAR LÉSION PROFESSIONNELLE

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre total de jours indemnisés pour des lésions professionnelles, au nombre total de lésions professionnelles déclarées et indemnisées pendant cette même période.

- Une lésion professionnelle se définit comme étant un accident de travail ou une maladie professionnelle. Les lésions déclarées et indemnisées sont celles ayant été admises par l'organisme payeur et ayant nécessité une indemnité de remplacement de revenu, une indemnité pour dommages corporels, une indemnité de décès, des frais d'assistance médicale ou des frais de réadaptation.

Méthode de calcul :

Nombre total de jours indemnisés pour des lésions professionnelles durant une période donnée


Nombre total de lésions professionnelles survenues durant la même période

Sources : Fichier des lésions professionnelles, CSST.


Faits saillants : Au Québec, la durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle présente une baisse importante au cours des dernières années. Après avoir atteint un sommet de 62 jours en 1990, la durée d'indemnisation atteint un minimum de 41 jours en 1993.

- En 1993, la durée de l'indemnisation varie d'un secteur d'activité à l'autre. Elle est de 71 jours dans le secteur de la construction, de 55 jours dans le secteur primaire, d'un peu plus de 40 jours dans les secteurs du transport et de la communication, du commerce et des services, et de 33 jours dans le secteur manufacturier.
- Des durées moyennes d'indemnisation supérieures à 50 jours sont observées en 1993 dans les régions de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, de l'Abitibi-Témiscamingue, de l'Outaouais et des Terres-Cries-de-la-Baie-James. Les durées les plus courtes se retrouvent dans le Nunavik, dans Chaudière-Appalaches, en Estrie et à Québec.
- Quel que soit le secteur d'activité, les régions de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, de l'Abitibi-Témiscamingue et de l'Outaouais présentent toujours des durées moyennes supérieures à celles de l'ensemble du Québec.


1. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle, Québec, 1986 à 1993



2. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle selon le secteur d'activité², Québec, 1993



3. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle selon la région de résidence, Québec, 1993



4. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle selon le secteur d'activité² et la région de résidence, Québec, 1993

(en journées)

Région	Secteur primaire	Secteur manufacturier	Construction	Transport et communication	Commerce	Services	Total	
							Nombre de journées	Durée
Bas-Saint-Laurent (01)	54	26	80	57	53	40	154 536	44
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	51	34	60	44	36	37	161 903	39
Québec (03)	48	29	69	37	35	33	464 148	35
Mauricie — Bois-Francs (04)	46	29	66	52	39	42	343 554	37
Estrie (05)	43	29	56	42	39	39	197 308	35
Montréal-Centre (06)	75	40	72	37	44	41	1 259 744	42
Outaouais (07)	85	51	101	64	60	54	228 957	62
Abitibi-Témiscamingue (08)	71	43	91	93	57	77	185 469	71
Côte-Nord (09)	36	29	86	46	47	49	101 465	43
Nord-du-Québec (10)	50	33	42	44	32	40	26 796	45
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	75	58	135	91	58	68	98 132	72
Chaudière-Appalaches (12)	45	25	55	46	38	39	331 000	33
Laval (13)	38	34	94	33	45	37	264 410	41
Lanaudière (14)	64	43	71	46	48	45	428 815	47
Laurentides (15)	60	38	69	44	48	44	441 606	45
Montérégie (16)	53	31	62	40	38	40	1 006 382	37
Nunavik (17)	0	6	0	0	10	16	236	14
Terres-Cries (18)	101	0	53	69	96	6	1 926	55
Ensemble du Québec	55	33	71	44	43	41	5 696 387	41

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 160-161.
- Les secteurs d'activité ont été regroupés de la façon suivante : **Secteur primaire** : forêts et scieries; mines, carrières et puits de pétrole; agriculture; chasse et pêche. **Secteur manufacturier** : industrie chimique; fabrication de produits en métal; industrie du bois; industrie du caoutchouc et des produits en matière plastique; fabrication d'équipement de transport; première transformation des métaux; fabrication de produits minéraux non métalliques; industrie des aliments et boissons; industrie du meuble et des articles d'ameublement; industrie du papier et activités diverses; industrie du cuir; fabrication de machines; industrie du tabac; industrie textile; imprimerie, édition et activités connexes; fabrication de produits du pétrole et du charbon; fabrication de produits électriques; bonneterie et habillement; industries manufacturières diverses. **Construction** : bâtiments et travaux publics. **Transport et communication** : transport et entreposage; communication, transport d'énergie et autres services publics. **Commerce** : commerce. **Services** : administration publique; autres services commerciaux et personnels; enseignement et services annexes; finances, assurances et affaires immobilières.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

53. PROPORTION DE LA POPULATION AYANT UNE INCAPACITÉ À LONG TERME

Définition¹ : Proportion de la population ayant une incapacité à long terme par rapport à la population totale dans les ménages privés.

– Selon Santé Québec, les personnes ayant une incapacité sont celles qui, au moment de l'enquête, étaient restreintes dans le genre ou la quantité d'activités, à cause d'une maladie chronique physique ou mentale ou d'un problème de santé. Puisque la grande majorité des limitations d'activité dure depuis au moins six mois, elles sont considérées comme étant à long terme, même si ce n'est pas toujours le cas².


Méthode de calcul : $\frac{\text{Population présentant une incapacité à long terme}}{\text{Population totale dans les ménages privés}} \times 100$

Sources : Enquêtes de Santé Québec.


Faits saillants : L'incapacité à long terme n'a pas varié entre 1987 et 1993. Elle touche 7 % de la population des ménages privés. En 1992-1993, 6,4 % des hommes et 8,0 % des femmes présentent une incapacité.

- La proportion de personnes ayant une incapacité augmente selon l'âge, passant de 2 % chez les 0-14 ans à 20 % chez les 75 ans et plus. Cette tendance est la même pour les deux sexes.
- En 1993, seule la Côte-Nord présente une proportion significativement supérieure à celle de l'ensemble du Québec alors que trois régions obtiennent des pourcentages significativement inférieurs : Nunavik, Terres-Cries-de-la-Baie-James et Laval.
- En 1987, l'Outaouais et Montréal-Centre affichaient des valeurs significativement plus élevées que le Québec. Entre 1987 et 1993, seule la région de la Côte-Nord a vu son pourcentage augmenter de façon significative. À l'opposé, Montréal-Centre est l'unique région à avoir connu une diminution.


1. Proportion de la population ayant une incapacité à long terme selon le sexe, Québec, 1987 et 1992-1993



2. Proportion de la population ayant une incapacité à long terme selon l'âge et le sexe, Québec, 1992-1993



3. Proportion de la population ayant une incapacité à long terme selon la région, Québec, 1992-1993



4. Proportion de la population ayant une incapacité à long terme selon la région, Québec, 1987 et 1992-1993

Région	1987 %	1992-1993		Variation de 1987 à 1992-1993
		Nombre estimé	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	6,9	18 618	9,0	
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	6,9	23 957	8,2	
Québec (03)	5,9	39 279	6,3	
Mauricie — Bois-Francs (04)	7,3	39 087	8,3	
Estrie (05)	7,0	24 200	8,9	
Montréal-Centre ³ (06)	9,2 (+)	130 269	7,2	↓
Outaouais (07)	9,3 (+)	24 096	8,0	
Abitibi-Témiscamingue (08)	5,9	11 027	7,1	
Côte-Nord (09)	5,7	9 818	9,4 (+)	↑
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	8,1	9 908	9,2	
Chaudière-Appalaches (12)	5,6 (-)	28 673	7,6	
Laval (13)	*6,4	17 884	5,4 (-)	
Lanaudière (14)	8,2	27 142	7,5	
Laurentides (15)	7,9	31 033	7,6	
Montréal ³ (16)	5,9 (-)	76 647	6,1	
Nunavik ⁴ (17)	n.d.	98	*1,4 (-)	n.a.
Terres-Cries ⁵ (18)	n.d.	435	4,7 (-)	n.a.
Ensemble du Québec⁶	7,4	511 639	7,2	

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 162-163.
- En 1992-1993, 90 % des limitations duraient depuis au moins six mois et 3 % depuis moins d'un mois (Wilkins, 1995).
- Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
- Données pour 1992 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik.
- Données pour 1991 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James.
- Ce total ne comprend pas les régions 17 et 18, celles-ci ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes à des moments différents. Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

↓ ↑ Diminution ou augmentation significative entre les deux périodes.

n.d. Non disponible.

n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

54. PROPORTION D'ENFANTS HANDICAPÉS

Définition¹ : Proportion, pour une période donnée, des enfants de moins de 18 ans recevant une allocation pour enfant handicapé par rapport à l'ensemble des enfants de moins de 18 ans, au milieu de la période.

– Un enfant est considéré comme handicapé s'il est atteint d'une déficience visuelle, auditive, motrice ou mentale, ou d'une maladie chronique ou psychopathique importante et permanente. De plus, son état doit nécessiter la mise en place de mesures spécialisées en matière de traitement, de réadaptation, de rééducation ou de scolarisation.


Méthode de calcul : Nombre d'enfants de moins de 18 ans recevant une allocation pour enfant handicapé, pour une période donnée
 Population totale de moins de 18 ans, au milieu de la période $\times 100$

Sources : Numérateur : Fichier de l'allocation pour enfants handicapés, Régie des rentes du Québec.
 Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : En 1995, 1,4 % des enfants du Québec sont handicapés. Peu importe l'année, la proportion d'enfants handicapés est toujours plus élevée chez les garçons que chez les filles.

- En 1995, plus de la moitié des enfants handicapés sont atteints de maladies chroniques et un peu plus de 15 % de déficience motrice.
- En 1995, des proportions significativement supérieures d'enfants handicapés sont enregistrées dans les régions du Saguenay—Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, de Lanaudière et de Québec. À l'opposé, les proportions d'enfants handicapés sont significativement plus faibles dans cinq régions, les différences les plus marquées se retrouvant au Nunavik et dans le Nord-du-Québec.
- Entre 1992 et 1995, la proportion d'enfants handicapés a baissé dans l'ensemble des régions du Québec, à l'exception des Terres-Cries-de-la-Baie-James où une hausse de près de 25 % fut observée.


1. Proportion d'enfants handicapés² selon le sexe, Québec, 1984 à 1995



2. Répartition des enfants handicapés selon la nature de la déficience et le sexe, Québec, 1995



3. Proportion d'enfants handicapés selon la région, Québec, 1995



4. Proportion d'enfants handicapés selon la région, Québec, 1992 à 1995

	1992	1993	1994	1995		Variation de 1992 à 1995
	%	%	%	Nombre	%	%
Bas-Saint-Laurent (01)	1,57 (-)	1,79	1,57	700	1,43	-9
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	2,45 (+)	2,60 (+)	2,23 (+)	1 443	1,90 (+)	-22
Québec (03)	1,71	1,77	1,62	1 956	1,46 (+)	-14
Mauricie — Bois-Francs (04)	1,73	1,75	1,50	1 543	1,36	-21
Estrie (05)	1,57 (-)	1,62 (-)	1,48	912	1,35	-15
Montréal-Centre (06)	1,52 (-)	1,58 (-)	1,39 (-)	4 535	1,26 (-)	-17
Outaouais (07)	1,54 (-)	1,57 (-)	1,42 (-)	991	1,28 (-)	-17
Abitibi-Témiscamingue (08)	1,80	1,83	1,62	623	1,45	-19
Côte-Nord (09)	1,78	1,80	1,60	389	1,46	-18
Nord-du-Québec (10)	1,64	1,55	1,33	69	1,06 (-)	-35
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	2,25 (+)	2,33 (+)	2,04 (+)	430	1,78 (+)	-21
Chaudière-Appalaches (12)	1,77	1,87 (+)	1,68 (+)	1 411	1,45	-18
Laval (13)	1,50 (-)	1,60 (-)	1,45 (-)	1 058	1,32	-12
Lanaudière (14)	1,92 (+)	1,97 (+)	1,72 (+)	1 485	1,49 (+)	-22
Laurentides (15)	1,85 (+)	1,92 (+)	1,69 (+)	1 594	1,44	-22
Montréal (16)	1,70	1,75	1,52 (-)	4 358	1,33 (-)	-22
Nunavik (17)	1,30 (-)	1,27 (-)	1,11 (-)	39	1,02 (-)	-22
Terres-Cries (18)	0,87 (-)	0,86 (-)	1,01 (-)	36	1,08	24
Ensemble du Québec	1,71	1,77	1,56	23 572	1,39	-19

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 164-165.
 - Depuis le milieu de 1993, un resserrement des règles d'attribution de l'allocation pour enfant handicapé, particulièrement pour les cas d'asthme, a contribué à faire chuter la proportion d'enfants handicapés (Régie des rentes du Québec, 1996).
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

55. TAUX DE CONSULTATIONS MÉDICALES

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre d'usagers aux bénéficiaires âgés de 1 an et plus au milieu de la période.

- Les bénéficiaires sont les personnes inscrites au régime d'assurance-maladie provincial de la RAMQ et qui se sont prévalues du droit de consommer un ou plusieurs services médicaux au cours d'une période donnée.
- Un usager est dénombré une seule fois au numérateur, quel que soit le nombre de consultations qu'il a eues au cours de la période de référence.
- Le taux de participation ne s'applique qu'aux actes médicaux posés par des médecins rémunérés à l'acte. Pour les autres services de médecine, de laboratoire, de même que pour les médecins salariés ou rémunérés à vacation, le taux ne peut être connu puisqu'aucune donnée sur les bénéficiaires n'est disponible.

Méthode de calcul :
$$\frac{\text{Nombre annuel moyen d'usagers âgés de 1 an et plus pour un type de service particulier, pour une période donnée}}{\text{Nombre total des bénéficiaires âgés de 1 an et plus au milieu de la période}} \times 100$$


Sources : Numérateur : Fichier des services professionnels rémunérés à l'acte, RAMQ.

Dénominateur : Fichier d'inscription des bénéficiaires, RAMQ.


Faits saillants : Depuis dix ans, le taux de consultations médicales a légèrement augmenté au Québec, pour atteindre 81 % en 1994. Peu importe l'année, il est toujours plus élevé chez les femmes que chez les hommes.

- En 1994, les services médicaux présentant les taux de consultations médicales les plus élevés sont : les examens de malades ambulatoires (80 %), les consultations (25 %), la radiologie en cabinet privé (19 %) et les actes diagnostiques mineurs (18 %).
- En 1994, les taux de consultations médicales sont inférieurs à 80 % dans quatre régions : Côte-Nord, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, Abitibi-Témiscamingue et Bas-Saint-Laurent.
- Au Québec et à l'échelle des régions, le taux de consultations médicales a peu varié entre 1991 et 1994.


1. Taux de consultations médicales selon le sexe, Québec, 1984 à 1994



2. Taux de consultations médicales pour les principaux services médicaux selon le sexe, 1994



3. Taux de consultations médicales selon la région, Québec 1994



4. Taux de consultations médicales selon la région², Québec, 1991 à 1994

Région	1991	1992	1993	1994	Variation de
	%	%	%	%	1991 à 1994
Bas-Saint-Laurent (01)	76,9	77,9	79,0	78,4	2
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	81,0	80,6	81,8	81,7	1
Québec (03)	84,0	83,4	84,1	83,9	0
Mauricie — Bois-Francs (04)	80,3	79,4	80,7	80,5	0
Estrie (05)	81,5	80,6	81,7	81,2	0
Montréal-Centre (06)	79,9	79,2	81,1	81,8	2
Outaouais (07)	80,5	79,6	80,7	81,2	1
Abitibi-Témiscamingue (08)	74,1	74,2	75,0	74,9	1
Côte-Nord (09)	n.d.	n.d.	n.d.	71,4	n.a.
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	70,9	71,1	71,8	72,2	2
Chaudière-Appalaches (12)	82,9	81,6	82,8	82,7	0
Laval (13)	83,2	82,7	83,2	83,3	0
Lanaudière (14)	81,8	81,1	82,0	81,8	0
Laurentides (15)	82,4	81,6	82,7	82,7	0
Montréal (16)	81,9	81,3	82,1	82,1	0
Nunavik (17)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terres-Cries (18)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Ensemble du Québec	80,6	80,0	81,2	81,4	1

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 166-167.
- Afin d'assurer la confidentialité de certaines données, les régions du Nord-du-Québec, du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James furent regroupées. Aucune donnée n'est donc disponible pour ces trois régions sociosanitaires prises séparément (RAMQ, 1995).

n.d. Non disponible.

n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

56. TAUX DES JOURNÉES D'HOSPITALISATION SELON LE DIAGNOSTIC

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de journées d'hospitalisation, pour un diagnostic spécifique, à la population totale au milieu de la période.

– Les statistiques d'hospitalisation² présentées dans cette fiche ne se rapportent qu'aux soins de courte durée. De plus, parmi les soins de courte durée, elles excluent les données se rapportant aux hôpitaux psychiatriques ainsi qu'aux services psychiatriques des hôpitaux généraux. Le diagnostic retenu correspond au diagnostic principal défini selon la CIM-9.

Méthode de calcul :

Nombre annuel moyen de journées d'hospitalisation, pour une période et un diagnostic donné \times 1 000
Population totale au milieu de la période

Sources : Numérateur : Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, MSSS.


Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.

Faits saillants : Le taux des journées d'hospitalisation tend à diminuer au Québec au cours des dernières années.


Cette baisse s'observe autant chez les hommes que chez les femmes. Ces dernières montrent, au cours de la dernière période, un taux de journées d'hospitalisation supérieur de 20 % à celui des hommes.

- Les diagnostics requérant le plus de journées d'hospitalisation pour 1 000 habitants sont les maladies de l'appareil circulatoire, les tumeurs, les maladies de l'appareil digestif et les traumatismes. Pour deux diagnostics, les maladies de l'appareil circulatoire et les maladies de l'appareil respiratoire, le taux de journées d'hospitalisation augmente légèrement entre 1989-1991 et 1993-1995.
- En 1993-1995, cinq régions enregistrent des taux dépassant d'au moins 25 % la moyenne québécoise : Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine, Terres-Cries-de-la-Baie-James, Nunavik, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord. Les taux les plus bas sont enregistrés à Laval, dans les Laurentides, en Outaouais, dans Lanaudière et en Montérégie.
- Le classement des régions observé pour l'ensemble des hospitalisations est sensiblement le même d'un diagnostic à l'autre.


1. Taux des journées d'hospitalisation selon le sexe, Québec, 1989-1991 à 1993-1995



2. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic principal³, Québec, 1989-1991 à 1993-1995



3. Indice comparatif des journées d'hospitalisation selon la région⁴, Québec, 1993-1995



4. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic principal³ et la région⁴, Québec, 1993-1995 (taux annuel moyen pour 1 000)

Région	Tumeurs	Appareil circulatoire	Appareil respiratoire	Appareil digestif	Organes génito-urin.	Trauma- tismes	Ensemble des diagnostics	
							Nombre ⁵	Taux
Bas-Saint-Laurent (01)	134,1	206,3	104,0	104,9	60,5	124,7	218 181	1054,7
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	112,7	186,9	98,0	104,4	62,6	102,1	284 779	977,4
Québec (03)	123,1	197,8	86,0	94,6	46,2	81,5	583 334	908,8
Mauricie — Bois-Francis (04)	121,4	212,8	91,4	97,9	52,6	103,2	460 158	949,7
Estrie (05)	117,0	237,4	81,8	99,7	45,5	89,2	260 646	932,3
Montréal-Centre (06)	129,9	179,3	74,5	93,3	45,8	77,5	1 618 375	879,9
Outaouais (07)	82,6	130,3	72,1	76,5	39,5	74,9	209 785	683,0
Abitibi-Témiscamingue (08)	96,9	166,7	94,4	86,1	49,4	88,2	134 114	850,3
Côte-Nord (09)	112,7	198,4	108,3	106,5	56,2	90,1	110 554	1051,1
Nord-du-Québec (10)	71,0	112,6	82,3	70,5	50,3	78,0	15 487	759,5
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	143,6	263,0	112,3	108,4	57,4	116,0	126 150	1191,7
Chaudière-Appalaches (12)	99,6	210,1	81,6	78,2	44,2	105,2	326 586	853,3
Laval (13)	87,8	121,9	39,1	60,4	32,8	44,1	194 652	576,4
Lanaudière (14)	91,1	143,1	67,8	74,9	38,5	75,9	253 678	683,0
Laurentides (15)	96,9	140,5	52,0	65,2	35,9	65,1	276 534	650,0
Montérégie (16)	92,8	146,0	55,0	75,7	42,4	63,1	908 570	697,9
Nunavik (17)	58,9	66,9	227,9	100,8	53,8	113,2	9 916	1123,9
Terres-Cries (18)	65,5	76,0	158,9	103,4	53,4	95,5	10 134	1187,2
Ensemble du Québec	110,5	174,1	74,0	86,2	45,3	79,8	6 001 629	824,8

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 168-169.
- Les statistiques d'hospitalisation sont établies d'après les formulaires « abrégé admission/sortie » fournis par les hôpitaux de soins de courte durée. Les sorties sont occasionnées par le décès, la fin de l'hospitalisation ou le transfert vers un autre établissement. Une personne apparaît autant de fois dans le fichier qu'il y a de sorties établies à son nom (MSSS, 1995).
- Les diagnostics retenus sont définis selon la neuvième révision de la Classification internationale des maladies. Les codes utilisés sont : tumeurs (140-239); appareil circulatoire (390-459); appareil respiratoire (460-519); appareil digestif (520-579); organes génito-urinaires (580-629) et traumatismes (E800-E999).
- Les statistiques sur les hospitalisations ne comprennent que celles ayant eu lieu au Québec. Pour les régions limitrophes, en particulier l'Outaouais, où une partie importante des hospitalisations ont lieu dans une province voisine, les données peuvent présenter une certaine sous-déclaration (MSSS, 1991).
- Nombre annuel moyen de journées d'hospitalisation.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

57. TAUX DE CÉSARIENNE

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre de césariennes pratiquées à l'hôpital à l'ensemble des accouchements pratiqués à l'hôpital au cours de la période.

– Les césariennes sont définies dans les fichiers d'hospitalisation à partir des codes de traitement 86.0, 86.1, 86.2, 86.8 et 86.9 de la Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux. Les accouchements correspondent aux diagnostics principaux 640 à 659 de la CIM-9.


Méthode de calcul : $\frac{\text{Nombre de césariennes pratiquées à l'hôpital, pour une période donnée}}{\text{Total des accouchements pratiqués à l'hôpital durant la même période}} \times 100$

Sources : Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, MSSS.


Faits saillants : Le taux de césarienne a peu varié au Québec au cours des dernières années. Environ 23 % des accouchements se terminent par une césarienne.

- Le taux de césarienne augmente systématiquement avec l'âge. En 1993-1995, il passe de 13 % chez les femmes de 15 à 19 ans à 33 % chez celles de 40 à 44 ans. Dans chacun des groupes d'âge, le taux est demeuré relativement stable entre 1989-1991 et 1993-1995.
- Deux régions enregistrent en 1993-1995 des taux de césarienne dépassant de plus de 15 % la moyenne du Québec : Terres-Cries-de-la-Baie-James et Chaudière-Appalaches. À l'inverse, les régions du Nunavik, de l'Estrie et de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine présentent les taux les plus bas.
- Dans quatre régions, on enregistre une augmentation du taux de césarienne supérieure à 6 % entre 1989-1991 et 1993-1995 : Terres-Cries-de-la-Baie-James, Nord-du-Québec, Abitibi-Témiscamingue et Mauricie—Bois-Francs.


1. Taux de césarienne, Québec, 1989-1991 à 1993-1995



2. Taux de césarienne selon l'âge, Québec, 1989-1991 à 1993-1995



3. Indice comparatif de césarienne selon la région, Québec, 1993-1995



4. Taux de césarienne selon la région, Québec, 1989-1991 à 1993-1995

(taux pour 100 accouchements)

Région	1989-1991	1991-1993	1993-1995		Variation de
			Nombre ²	Taux	1989-1991 à 1993-1995
					%
Bas-Saint-Laurent (01)	24,4	23,5	333	22,4	-8
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	23,9 (-)	22,5 (-)	552	20,6 (-)	-14
Québec (03)	24,9 (+)	23,2 (+)	1 004	23,9 (+)	-4
Mauricie — Bois-Francs (04)	21,6	22,5	915	23,0	6
Estrie (05)	18,6 (-)	17,4 (-)	357	15,6 (-)	-16
Montréal-Centre (06)	25,7 (+)	24,4 (+)	4 375	24,7 (+)	-4
Outaouais (07)	18,0 (-)	18,2 (-)	614	18,4 (-)	2
Abitibi-Témiscamingue (08)	18,1 (-)	19,9 (-)	324	19,5 (-)	7
Côte-Nord (09)	20,5 (-)	20,8 (-)	229	19,0 (-)	-7
Nord-du-Québec (10)	19,6	19,7	45	21,2	8
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	18,7 (-)	19,5 (-)	147	16,8 (-)	-10
Chaudière-Appalaches (12)	25,3 (+)	26,7 (+)	674	26,5 (+)	5
Laval (13)	23,1	22,3	674	23,8	3
Lanaudière (14)	23,2	21,0	816	23,3	1
Laurentides (15)	19,5 (-)	19,7 (-)	773	19,7 (-)	1
Montréal (16)	24,2 (+)	23,4 (+)	2 852	23,6 (+)	-2
Nunavik (17)	*5,8 (-)	*4,5 (-)	8	*3,9 (-)	-32
Terres-Cries (18)	23,4 (+)	26,7 (+)	61	28,5 (+)	22
Ensemble du Québec	23,2	22,5	14 749	22,7	-2

Notes :

1. Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 170-171.

2. Nombre annuel moyen de césariennes.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

58. TAUX DE PONTAGES CORONARIENS

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel moyen de pontages coronariens, à la population totale au milieu de cette période.

– Les pontages coronariens sont définis dans le fichier des hospitalisations à partir des codes de traitement 48.10 à 48.19 de la Classification canadienne des actes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicaux.

Méthode de calcul :

$$\frac{\text{Nombre d'hospitalisations où apparaît un code de pontage coronarien pour une période donnée}}{\text{Population totale au milieu de la période}} \times 100\,000$$


Sources : Numérateur : Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO, MSSS.

Dénominateur : Service de l'analyse statistique (version mai 1995), MSSS.


Faits saillants : Le taux de pontages coronariens montre un accroissement important au Québec au cours des dernières années. Entre 1989-1991 et 1993-1995, le taux a augmenté de 40 %. La hausse du taux a été plus forte chez les femmes que chez les hommes. Cependant, ceux-ci présentent, lors de la dernière période, un taux de pontages coronariens trois fois supérieur à celui des femmes.

- À tous les âges, les hommes présentent en 1993-1995 des taux nettement plus élevés que les femmes. Avant 35 ans, peu de personnes subissent un pontage. À partir de 35 ans, le taux s'accroît pour atteindre un sommet dans le groupe des 65-74 ans.
- Pour la dernière période, le taux de pontages coronariens est particulièrement élevé dans les régions de la Côte-Nord, de l'Estrie et du Bas-Saint-Laurent. À l'opposé, on observe les taux les plus faibles dans le Nord-du-Québec, en Abitibi-Témiscamingue et dans les Laurentides.
- Le taux de pontages coronariens a plus que doublé entre 1989-1991 et 1993-1995 dans deux régions : Saguenay—Lac-Saint-Jean et Côte-Nord.


1. Taux de pontages coronariens selon le sexe, Québec, 1989-1991 à 1993-1995



2. Taux de pontages coronariens selon l'âge et le sexe, Québec, 1993-1995



3. Indice comparatif de pontages coronariens selon la région, Québec, 1993-1995



4. Taux de pontages coronariens selon la région, Québec, 1989-1991 à 1993-1995 (taux annuel moyen pour 100 000)

Région	1989-1991	1991-1993	1993-1995		Variation de
			Nombre ²	Taux	1989-1991 à 1993-1995
					%
Bas-Saint-Laurent (01)	39,1	65,5	146	70,3 (+)	80
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	26,3 (-)	57,5	162	55,6	111
Québec (03)	47,3	56,7	381	59,3	25
Mauricie — Bois-Francs (04)	35,9 (-)	49,5 (-)	297	61,2	71
Estrie (05)	62,4 (+)	85,8 (+)	250	89,2 (+)	43
Montréal-Centre (06)	49,9 (+)	65,6 (+)	1 238	67,3 (+)	35
Outaouais (07)	**0,9#	**1,5#	7#	*2,3#	161
Abitibi-Témiscamingue (08)	39,8	43,7 (-)	81	51,4 (-)	29
Côte-Nord (09)	43,8	60,1	96	91,3 (+)	109
Nord-du-Québec (10)	**14,4	*50,8	7	*31,9 (-)	n.a.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	63,2 (+)	50,2	73	68,5	8
Chaudière-Appalaches (12)	49,1 (+)	63,2	248	64,7	32
Laval (13)	52,9 (+)	69,1 (+)	228	67,5 (+)	28
Lanaudière (14)	45,6	55,9	234	63,0	38
Laurentides (15)	39,7	45,7 (-)	226	53,0 (-)	34
Montérégie (16)	43,9	58,7	778	59,8	36
Nunavik (17)	0,0	**6,1	0	0,0	n.a.
Terres-Cries (18)	0,0	0,0	1	**5,9	n.a.
Ensemble du Québec	43,9	57,7	4 449	61,1	39

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 172-173.
 - Nombre annuel moyen de pontages coronariens.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 # Une grande partie des pontages coronariens des résidents de l'Outaouais ont lieu dans des hôpitaux ontariens. Étant donné que les données de MED-ÉCHO ne comprennent que les hospitalisations se produisant au Québec, les taux obtenus pour l'Outaouais sous-estiment la réalité.
 n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

59. PROPORTION DE LA POPULATION AYANT CONSOMMÉ TROIS CLASSES DE MÉDICAMENTS ET PLUS

Définition¹ : Proportion de la population ayant consommé trois classes de médicaments différents et plus (prescrits ou non prescrits) au cours des deux jours précédant l'enquête, sur l'ensemble de la population dans les ménages privés.

- Le terme « médicament » désigne à la fois les « remèdes » (gouttes, sirops, suppositoires, injections intraveineuses), les « pilules » (incluant les anovulants) ou les onguents (avec ou sans ordonnance), y compris les vitamines, les compléments minéraux et les suppléments alimentaires.
- Le nombre de classes ne correspond pas au nombre de médicaments puisqu'une personne peut consommer plusieurs médicaments différents dans une même classe.


Méthode de calcul : Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus
(prescrits ou non prescrits) au cours des deux jours précédant l'enquête x 100
Population totale dans les ménages privés

Sources : Enquêtes de Santé Québec.


Faits saillants : La proportion de personnes ayant consommé trois classes de médicaments et plus est en augmentation au Québec. Elle est passée de 6 % en 1987 à 9 % en 1992-1993. La proportion est deux fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes.

- La consommation de trois classes de médicaments et plus augmente avec l'âge. Elle est, à tous les âges, plus élevée chez les femmes.
- Seule la région de Montréal-Centre présente en 1993 un pourcentage significativement supérieur à la valeur québécoise. Deux régions se démarquent avec des proportions inférieures : Terres-Cries-de-la-Baie-James et Montérégie.
- Entre 1987 et 1993, la majorité des régions ont connu une augmentation de la proportion de personnes ayant consommé trois classes de médicaments et plus.


1. Proportion de la population ayant consommé trois classes de médicaments et plus selon le sexe, Québec, 1987 et 1992-1993



2. Proportion de la population ayant consommé trois classes de médicaments et plus selon l'âge et le sexe, Québec, 1992-1993



3. Proportion de la population ayant consommé trois classes de médicaments et plus selon la région, Québec, 1992-1993



4. Proportion de la population ayant consommé trois classes de médicaments et plus selon la région, Québec, 1987 et 1992-1993

Région	1987 %	1992-1993		Variation de 1987 à 1992-1993
		Nombre estimé	%	
Bas-Saint-Laurent (01)	7,8	18 466	9,1	
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	6,6	28 657	9,9	↑
Québec (03)	4,8	60 000	9,8	↑
Mauricie — Bois-Francis (04)	6,1	36 139	7,7	
Estrie (05)	5,9	27 126	10,0	↑
Montréal-Centre ² (06)	7,3 (+)	177 917	10,0 (+)	↑
Outaouais (07)	6,8	29 919	10,1	↑
Abitibi-Témiscamingue (08)	4,7	12 684	8,2	↑
Côte-Nord (09)	4,4	9 037	8,8	↑
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	6,7	8 669	8,1	
Chaudière-Appalaches (12)	5,4	35 209	9,5	↑
Laval (13)	**4,7	22 865	7,0	n.a.
Lanaudière (14)	6,9	23 849	6,7	
Laurentides (15)	*5,4	30 162	7,5	
Montérégie ² (16)	3,7 (-)	89 822	7,2 (-)	↑
Nunavik ³ (17)	n.d.	116	**1,7	n.a.
Terres-Cries ⁴ (18)	n.d.	228	* 2,5 (-)	n.a.
Ensemble du Québec⁵	5,9	610 520	8,7	↑

Notes :

- Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 174-175.
 - Lors du calcul des tests statistiques, cette région est comparée au reste du Québec.
 - Données pour 1992 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik.
 - Données pour 1991 tirées de l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James.
 - Ce total ne comprend pas les régions 17 et 18, celles-ci ayant fait l'objet d'enquêtes distinctes à des moments différents. Même si le plan d'échantillonnage ne permet pas d'obtenir des données pour la région 10, cette dernière est comprise dans le total.
- * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 ↓ ↑ Diminution ou augmentation significative entre les deux périodes.
 n.d. Non disponible.
 n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

60. NOMBRE D'ORDONNANCES PAR PERSONNE DE 65 ANS ET PLUS

Définition¹ : Rapport, pour une période donnée, du nombre annuel d'ordonnances, des personnes de 65 ans et plus, sur le nombre annuel moyen de personnes de 65 ans et plus, durant la période².

- Le nombre moyen de personnes de 65 ans et plus est obtenu en attribuant à chaque personne inscrite une pondération qui correspond à la fraction de l'année où, en raison de son âge, elle est devenue admissible au programme de médicaments et de services pharmaceutiques.
- Les médicaments sans ordonnance, ou non-inscrits sur la Liste de médicaments sont exclus du programme de médicaments et de services pharmaceutiques. Le terme « ordonnance » signifie une autorisation à fournir un médicament. Cette autorisation peut aussi bien être une nouvelle prescription qu'un renouvellement³.

Méthode de calcul :
$$\frac{\text{Nombre annuel d'ordonnances, des personnes de 65 ans et plus}}{\text{Nombre moyen de personnes de 65 ans et plus admissibles dans l'année}}$$


Sources : Numérateur : Fichier des services pharmaceutiques, RAMQ.

Dénominateur : Fichier d'inscription des bénéficiaires, RAMQ.


Faits saillants : De 1984 à 1991, le nombre moyen d'ordonnances par personne de 65 ans et plus a continuellement augmenté au Québec pour demeurer relativement stable par la suite. En 1994, il est de 28 ordonnances par personne de 65 ans et plus. Peu importe l'année, le nombre d'ordonnances par personne est plus élevé chez les femmes que chez les hommes.

- En 1994, le nombre d'ordonnances par personne augmente graduellement du groupe des 65-69 ans à celui des 80-84, ans pour redescendre dans le dernier groupe d'âge. À tous les âges, le nombre d'ordonnances par personne est plus élevé chez les femmes que chez les hommes.
- En 1994, le nombre d'ordonnances par personne varie sensiblement d'une région à l'autre, passant de 25 ordonnances à Laval à 33 au Saguenay—Lac-Saint-Jean.
- Entre 1991 et 1994, le nombre d'ordonnances par personne a fléchi de 6 % au Québec. Seulement trois régions ont connu durant cette période une hausse : Bas-Saint-Laurent, Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et Abitibi-Témiscamingue.


1. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus selon le sexe, Québec, 1984 à 1994



2. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus selon l'âge et le sexe, Québec, 1994



3. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus selon la région, Québec, 1994



4. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus selon la région⁴, Québec, 1991 à 1994

Région	1991	1992	1993	1994	Variation de 1991 à 1994 %
Bas-Saint-Laurent (01)	25,1	28,5	29,0	30,0	19
Saguenay — Lac-Saint-Jean (02)	34,7	33,6	32,6	33,4	-4
Québec (03)	32,8	32,4	30,8	31,8	-3
Mauricie — Bois-Francs (04)	28,8	29,2	27,8	28,5	-1
Estrie (05)	32,7	29,7	27,3	28,0	-14
Montréal-Centre (06)	28,5	27,0	25,9	26,6	-7
Outaouais (07)	31,2	30,2	28,8	28,7	-8
Abitibi-Témiscamingue (08)	28,1	27,1	27,7	28,6	2
Côte-Nord (09)	n.d.	n.d.	n.d.	30,7	n.a.
Nord-du-Québec (10)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Gaspésie — Îles-de-la-Mad. (11)	24,6	26,2	27,0	28,2	15
Chaudière-Appalaches (12)	37,7	33,5	31,6	32,1	-15
Laval (13)	26,9	25,5	24,6	25,5	-5
Lanaudière (14)	32,8	30,9	29,1	29,5	-10
Laurentides (15)	28,7	27,3	26,9	27,6	-4
Montréal-Centre (16)	31,4	29,5	27,6	28,1	-10
Nunavik (17)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Terres-Cries (18)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Ensemble du Québec	30,2	28,9	27,7	28,4	-6

Notes :

1. Pour plus d'information sur cet indicateur, le lecteur peut se référer au document *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, p. 176-177.
 2. Les données sur le nombre de personnes admissibles incluent toutes celles qui séjournent dans des centres d'accueil ou des centres hospitaliers. Bien que les médicaments consommés par ces dernières soient payés par l'État, ils ne sont pas comptabilisés dans le programme de médicaments et de services pharmaceutiques administré par la Régie. Ainsi, 41 160 personnes âgées de 65 ans et plus vivaient dans des établissements de façon permanente en 1994. Par conséquent, le nombre d'ordonnances par personne âgée admissible est sous-estimé de 5,6 % (RAMQ, 1995).
 3. Collège des médecins du Québec, Ordre des pharmaciens du Québec, 1996.
 4. Afin d'assurer la confidentialité de certaines données, les régions du Nord-du-Québec, du Nunavik et des Terres-Cries-de-la-Baie-James furent regroupées. Aucune donnée n'est donc disponible pour ces trois régions sociosanitaires prises séparément (RAMQ, 1995).
- n.d. Non disponible.
n.a. Non applicable.

Références : Voir l'annexe « Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux ».

PARTIE 3

SYNTHÈSE RÉGIONALE

01 RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT

Déterminants de la santé

Entre 1986 et 1991, la population du Bas-Saint-Laurent a chuté de 3,1 %, pour atteindre 210 036 personnes en 1991. Depuis quelques années, les gens quittent la région; la fécondité y est faible, de même que l'immigration est aussi très faible. D'autre part, la population vieillit, au point qu'en 1991 la région du Bas-Saint-Laurent avait la deuxième plus forte proportion de personnes de 65 ans et plus au Québec.

La situation socioéconomique semble aussi fragile. Dans l'ensemble, les gens du Bas-Saint-Laurent sont moins scolarisés et les personnes inoccupées, les chômeurs ainsi que les assistés sociaux sont nombreux.

Pour ce qui est des comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, deux points plutôt positifs ressortent : le taux de grossesses à l'adolescence et le taux de crimes contre la personne sont significativement plus faibles dans la région que dans l'ensemble du Québec. Par contre, les conducteurs de véhicules automobiles du Bas-Saint-Laurent sont moins portés à boucler leur ceinture de sécurité que ceux du Québec.

Au chapitre de l'organisation des soins, seul le ratio plus élevé du nombre de lits et places de longue durée pour 1 000 habitants distingue la région de l'ensemble du Québec.

État de santé

Plusieurs des caractéristiques de l'état de santé de la population du Bas-Saint-Laurent sont semblables à celles de l'ensemble du Québec. Toutefois, le Bas-Saint-Laurent est l'unique région du Québec où le nombre d'accidents de la route a augmenté entre les périodes 1989-1991 et 1992-1994. De plus, le taux d'hospitalisation (plus élevé) et le taux d'intoxication (plus faible) sont différents de ceux du Québec.

Conséquences des problèmes de santé

En ce qui concerne les indicateurs portant sur les conséquences des problèmes de santé, on retient surtout que le Bas-Saint-Laurent se différencie de l'ensemble du Québec avec un taux de journées d'hospitalisation et un taux de pontages coronariens supérieurs.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement

	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 36,8	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 67,5	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 47,0	[42,7]

Social

Démographique

4. Population (1991)	◆ 210 036	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 21,1	[19,8]
15-64 ans %	◆ 66,0	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 12,9	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ -3,1	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,58	[1,65]

Sociodémographique

7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 0,1	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 0,5	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 14,2	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 10,2	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 32,2	[43,6]

Socioéconomique

12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 25,5	[20,1]
--	--------	--------

13. Naissances vivantes de mères

faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 16,3(+)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 49,9	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 16,1	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 18,1	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 13,0	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ 30,0	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ 6,8	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ 72,7(+)	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ 23,6	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 86,5(-)	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 5,5	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 21,9(-)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ 63,4	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ 38,7	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ 24,6	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ 3,8	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ 10,3	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 441,5(-)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 4,7	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 12,5	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 553	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 2 101	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 8,1	[8,2]
Tumeurs	◆ 12,4	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 10,4	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 6,7	[6,9]
Appareil digestif	◆ 6,3	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 6,2	[5,8]
Traumatismes	◆ 9,6	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 66,7	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ 11,6	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ 54,6	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 11,0	[10,0]
Maux de tête	◆ 8,7	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 7,7	[7,9]
Maux de dos	◆ 8,1	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 8,2	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ 6,0	[6,5]
Hypertension	◆ 7,3	[6,3]
Rhume des foins	◆ 4,9	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ 4,9	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ 4,1	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 3,8(-)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 601(-)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 105,4	[109,0]
Coqueluche	◆ 66,7	[60,9]
Campylobactériose	◆ 44,0(+)	[33,4]
Scarlatine	◆ 12,6(-)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ **3,4	[16,8]
Salmonellose	◆ 39,2(+)	[16,6]
Infection gonococcique	◆ **2,9	[10,3]
Giardiase	◆ *8,2	[9,8]
Sida	◆ 0,0	[5,7]
Tuberculose	◆ *5,8	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 125,5	[100,1]
Tumeurs	◆ 9,6	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 17,1	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 14,8	[10,6]
Appareil digestif	◆ 16,0	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 9,5	[7,6]
Traumatismes	◆ 12,5	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 388	[391]
Côlon-rectum	◆ 55	[53]
Poumon	◆ 71	[70]
Sein chez la femme	◆ 106	[93]
Prostate	◆ 76(-)	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 77,3	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances vivantes	◆ 6,1	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances	◆ 8,1	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 697	[691]
Tumeurs	◆ 199	[209]
Appareil circulatoire	◆ 261	[261]
Appareil respiratoire	◆ 63	[56]
Traumatismes	◆ 60	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ *16,5	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 65,4	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 6 591	[6 523]
Tumeurs	◆ 1 807(-)	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 225	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 276(+)	[221]
Traumatismes	◆ 1 911(+)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 1 675	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 3	[2]
Blessures graves %	◆ 18	[13]
Blessures légères %	◆ 79	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 44	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ 9,0	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,43	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 78,4	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 1 054,7	[824,8]
Tumeurs	◆ 134,1	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 206,3	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 104,0	[74,0]
Appareil digestif	◆ 104,9	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 60,5	[45,3]
Traumatismes	◆ 124,7	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 22,4	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 70,3(+)	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ 9,1	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 30,0	[28,4]

- Notes : 1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
- * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 - (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 - [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

02 RÉGION DU SAGUENAY — LAC-SAINT-JEAN

Déterminants de la santé

Depuis 1981, la population du Saguenay—Lac-Saint-Jean varie peu. En 1991, elle s'établissait à 293 273 personnes. La population du Saguenay—Lac-Saint-Jean est aussi relativement homogène, elle compte peu d'allophones et attire un nombre restreint d'immigrants.

Sur le plan socioéconomique, on retient surtout que la proportion de personnes inoccupées ainsi que le taux de chômage sont plus élevés au Saguenay—Lac-Saint-Jean qu'au Québec dans son ensemble.

En ce qui a trait aux comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, les habitants du Saguenay—Lac-Saint-Jean sont, au Québec, ceux qui bouclent le moins leur ceinture de sécurité. Par contre, le taux de grossesses à l'adolescence de la population du Saguenay—Lac-Saint-Jean est inférieur à celui de l'ensemble du Québec. De plus, la proportion de personnes présentant un niveau élevé de détresse psychologique et la proportion de personnes insatisfaites de leur vie sociale sont parmi les plus basses au Québec.

État de santé

Plusieurs indicateurs laissent entrevoir une certaine précarité de l'état de santé des personnes du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Entre autres, on y retrouve une espérance de vie plus faible, un taux d'années potentielles de vie perdues plus élevé, un taux de mortalité infantile également plus élevé, de même que des taux d'incidence du cancer et des taux de mortalité (particulièrement ceux dus au cancer, aux maladies de l'appareil respiratoire et aux traumatismes) supérieurs à ceux du Québec. Deux indicateurs montrent toutefois une image plus positive. Les lésions professionnelles et les intoxications sont inférieures à la moyenne québécoise.

Conséquences des problèmes de santé

Du côté des conséquences des problèmes de santé, deux faits ressortent : le Saguenay—Lac-Saint-Jean domine l'ensemble des autres régions pour la proportion d'enfants handicapés et pour le nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

<u>Environnement</u>	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 78,9	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 67,0	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 43,2	[42,7]
Social		
Démographique		
4. Population (1991)	◆ 293 273	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 23,3	[19,8]
15-64 ans %	◆ 67,9	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 8,8	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ -0,3	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,70	[1,65]
Sociodémographique		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 0,2	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 0,6	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 14,0	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 8,1	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 35,8	[43,6]
Socioéconomique		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 19,2	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 13,2(-)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 48,7	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 15,5	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 15,7	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 12,2	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ 32,2	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ 8,2	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ 70,4	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ 23,7	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 83,2(-)	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 5,7	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 29,4(-)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ 64,3	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ 39,9	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ 24,8	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ 4,0	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ 8,3(-)	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 520,2(-)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 4,9	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 6,3	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 623	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 1 815	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 8,3	[8,2]
Tumeurs	◆ 13,4	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 11,6	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 6,8	[6,9]
Appareil digestif	◆ 6,7	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 6,4	[5,8]
Traumatismes	◆ 9,7	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 39,8(-)	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ 11,0	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ 53,0	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 8,6	[10,0]
Maux de tête	◆ 9,0	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 8,0	[7,9]
Maux de dos	◆ 6,2(-)	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 5,5(-)	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ 5,1(-)	[6,5]
Hypertension	◆ 6,5	[6,3]
Rhume des foins	◆ 4,5(-)	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ 4,4	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ 4,1	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 3,2(-)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 669(-)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 142,8(+)	[109,0]
Coqueluche	◆ 39,8(-)	[60,9]
Campylobactériose	◆ 35,4	[33,4]
Scarlatine	◆ 30,9(+)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ **2,4	[16,8]
Salmonellose	◆ 12,7	[16,6]
Infection gonococcique	◆ *4,1(-)	[10,3]
Giardiase	◆ 13,4	[9,8]
Sida	◆ **1,4	[5,7]
Tuberculose	◆ *3,8	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 125,8	[100,1]
Tumeurs	◆ 8,8	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 17,2	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 15,1	[10,6]
Appareil digestif	◆ 16,1	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 10,0	[7,6]
Traumatismes	◆ 10,8	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer¹ (1990-92) p. 100 000

Total	◆ 421(+)	[391]
Côlon-rectum	◆ 55	[53]
Poumon	◆ 86(+)	[70]
Sein chez la femme	◆ 103	[93]
Prostate	◆ 70(-)	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 75,9(-)	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances vivantes	◆ 8,1(+)	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances	◆ 8,6	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 771(+)	[691]
Tumeurs	◆ 238(+)	[209]
Appareil circulatoire	◆ 273	[261]
Appareil respiratoire	◆ 66(+)	[56]
Traumatismes	◆ 61(+)	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ 18,7	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 64,7	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 7 535(+)	[6 523]
Tumeurs	◆ 2 134(+)	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 445(+)	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 227	[221]
Traumatismes	◆ 2 000(+)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 2 076	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 3	[2]
Blessures graves %	◆ 16	[13]
Blessures légères %	◆ 81	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 39	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ 8,2	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,90(+)	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 81,7	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 977,4	[824,8]
Tumeurs	◆ 112,7	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 186,9	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 98,0	[74,0]
Appareil digestif	◆ 104,4	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 62,6	[45,3]
Traumatismes	◆ 102,1	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 20,6(-)	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 55,6	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ 9,9	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 33,4	[28,4]

- Notes :
1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 - * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

03 RÉGION DE QUÉBEC

Déterminants de la santé

Troisième en importance par sa population, la région de Québec comptait 632 815 personnes en 1991. Au fil des ans, la population de la région de Québec s'est accrue sensiblement au même rythme que celle de l'ensemble du Québec. Sa population vieillit, son indice synthétique de fécondité est le plus faible du Québec et les jeunes, en 1991, constituent à peine 18 % de la population.

La situation socioéconomique est, sans être enviable, intéressante. La scolarité y est plus élevée, les chômeurs et les assistés sociaux moins nombreux mais la proportion de la population vivant sous le seuil de faible revenu est comparable à celle de l'ensemble du Québec.

Les comportements, habitudes de vie et facteurs de risque sont souvent meilleurs dans la région que dans l'ensemble du Québec. Soulignons seulement que les naissances de faible poids et le taux de grossesses à l'adolescence sont significativement plus faibles.

Pour ce qui est de l'organisation des soins, la région de Québec est relativement bien pourvue avec 5,9 lits de courte durée pour 1 000 habitants et un médecin pour 364 habitants. Conséquence ou non de cette relative disponibilité de services, les séjours moyens d'hospitalisation de la région de Québec sont plus longs que ceux de l'ensemble du Québec.

État de santé

Concernant l'état de santé, peu de choses ressortent, si ce n'est que la population de la région de Québec se perçoit généralement en bonne santé et déclare moins de problèmes de santé. L'espérance de vie à la naissance de la population de la région surpasse aussi celle de l'ensemble du Québec.

Conséquences des problèmes de santé

Dans la région de Québec, la proportion d'enfants handicapés est significativement plus élevée. Les consultations médicales, les césariennes ainsi que le nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus sont aussi plus élevés dans la région que dans l'ensemble du Québec.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 89,3	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 93,1	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 44,5	[42,7]
Social		
Démographique		
4. Population (1991)	◆ 632 815	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 17,7	[19,8]
15-64 ans %	◆ 70,9	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 11,4	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ 4,8	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,40	[1,65]
Sociodémographique		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 0,7	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 2,2	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 18,3	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 13,4	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 42,3	[43,6]
Socioéconomique		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 16,6	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 9,3(-)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 40,9	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 9,9	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 19,2	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 11,0	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ 27,2	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ 7,3	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ 65,8	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ 21,5	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 90,4	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 5,4(-)	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 26,9(-)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ 66,5	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ 39,4	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ 26,4	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ 4,2	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ 12,4	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 597,7(-)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 5,9	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 9,4	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 364	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 2 577	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 9,2	[8,2]
Tumeurs	◆ 14,5	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 11,8	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 8,1	[6,9]
Appareil digestif	◆ 7,0	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 6,5	[5,8]
Traumatismes	◆ 11,2	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 76,0(+)	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ 8,7	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ 51,5(-)	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 7,4(-)	[10,0]
Maux de tête	◆ 7,6	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 6,1(-)	[7,9]
Maux de dos	◆ 5,9(-)	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 7,7	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ 4,4(-)	[6,5]
Hypertension	◆ 5,6	[6,3]
Rhume des foins	◆ *3,6(-)	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ 4,4	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ *3,1	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 4,1(+)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 774(+)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydirose	◆ 116,8	[109,0]
Coqueluche	◆ 76,0(+)	[60,9]
Campylobactériose	◆ 59,4(+)	[33,4]
Scarlatine	◆ 22,4(+)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ 9,3(-)	[16,8]
Salmonellose	◆ 25,1(+)	[16,6]
Infection gonococcique	◆ 8,6	[10,3]
Giardiase	◆ *5,5(-)	[9,8]
Sida	◆ *3,1(-)	[5,7]
Tuberculose	◆ *3,7	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 96,4	[100,1]
Tumeurs	◆ 7,8	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 15,4	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 10,6	[10,6]
Appareil digestif	◆ 13,0	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 6,8	[7,6]
Traumatismes	◆ 7,0	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 384	[391]
Côlon-rectum	◆ 52	[53]
Poumon	◆ 70	[70]
Sein chez la femme	◆ 93	[93]
Prostate	◆ 90	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 77,5(+)	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances vivantes	◆ 5,3	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances	◆ 7,0	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 684	[691]
Tumeurs	◆ 211	[209]
Appareil circulatoire	◆ 255	[261]
Appareil respiratoire	◆ 59	[56]
Traumatismes	◆ 44	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ 16,9	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 67,1	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 6 245(-)	[6 523]
Tumeurs	◆ 1 999(+)	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 279	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 209	[221]
Traumatismes	◆ 1 371(-)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 3 916	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 2	[2]
Blessures graves %	◆ 14	[13]
Blessures légères %	◆ 85	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 35	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ 6,3	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,46(+)	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 83,9	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 908,8	[824,8]
Tumeurs	◆ 123,1	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 197,8	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 86,0	[74,0]
Appareil digestif	◆ 94,6	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 46,2	[45,3]
Traumatismes	◆ 81,5	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 23,9(+)	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 59,3	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ 9,8	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 31,8	[28,4]

- Notes : 1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

04 RÉGION DE LA MAURICIE — BOIS-FRANCS

Déterminants de la santé

Avec un effectif de 477 596 personnes en 1991, la région de la Mauricie—Bois-Francis occupait, pour ce qui est de la population, le quatrième rang. Entre 1986 et 1991, le taux d'accroissement de la population était en deçà de celui du Québec. D'autre part, la population vieillit. En 1991, la Mauricie—Bois-Francis possédait le troisième plus fort pourcentage de personnes âgées.

Sur le plan socioéconomique, la région se démarque peu. Les gens y sont un peu moins scolarisés et la proportion de personnes inoccupées y est légèrement plus élevée.

Pour ce qui est des comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, la situation est dans l'ensemble positive. Mentionnons à cet effet que les résidents de la Mauricie—Bois-Francis bouclent davantage leur ceinture de sécurité, que les grossesses à l'adolescence y sont moins nombreuses et que la criminalité y est aussi moindre. Par contre, les femmes de 50 ans et plus de la région sont celles qui sont les moins enclines à subir une mammographie.

Concernant l'organisation des soins, on constate que la région de la Mauricie—Bois-Francis se situe au troisième rang pour le nombre de lits et de places au permis de longue durée pour 1 000 habitants. Dans un autre ordre d'idées, elle occupe le troisième rang pour le taux d'incidence de la coqueluche.

État de santé

Que ce soit pour l'état de santé subjective ou objectif, ou encore pour la morbidité hospitalière ou pour la mortalité, la population de la Mauricie—Bois-Francis possède un état de santé semblable à celui du Québec. Seul un taux d'intoxication moindre la distingue du Québec.

Conséquences des problèmes de santé

À l'image de l'état de santé, les indicateurs de conséquences des problèmes de santé de la Mauricie—Bois-Francis diffèrent peu de ceux de l'ensemble du Québec.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 87,4	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 60,8	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 48,0	[42,7]
Social		
<i>Démographique</i>		
4. Population (1991)	◆ 477 596	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 20,5	[19,8]
15-64 ans %	◆ 67,0	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 12,6	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ 2,3	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,67	[1,65]
<i>Sociodémographique</i>		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 0,7	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 1,2	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 17,0	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 12,1	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 37,9	[43,6]
<i>Socioéconomique</i>		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 24,1	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 15,3	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 46,7	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 12,7	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 18,2	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 13,4	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ 31,7	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ 6,0	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ 71,8	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ 25,3	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 92,4(+)	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 6,1	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 31,0(-)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ 63,3	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ 32,4(-)	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ 26,8	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ 4,3	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ 10,3	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 429,7(-)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 3,5	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 9,5	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 695	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 1 708	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 8,3	[8,2]
Tumeurs	◆ 13,1	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 11,7	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 6,9	[6,9]
Appareil digestif	◆ 6,5	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 5,6	[5,8]
Traumatismes	◆ 11,1	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 86,5(+)	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ 10,7	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ 53,7	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 8,7	[10,0]
Maux de tête	◆ 7,1	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 8,3	[7,9]
Maux de dos	◆ 6,9	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 8,1	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foies et cutanées)	◆ 5,5	[6,5]
Hypertension	◆ 5,2	[6,3]
Rhume des foies	◆ 5,0	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ 5,4	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ 3,6	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux des lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 4,3(+)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 592(-)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 102,8	[109,0]
Coqueluche	◆ 86,5(+)	[60,9]
Campylobactériose	◆ 35,9	[33,4]
Scarlatine	◆ 35,5(+)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ *6,8(-)	[16,8]
Salmonellose	◆ 13,4	[16,6]
Infection gonococcique	◆ *3,9(-)	[10,3]
Giardiase	◆ 8,3	[9,8]
Sida	◆ *2,3(-)	[5,7]
Tuberculose	◆ *2,7(-)	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 110,4	[100,1]
Tumeurs	◆ 8,3	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 15,9	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 12,7	[10,6]
Appareil digestif	◆ 14,4	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 8,9	[7,6]
Traumatismes	◆ 9,0	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 381	[391]
Côlon-rectum	◆ 52	[53]
Poumon	◆ 67	[70]
Sein chez la femme	◆ 84	[93]
Prostate	◆ 102	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 77,1	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances vivantes	◆ 5,5	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances	◆ 7,8	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 696	[691]
Tumeurs	◆ 203	[209]
Appareil circulatoire	◆ 264	[261]
Appareil respiratoire	◆ 60	[56]
Traumatismes	◆ 57(+)	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ 20,1	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 66,0	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 6 903(+)	[6 523]
Tumeurs	◆ 1 919	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 327(+)	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 252(+)	[221]
Traumatismes	◆ 2 028(+)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 3 563	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 3	[2]
Blessures graves %	◆ 16	[13]
Blessures légères %	◆ 82	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 37	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ 8,3	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,36	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 80,5	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 949,7	[824,8]
Tumeurs	◆ 121,4	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 212,8	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 91,4	[74,0]
Appareil digestif	◆ 97,9	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 52,6	[45,3]
Traumatismes	◆ 103,2	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 23,0	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 61,2	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ 7,7	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 28,5	[28,4]

- Notes :
1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 - * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

05 RÉGION DE L'ESTRIE

Déterminants de la santé

En 1991, 275 092 personnes résidaient en Estrie et, de ce nombre, 12,4 % avaient 65 ans et plus. Au cours de la période 1986-1991, la population de l'Estrie s'est accrue de 3,7 %, soit une augmentation inférieure à celle de l'ensemble du Québec (5,2 %). Comparativement au Québec, l'Estrie compte plus de personnes seules mais moins de familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans.

Les conditions socioéconomiques de la région s'apparentent à celles du Québec. Le taux de chômage avoisine les 11 %, la proportion d'assistés sociaux est d'environ 13 % et près de 18 % de la population vit sous le seuil de faible revenu.

Trois points différencient l'Estrie du Québec pour les comportements, habitudes de vie et facteurs de risque. Les résidents de l'Estrie attachent moins leur ceinture de sécurité. Par contre, la proportion de naissances de faible poids et le taux de crimes contre la personne y sont significativement plus faibles.

En ce qui concerne l'organisation des soins, mentionnons qu'avec un médecin pour 436 habitants, l'Estrie fait relativement bonne figure en occupant, parmi l'ensemble des régions, le troisième rang.

État de santé

L'état de santé de la population de l'Estrie est généralement bon. La population déclare moins de problèmes de santé, les années potentielles de vie perdues sont plus faibles et l'espérance de vie à la naissance est l'une des plus élevées au Québec.

Conséquences des problèmes de santé

Enfin, l'Estrie se distingue de l'ensemble du Québec avec un taux de césariennes et une durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle plus faibles. Par contre, l'Estrie dépasse le Québec pour le taux de pontages coronariens et la proportion de la population ayant consommé trois classes de médicaments et plus.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

	Région	Québec
Environnement		
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 74,0	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 95,5	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 46,9	[42,7]
Social		
Démographique		
4. Population (1991)	◆ 275 092	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 20,9	[19,8]
15-64 ans %	◆ 66,7	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 12,4	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ 3,7	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,73	[1,65]
Sociodémographique		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 0,8	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 3,2	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 13,9	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 12,7	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 42,7	[43,6]
Socioéconomique		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 22,1	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 14,3(-)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 43,3	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 11,1	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 17,8	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 12,7	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ 30,5	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ 6,7	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ 68,4	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ 24,6	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 86,7(-)	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 5,3(-)	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 36,8	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ 67,2	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ 41,6	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ 24,8	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ 5,6	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ 10,8	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 388,3(-)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 4,3	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 9,4	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 436	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 2 062	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 8,3	[8,2]
Tumeurs	◆ 12,0	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 11,7	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 7,0	[6,9]
Appareil digestif	◆ 6,9	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 5,7	[5,8]
Traumatismes	◆ 11,0	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 57,6	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ 11,2	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ 50,3(-)	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 9,0	[10,0]
Maux de tête	◆ 8,2	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 6,4	[7,9]
Maux de dos	◆ 6,5	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 6,5	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ 5,6	[6,5]
Hypertension	◆ 6,6	[6,3]
Rhume des foins	◆ 4,8	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ 3,8	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ 4,4	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 4,4(+)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 656(-)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 106,6	[109,0]
Coqueluche	◆ 57,6	[60,9]
Campylobactériose	◆ 46,1(+)	[33,4]
Scarlatine	◆ 9,3(-)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ 11,8(-)	[16,8]
Salmonellose	◆ 15,7	[16,6]
Infection gonococcique	◆ 4,3(-)	[10,3]
Giardiase	◆ 16,1(+)	[9,8]
Sida	◆ 1,8	[5,7]
Tuberculose	◆ 1,1	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 108,1	[100,1]
Tumeurs	◆ 9,0	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 18,2	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 10,9	[10,6]
Appareil digestif	◆ 13,9	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 7,8	[7,6]
Traumatismes	◆ 7,8	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 385	[391]
Côlon-rectum	◆ 53	[53]
Poumon	◆ 68	[70]
Sein chez la femme	◆ 93	[93]
Prostate	◆ 99	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 77,6	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances vivantes	◆ 6,2	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances	◆ 7,3	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 676	[691]
Tumeurs	◆ 193(-)	[209]
Appareil circulatoire	◆ 264	[261]
Appareil respiratoire	◆ 52	[56]
Traumatismes	◆ 53	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ 17,7	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 65,7	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 6 259(-)	[6 523]
Tumeurs	◆ 1 773(-)	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 221(-)	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 225	[221]
Traumatismes	◆ 1 652(+)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 2 163	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 2	[2]
Blessures graves %	◆ 14	[13]
Blessures légères %	◆ 83	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 35	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ 8,9	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,35	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 81,2	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 932,3	[824,8]
Tumeurs	◆ 117,0	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 237,4	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 81,8	[74,0]
Appareil digestif	◆ 99,7	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 45,5	[45,3]
Traumatismes	◆ 89,2	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 15,6(-)	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 89,2(+)	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ 10,0	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 28,0	[28,4]

- Notes :
1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 - Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

06 RÉGION DE MONTRÉAL-CENTRE

Déterminants de la santé

Montréal-Centre, la plus peuplée des régions socio-sanitaires, comptait 1 822 516 personnes en 1991. Son taux d'accroissement (0,9 % entre 1986 et 1991) est toutefois faible, de même que son indice synthétique de fécondité. Sa structure d'âge est par ailleurs vieillissante. De fait, en 1991, Montréal-Centre était à la fois la région ayant la plus faible proportion de jeunes (0-14 ans) et le plus fort pourcentage de personnes âgées (65 ans et plus).

Montréal-Centre est également la région la plus hétérogène du Québec. En 1991, on dénombrait entre autres 24 % d'immigrants et 16 % d'allophones. Par ailleurs, les familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans et les personnes seules y sont particulièrement nombreuses.

La situation socioéconomique de la région est très défavorable. En 1990, Montréal-Centre se démarquait nettement des autres régions avec la proportion de personnes vivant sous le seuil de faible revenu la plus élevée (28 %). De plus, en 1995, près de 18 % de la population de Montréal-Centre vivait de prestations d'aide sociale.

À des conditions socioéconomiques difficiles s'ajoutent des comportements, habitudes de vie et facteurs de risque affectant l'état de santé. La proportion de naissances de faible poids, de même que le taux de grossesses à l'adolescence, la proportion de la population insatisfaite de sa vie sociale et le taux de crimes contre la personne sont tous supérieurs à la moyenne québécoise.

En contrepartie, l'organisation des soins de Montréal-Centre est particulièrement développée. Montréal-Centre occupe entre autres le premier rang pour le nombre d'habitants par médecin et pour le nombre de lits au permis de courte durée pour 1 000 habitants. Elle détient le deuxième rang pour le nombre de lits et places au permis de longue durée pour 1 000 habitants, et le troisième rang pour les dépenses *per capita* consacrées au domaine de la santé et des services sociaux.

État de santé

Si, dans l'ensemble, les déterminants apparaissent défavorables, il n'en demeure pas moins que l'état de santé de la population de Montréal-Centre surpasse, à bien des égards, celui de l'ensemble du Québec. Ainsi, l'espérance de vie à la naissance de même que l'espérance de vie en bonne santé sont parmi les plus élevées au Québec. La morbidité hospitalière, la mortalité et la mortalité par suicide sont, toutes proportions gardées, inférieurs dans Montréal-Centre.

Conséquences des problèmes de santé

En ce qui a trait aux conséquences des problèmes de santé, quatre éléments sont à souligner. Tout d'abord, la proportion de la population ayant consommé trois classes de médicaments et plus et le taux de césariennes sont, comparativement au Québec, significativement plus élevés dans Montréal-Centre. Par contre, comme points positifs, on constate que la proportion d'enfants handicapés et que le nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus sont moindres.

DETERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 60,9	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 100,0	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 31,7	[42,7]
Social		
<i>Démographique</i>		
4. Population (1991)	◆ 1 822 516	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 15,7	[19,8]
15-64 ans %	◆ 70,2	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 14,0	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ 0,9	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,52	[1,65]
<i>Sociodémographique</i>		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 15,9	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 23,6	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 24,9	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 17,6	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 49,6	[43,6]
<i>Socioéconomique</i>		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 19,5	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 17,5(+)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 44,5	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 13,2	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 27,8	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 17,5	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ² (1992-93) %	◆ 28,6	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ² (1992-93) %	◆ 5,8	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ² (1992-93) %	◆ 68,1	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ² (1992-93) %	◆ 23,3	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 90,4	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 6,2(+)	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 48,6(+)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ² (1992-93) %	◆ 64,0	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ² (1992-93) %	◆ 44,0	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ² (1992-93) %	◆ 26,9	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ² (1992-93) %	◆ 3,5	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ² (1992-93) %	◆ 13,2(+)	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 1 164,9(+)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 6,3	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 11,0	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 324	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 2 843	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 8,9	[8,2]
Tumeurs	◆ 13,7	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 12,3	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 8,1	[6,9]
Appareil digestif	◆ 7,6	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 6,2	[5,8]
Traumatismes	◆ 10,8	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 29,4(-)	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ² (1992-93) %	◆ 10,9	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ² (1987) %	◆ 59,4(+)	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ² (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 12,8(+)	[10,0]
Maux de tête	◆ 10,0(+)	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 10,0(+)	[7,9]
Maux de dos	◆ 9,1(+)	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 9,1(+)	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ 8,1(+)	[6,5]
Hypertension	◆ 7,2	[6,3]
Rhume des foins	◆ 8,1(+)	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ 5,6	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ 4,7	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 3,3(-)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 604(-)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 98,7(-)	[109,0]
Coqueluche	◆ 29,4(-)	[60,9]
Campylobactériose	◆ 24,0(-)	[33,4]
Scarlatine	◆ 4,7(-)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ 40,9(+)	[16,8]
Salmonellose	◆ 15,0	[16,6]
Infection gonococcique	◆ 23,9(+)	[10,3]
Giardiase	◆ 11,9(+)	[9,8]
Sida	◆ 16,1(+)	[5,7]
Tuberculose	◆ 11,4(+)	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 89,7	[100,1]
Tumeurs	◆ 8,2	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 11,9	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 8,5	[10,6]
Appareil digestif	◆ 11,1	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 6,9	[7,6]
Traumatismes	◆ 6,6	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer¹ (1990-92) p. 100 000

Total	◆ 394	[391]
Côlon-rectum	◆ 53	[53]
Poumon	◆ 68	[70]
Sein chez la femme	◆ 94	[93]
Prostate	◆ 85	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 77,5(+)	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances vivantes	◆ 6,3	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances	◆ 8,4	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 674(-)	[691]
Tumeurs	◆ 206	[209]
Appareil circulatoire	◆ 251(-)	[261]
Appareil respiratoire	◆ 52(-)	[56]
Traumatismes	◆ 40(-)	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ 13,0(-)	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 68,0	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 6 656(+)	[6 523]
Tumeurs	◆ 1 931	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 274	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 231(+)	[221]
Traumatismes	◆ 1 224(-)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 11 870	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 1	[2]
Blessures graves %	◆ 9	[13]
Blessures légères %	◆ 90	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 42	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ² (1992-93) %	◆ 7,2	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,26(-)	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 81,8	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 879,9	[824,8]
Tumeurs	◆ 129,9	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 179,3	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 74,5	[74,0]
Appareil digestif	◆ 93,3	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 45,8	[45,3]
Traumatismes	◆ 77,5	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 24,7(+)	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 67,3(+)	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ² (1992-93) %	◆ 10,0(+)	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 26,6	[28,4]

Notes :

- La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 - Lors du calcul des tests statistiques au seuil alpha 0,05, la région est comparée au reste du Québec.
 - Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

07 RÉGION DE L'OUTAOUAIS

Déterminants de la santé

En 1991, on dénombrait 291 556 personnes dans l'Outaouais. Au cours de la période 1986-1991, le taux d'accroissement de la population de l'Outaouais fut de 10,3 %, soit près du double de celui de l'ensemble du Québec.

L'Outaouais bénéficie de conditions économiques favorables. Comparativement à l'ensemble du Québec, la proportion de personnes inoccupées et le taux de chômage y sont inférieurs.

Sur le plan des comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, l'Outaouais enregistre des pourcentages significativement plus élevés pour les grossesses à l'adolescence, les naissances de faible poids et les personnes présentant un excès de poids. Par contre, l'Outaouais dépasse la moyenne québécoise pour les femmes ayant subi un test de Pap et pour le port de la ceinture de sécurité.

État de santé

Compte tenu qu'une partie des résidents de l'Outaouais se font hospitaliser en Ontario, les taux d'hospitalisation et les taux d'incidence du cancer sont sous-estimés.

Toutefois, par rapport à l'ensemble du Québec, une plus grande proportion de la population de l'Outaouais déclare un problème de santé. Les résidents de l'Outaouais ont aussi une espérance de vie à la naissance significativement plus faible que celle de l'ensemble du Québec et un taux de mortalité significativement supérieur.

Conséquences des problèmes de santé

Une fois de plus, compte tenu qu'une partie des résidents de l'Outaouais se font hospitaliser en Ontario, le taux de journées d'hospitalisation de même que le taux de pontages coronariens sont sous-estimés.

Pour les autres indicateurs de la rubrique portant sur les conséquences des problèmes de santé, la région de l'Outaouais se démarque de l'ensemble du Québec par une faible proportion d'enfants handicapés.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 66,8	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 89,0	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 45,2	[42,7]
Social		
Démographique		
4. Population (1991)	◆ 291 556	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 21,1	[19,8]
15-64 ans %	◆ 70,5	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 8,4	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ 10,3	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,76	[1,65]
Sociodémographique		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 2,3	[5,4]
8. Immigrants (1991)	◆ 4,6	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 18,2	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 9,9	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 47,5	[43,6]
Socioéconomique		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 18,3	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 18,2(+)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 37,5	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 9,9	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 16,5	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 12,6	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ 34,5	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ 6,7	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ 63,9(-)	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ 29,4(+)	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 94,6(+)	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 6,5(+)	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 42,1(+)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ 74,3(+)	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ 48,3	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ 26,5	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ 3,8	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ 12,4	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 696,6	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 3,2	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 4,9	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 621	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 1 478	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 7,4	[8,2]
Tumeurs	◆ 12,0	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 11,8	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 6,2	[6,9]
Appareil digestif	◆ 5,9	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 4,9	[5,8]
Traumatismes	◆ 8,8	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 43,6(-)	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ 10,6	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ 58,9(+)	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 12,4	[10,0]
Maux de tête	◆ 10,4	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 9,8	[7,9]
Maux de dos	◆ 9,0	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 8,9	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ 8,8(+)	[6,5]
Hypertension	◆ 6,9	[6,3]
Rhume des foins	◆ 6,4	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ 6,6(+)	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ 4,1	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 2,5(-)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 575(-)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 123,1(+)	[109,0]
Coqueluche	◆ 43,6(-)	[60,9]
Campylobactériose	◆ 46,9(+)	[33,4]
Scarlatine	◆ 32,2(+)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ *6,8(-)	[16,8]
Salmonellose	◆ *11,4(-)	[16,6]
Infection gonococcique	◆ *4,2(-)	[10,3]
Giardiase	◆ 24,4(+)	[9,8]
Sida	◆ *3,9	[5,7]
Tuberculose	◆ **2,9	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 98,6	[100,1]
Tumeurs	◆ 8,4	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 12,8	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 12,4	[10,6]
Appareil digestif	◆ 13,6	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 8,2	[7,6]
Traumatismes	◆ 8,9	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 355	[391]
Côlon-rectum	◆ 50	[53]
Poumon	◆ 77	[70]
Sein chez la femme	◆ 87	[93]
Prostate	◆ 76	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 76,5(-)	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances vivantes	◆ 5,0	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances	◆ 7,6	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 741(+)	[691]
Tumeurs	◆ 211	[209]
Appareil circulatoire	◆ 285(+)	[261]
Appareil respiratoire	◆ 62	[56]
Traumatismes	◆ 46	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ 16,6	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 64,4	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 6 765(+)	[6 523]
Tumeurs	◆ 1 875	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 476(+)	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 216	[221]
Traumatismes	◆ 1 543(-)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 2 401	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 2	[2]
Blessures graves %	◆ 12	[13]
Blessures légères %	◆ 86	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 62	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ 8,0	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,28(-)	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 81,2	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 683,0	[824,8]
Tumeurs	◆ 82,6	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 130,3	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 72,1	[74,0]
Appareil digestif	◆ 76,5	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 39,5	[45,3]
Traumatismes	◆ 74,9	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 18,4(-)	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 2,3#	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ 10,1	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 28,7	[28,4]

- Notes :
1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 - * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 - # Une grande partie des pontages coronariens des résidents de l'Outaouais ont lieu dans des hôpitaux ontariens. Étant donné que les données de MED-ÉCHO ne comprennent que les hospitalisations se produisant au Québec, les taux obtenus pour l'Outaouais sous-estiment la réalité.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

08 RÉGION DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

Déterminants de la santé

En 1991, 155 886 personnes habitaient la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Lors de la période 1986-1991, le taux d'accroissement de la population fut de 3,2 %, soit un taux légèrement inférieur à celui du Québec.

La population de l'Abitibi-Témiscamingue est relativement jeune. En 1991, 23,6 % de la population avait moins de 15 ans et 8,7 % plus de 65 ans. De plus, l'indice synthétique de fécondité est plus élevé que la moyenne québécoise.

Comparativement à l'ensemble du Québec, la population de l'Abitibi-Témiscamingue est moins scolarisée et les chômeurs y sont plus nombreux. Mais malgré ces deux constats, moins de personnes vivent sous le seuil de faible revenu.

En ce qui a trait aux comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, ils sont plutôt défavorables. Le port de la ceinture de sécurité est faible, les grossesses à l'adolescence sont nombreuses et la détresse psychologique est particulièrement répandue. Par contre, un élément positif apparaît : les femmes de l'Abitibi-Témiscamingue recourent davantage que celles du Québec au test de dépistage du cancer du col utérin (test de Pap).

Pour l'organisation des soins, peu de choses à signaler, si ce n'est que les séjours moyens d'hospitalisation des résidents de l'Abitibi-Témiscamingue sont plus courts que ceux de l'ensemble de la population québécoise.

État de santé

La population de l'Abitibi-Témiscamingue déclare généralement moins de problèmes de santé. L'analyse des autres indicateurs de l'état de santé révèle que l'incidence du cancer, le taux d'hospitalisation ainsi que le taux de mortalité de la région sont plus élevés. De plus, l'espérance de vie à la naissance est plus faible.

Conséquences des problèmes de santé

Comparativement à l'ensemble du Québec, la population de l'Abitibi-Témiscamingue consulte moins souvent un médecin. Le taux de césarienne et le taux de pontages coronariens sont aussi plus faibles. Enfin, la durée moyenne d'indemnisation à la suite d'une lésion professionnelle est plus élevée dans la région qu'au Québec.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 53,8	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 48,2	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 45,4	[42,7]
Social		
Démographique		
4. Population (1991)	◆ 155 886	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 23,6	[19,8]
15-64 ans %	◆ 67,8	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 8,7	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ 3,2	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,86	[1,65]
Sociodémographique		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 0,6	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 1,3	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 15,1	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 10,6	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 43,4	[43,6]
Socioéconomique		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 24,9	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 20,2(+)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 46,8	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 17,4	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 15,0	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 10,8	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ 33,9	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ 6,8	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ 67,4	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ 28,1	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 87,3(-)	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 6,0	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 42,1(+)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ 72,0(+)	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ 48,4	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ 30,5(+)	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ 5,2	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ 10,9	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 598,6(-)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 3,6	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 6,9	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 611	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 1 996	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 7,0	[8,2]
Tumeurs	◆ 12,3	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 10,0	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 6,1	[6,9]
Appareil digestif	◆ 5,7	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 5,3	[5,8]
Traumatismes	◆ 8,3	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 74,8(+)	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ 13,1	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ 49,5(-)	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 7,4(-)	[10,0]
Maux de tête	◆ 9,0	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 7,8	[7,9]
Maux de dos	◆ 7,6	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 5,3(-)	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ 4,9	[6,5]
Hypertension	◆ 4,5(-)	[6,3]
Rhume des foins	◆ *2,5(-)	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ *4,1	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ *3,7	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 3,7(-)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 674	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 230,2(+)	[109,0]
Coqueluche	◆ 74,8(+)	[60,9]
Campylobactériose	◆ *15,2(-)	[33,4]
Scarlatine	◆ 41,2(+)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ **2,5	[16,8]
Salmonellose	◆ *9,5(-)	[16,6]
Infection gonococcique	◆ **3,2	[10,3]
Giardiase	◆ *7,0	[9,8]
Sida	◆ **1,3	[5,7]
Tuberculose	◆ **1,3	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 129,0	[100,1]
Tumeurs	◆ 8,8	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 19,2	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 16,2	[10,6]
Appareil digestif	◆ 16,1	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 9,7	[7,6]
Traumatismes	◆ 10,9	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer¹ (1990-92) p. 100 000

Total	◆ 435(+)	[391]
Côlon-rectum	◆ 57	[53]
Poumon	◆ 93(+)	[70]
Sein chez la femme	◆ 87	[93]
Prostate	◆ 97	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 76,4(-)	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances vivantes	◆ 5,8	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances	◆ 6,2	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 740(+)	[691]
Tumeurs	◆ 225	[209]
Appareil circulatoire	◆ 284	[261]
Appareil respiratoire	◆ 61	[56]
Traumatismes	◆ 66(+)	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ *23,3	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 65,5	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 7 219(+)	[6 523]
Tumeurs	◆ 2 093(+)	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 456(+)	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 246	[221]
Traumatismes	◆ 2 124(+)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 1 169	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 4	[2]
Blessures graves %	◆ 16	[13]
Blessures légères %	◆ 80	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 71	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ 7,1	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,45	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 74,9	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 850,3	[824,8]
Tumeurs	◆ 96,9	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 166,7	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 94,4	[74,0]
Appareil digestif	◆ 86,1	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 49,4	[45,3]
Traumatismes	◆ 88,2	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 19,5(-)	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 51,4(-)	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ 8,2	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 28,6	[28,4]

- Notes :
1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 - * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

09 RÉGION DE LA CÔTE-NORD

Déterminants de la santé

Les Nord-Côtiers quittent peu à peu leur région. La population de la Côte-Nord est ainsi passée de 123 940 personnes en 1976 à 105 904 personnes en 1991. Les jeunes sont encore nombreux mais le vieillissement semble amorcé. En 1991, 22,7 % de la population de la Côte-Nord avait moins de 15 ans et 6,0 % plus de 65 ans.

Les indicateurs socioéconomiques de la Côte-Nord sont pour le moins partagés. Le chômage est élevé mais la proportion de personnes vivant sous le seuil de faible revenu est faible.

Sur le plan des comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, on observe des proportions élevées de fumeurs réguliers et de grossesses à l'adolescence. Par contre, des points plus positifs ressortent : la criminalité est moindre et les femmes de 50 ans et plus de la Côte-Nord recourent davantage à la mammographie.

Concernant l'organisation des soins, on retient surtout que le nombre de lits et places au permis de longue durée pour 1 000 habitants est nettement inférieur à celui de l'ensemble du Québec.

État de santé

À l'instar des déterminants, l'état de santé des Nord-Côtiers est, dans l'ensemble, peu reluisant. Ainsi, l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie en bonne santé sont faibles, le taux d'hospitalisation, l'incidence du cancer, le taux de lésions professionnelles déclarées et indemnisées ainsi que le taux des années potentielles de vie perdues dépassent substantiellement la moyenne québécoise. Soulignons, de plus, que les taux d'incidence de la coqueluche et de la chlamydie de la Côte-Nord sont parmi les plus élevés du Québec.

Conséquences des problèmes de santé

Parallèlement à cet état de santé précaire, la Côte-Nord enregistre un taux de journées d'hospitalisation, un taux de pontages coronariens et un pourcentage de personnes ayant une incapacité à long terme nettement supérieurs à ceux de l'ensemble du Québec. Par contre, dans la région, on constate un plus faible taux de consultations médicales.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 25,3	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 38,8	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 43,2	[42,7]
Social		
Démographique		
4. Population (1991)	◆ 105 904	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 22,7	[19,8]
15-64 ans %	◆ 71,3	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 6,0	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ -1,9	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,64	[1,65]
Sociodémographique		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 6,2	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 1,0	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 15,7	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 8,1	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 36,5	[43,6]
Socioéconomique		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 23,2	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 27,2(+)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 45,6	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 17,3	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 15,3	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 10,5	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ 35,5(+)	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ 7,9	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ 63,8(-)	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ 28,1	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 89,0	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 5,9	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 40,9(+)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ 70,7	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ 56,1(+)	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ 25,5	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ *3,6	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ 11,1	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 618,0(-)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 4,4	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 3,9	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 565	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 2 062	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 7,4	[8,2]
Tumeurs	◆ 11,7	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 10,0	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 6,0	[6,9]
Appareil digestif	◆ 6,0	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 6,0	[5,8]
Traumatismes	◆ 8,0	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 237,7(+)	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ 12,4	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ 51,3	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 8,5	[10,0]
Maux de tête	◆ 8,2	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 8,9	[7,9]
Maux de dos	◆ 6,9	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 5,1(-)	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ 5,9	[6,5]
Hypertension	◆ 5,0	[6,3]
Rhume des foins	◆ 2,8(-)	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ 5,3	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ 2,7	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 4,7(+)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 650(-)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 285,2(+)	[109,0]
Coqueluche	◆ 237,7(+)	[60,9]
Campylobactériose	◆ 20,9(-)	[33,4]
Scarlatine	◆ 41,8(+)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ 5,7	[16,8]
Salmonellose	◆ 11,4	[16,6]
Infection gonococcique	◆ 5,7	[10,3]
Giardiase	◆ 2,9	[9,8]
Sida	◆ 1,0	[5,7]
Tuberculose	◆ 5,7	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 159,5	[100,1]
Tumeurs	◆ 11,5	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 25,0	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 20,3	[10,6]
Appareil digestif	◆ 19,6	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 10,1	[7,6]
Traumatismes	◆ 11,8	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer¹ (1990-92) p. 100 000

Total	◆ 493(+)	[391]
Côlon-rectum	◆ 47	[53]
Poumon	◆ 108(+)	[70]
Sein chez la femme	◆ 99	[93]
Prostate	◆ 127	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 76,4(-)	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances vivantes	◆ 5,8	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances	◆ 9,5	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 740	[691]
Tumeurs	◆ 251(+)	[209]
Appareil circulatoire	◆ 235	[261]
Appareil respiratoire	◆ 66	[56]
Traumatismes	◆ 72(+)	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ 19,9	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 63,3	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 7 453(+)	[6 523]
Tumeurs	◆ 2 352(+)	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 016(-)	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 224	[221]
Traumatismes	◆ 2 507(+)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 790	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 3	[2]
Blessures graves %	◆ 17	[13]
Blessures légères %	◆ 80	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 43	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ 9,4(+)	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,46	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 71,4	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 1 051,1	[824,8]
Tumeurs	◆ 112,7	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 198,4	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 108,3	[74,0]
Appareil digestif	◆ 106,5	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 56,2	[45,3]
Traumatismes	◆ 90,1	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 19,0(-)	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 91,3(+)	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ 8,8	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 30,7	[28,4]

- Notes :
1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 - * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

10 RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC

Déterminants de la santé

La région du Nord-du-Québec est un vaste territoire peu peuplé. En 1991, à peine 20 778 personnes résidaient dans la région. Avec un taux de chômage plus élevé que celui du Québec et des perspectives d'emplois limitées, le Nord-du-Québec se vide. Entre 1981 et 1986, la population chutait de 20,8 %, et entre 1986 et 1991, elle diminuait à nouveau de 7,7 %.

Toutefois, la population est très jeune. En 1991, les moins de 15 ans représentent 27,7 % de la population et seulement 2,5 % des personnes sont âgées de plus de 65 ans. L'indice synthétique de fécondité est aussi supérieur à celui du Québec. Ajoutons que les personnes seules et les familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans sont peu nombreuses.

Par ailleurs, on retrouve moins de personnes ayant moins de neuf ans de scolarité. De plus, les gens habitent souvent le Nord-du-Québec dans le but d'y travailler; la proportion de personnes inoccupées est donc plus faible, tout comme les proportions d'assistés sociaux et de personnes vivant sous le seuil de faible revenu.

Pour ce qui est des comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, compte tenu que les enquêtes de Santé Québec ne sont pas représentatives à l'échelle du Nord-du-Québec, on dispose de peu d'informations sur le sujet. Malgré tout, on constate que le taux de grossesse à l'adolescence est plus faible comparativement au Québec.

Concernant l'organisation des soins, seules les durées d'hospitalisation diffèrent de la moyenne québécoise en étant nettement plus courtes au Nord-du-Québec.

État de santé

L'état de santé de la population du Nord-du-Québec semble moins bon que celui du Québec. Comparativement à l'ensemble du Québec, les lésions professionnelles, les hospitalisations, les cancers et les décès sont relativement plus élevés dans la région. De plus, l'espérance de vie à la naissance de la population du Nord-du-Québec se situe parmi les plus faibles du Québec.

Conséquences des problèmes de santé

Deux indicateurs distinguent la région de l'ensemble du Québec. La proportion d'enfants handicapés est faible, tout comme le taux de pontages coronariens.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement

Physique et écologie

	Région	Québec
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 0,0	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 78,9	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ n.d.	[42,7]

Social

Démographique

4. Population (1991)	◆ 20 778	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 27,7	[19,8]
15-64 ans %	◆ 69,8	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 2,5	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ -7,7	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,86	[1,65]

Sociodémographique

7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 1,2	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 0,9	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 9,5	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 7,5	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 43,2	[43,6]

Socioéconomique

12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 18,3	[20,1]
--	--------	--------

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 19,7(+)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 39,3	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 13,5	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 9,7	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 6,1	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ n.d.	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 5,1	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 20,6(-)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ n.d.	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 4,8	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 0,7	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ n.d.	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 1 662	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 5,2	[8,2]
Tumeurs	◆ 11,6	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 8,4	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 4,0	[6,9]
Appareil digestif	◆ 4,4	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 4,6	[5,8]
Traumatismes	◆ 5,5	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994) Coqueluche p. 100 000	◆ *83,4	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ n.d.	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ n.d.	[10,0]
Maux de tête	◆ n.d.	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ n.d.	[7,9]
Maux de dos	◆ n.d.	[7,7]
Troubles mentaux	◆ n.d.	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foies et cutanées)	◆ n.d.	[6,5]
Hypertension	◆ n.d.	[6,3]
Rhume des foies	◆ n.d.	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ n.d.	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ n.d.	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 6,0(+)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 795	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 206,0(+)	[109,0]
Coqueluche	◆ *83,4	[60,9]
Campylobactériose	◆ 0,0	[33,4]
Scarlatine	◆ *103,0(+)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ **9,8	[16,8]
Salmonellose	◆ **14,7	[16,6]
Infection gonococcique	◆ **9,8	[10,3]
Giardiase	◆ **4,9	[9,8]
Sida	◆ 0,0	[5,7]
Tuberculose	◆ **9,8	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 195,4	[100,1]
Tumeurs	◆ 11,9	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 28,0	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 26,8	[10,6]
Appareil digestif	◆ 21,3	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 14,0	[7,6]
Traumatismes	◆ 15,8	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ *480	[391]
Côlon-rectum	◆ **59	[53]
Poumon	◆ **94	[70]
Sein chez la femme	◆ **59	[93]
Prostate	◆ **131	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 75,1(-)	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances vivantes	◆ **5,9	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances	◆ *8,9	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 823	[691]
Tumeurs	◆ *333	[209]
Appareil circulatoire	◆ *299	[261]
Appareil respiratoire	◆ **61	[56]
Traumatismes	◆ **38	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ **14,6	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ n.d.	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 6 610	[6 523]
Tumeurs	◆ 2 077	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 213	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 264	[221]
Traumatismes	◆ 1 657	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ n.d.	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ n.d.	[2]
Blessures graves %	◆ n.d.	[13]
Blessures légères %	◆ n.d.	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 45	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,06(-)	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ n.d.	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 759,5	[824,8]
Tumeurs	◆ 71,0	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 112,6	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 82,3	[74,0]
Appareil digestif	◆ 70,5	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 50,3	[45,3]
Traumatismes	◆ 78,0	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 21,2	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ *31,9(-)	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ n.d.	[28,4]

- Notes : 1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 n.d. Non disponible.
 [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

11 RÉGION DE LA GASPÉSIE — ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Déterminants de la santé

Face à des perspectives d'emplois limitées, de nombreux Gaspésiens quittent leur région; par ailleurs, peu d'immigrants viennent s'y installer. Ainsi, en 1991, la région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine comptait 108 507 personnes, une diminution de 6,3 % par rapport à 1986.

La région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine connaît une situation économique inquiétante. Plus de 30 % des Gaspésiens n'ont pas atteint la dixième année, le pourcentage de personnes inoccupées dépasse les 55 %, le chômage atteint les 25 % et la proportion d'assistés sociaux ainsi que celle vivant sous le seuil de faible revenu avoisinent les 20 %.

Au point de vue des comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, trois points distinguent la région de l'ensemble du Québec : la criminalité est moindre mais la proportion de personnes présentant un excès de poids et la proportion de conducteurs utilisant un dispositif de retenue sont quant à elles supérieures.

État de santé

Malgré des conditions socioéconomiques difficiles, l'état de santé de la population gaspésienne est, somme toute, comparable à celui du Québec. Bien qu'une forte proportion de la population de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine ne se perçoive pas comme étant en bonne santé, seuls le taux d'hospitalisation et le taux d'années potentielles de vie perdues sont significativement supérieurs. Par ailleurs, la région enregistre un taux d'intoxication et un taux de lésions professionnelles significativement inférieurs à la moyenne québécoise.

Conséquences des problèmes de santé

Concernant les conséquences, les indicateurs divergent. D'une part, on observe que la proportion d'enfants handicapés, ainsi que le taux de journées d'hospitalisation et la durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle, excèdent la moyenne québécoise. D'autre part, on constate qu'on pratique moins de césariennes dans la région de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine et que le taux de consultations médicales est l'un des plus faibles du Québec.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 58,8	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 37,6	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 47,6	[42,7]
Social		
Démographique		
4. Population (1991)	◆ 108 507	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 20,4	[19,8]
15-64 ans %	◆ 67,8	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 11,8	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ -6,3	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,59	[1,65]
Sociodémographique		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 0,4	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 0,3	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 14,3	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 7,4	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 24,6	[43,6]
Socioéconomique		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 31,4	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 24,5(+)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 56,6	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 25,1	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 19,5	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 19,1	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ 32,3	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ 6,1	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ 70,9	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ 31,5(+)	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 92,8(+)	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 5,5	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 32,3	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ 67,1	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ 50,8	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ 25,2	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ *3,7	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ 9,2	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 473,5(-)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 4,9	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 8,7	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 532	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 2 285	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 8,0	[8,2]
Tumeurs	◆ 12,2	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 11,6	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 6,4	[6,9]
Appareil digestif	◆ 6,1	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 5,2	[5,8]
Traumatismes	◆ 8,6	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ *12,3(-)	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ 16,2(+)	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ 52,8	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 9,4	[10,0]
Maux de tête	◆ 8,1	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 7,9	[7,9]
Maux de dos	◆ 6,8	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 9,1	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ 6,0	[6,5]
Hypertension	◆ 5,7	[6,3]
Rhume des foins	◆ *3,2(-)	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ 5,4	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ *3,2	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 3,0(-)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 509(-)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 103,0	[109,0]
Coqueluche	◆ *12,3(-)	[60,9]
Campylobactériose	◆ 41,6	[33,4]
Scarlatine	◆ 39,7(+)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ 0,0	[16,8]
Salmonellose	◆ *17,9	[16,6]
Infection gonococcique	◆ **0,9	[10,3]
Giardiase	◆ **7,6	[9,8]
Sida	◆ 0,0	[5,7]
Tuberculose	◆ **2,8	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 144,0	[100,1]
Tumeurs	◆ 10,8	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 20,2	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 17,0	[10,6]
Appareil digestif	◆ 17,3	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 10,8	[7,6]
Traumatismes	◆ 13,1	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 396	[391]
Côlon-rectum	◆ 44	[53]
Poumon	◆ 84	[70]
Sein chez la femme	◆ 94	[93]
Prostate	◆ 83	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 77,1	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances vivantes	◆ *7,1	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances	◆ 10,3	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 692	[691]
Tumeurs	◆ 213	[209]
Appareil circulatoire	◆ 249	[261]
Appareil respiratoire	◆ 47	[56]
Traumatismes	◆ 55	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ *14,4	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 64,9	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 7 032(+)	[6 523]
Tumeurs	◆ 2 025(+)	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 263	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 188(-)	[221]
Traumatismes	◆ 1 827(+)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 793	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 3	[2]
Blessures graves %	◆ 18	[13]
Blessures légères %	◆ 79	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 72	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ 9,2	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,78(+)	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 72,2	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 1 191,7	[824,8]
Tumeurs	◆ 143,6	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 263,0	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 112,3	[74,0]
Appareil digestif	◆ 108,4	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 57,4	[45,3]
Traumatismes	◆ 116,0	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 16,8(-)	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 68,5	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ 8,1	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 28,2	[28,4]

- Notes :
1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 - * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 - (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 - [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

12 RÉGION DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES

Déterminants de la santé

En 1991, la région de la Chaudière-Appalaches regroupait 377 051 personnes, soit une augmentation de 2,8 % depuis 1986. Comme dans plusieurs régions, la population de la Chaudière-Appalaches est relativement homogène; les immigrants représentent moins de 1 % de la population et les allophones en constituent à peine 0,1 %. Comparativement à l'ensemble du Québec, mentionnons aussi qu'on retrouve dans la région une proportion inférieure de familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans.

Depuis plusieurs années, la région de la Chaudière-Appalaches connaît une relative prospérité économique. La région enregistre, comparativement au Québec, un faible taux de chômage, compte une proportion inférieure d'assistés sociaux et affiche une moindre proportion de personnes vivant sous le seuil de faible revenu.

Pour ce qui est des comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, trois points distinguent de façon significative la région de la Chaudière-Appalaches du Québec. Le taux de grossesses à l'adolescence et le taux de crimes contre la personne sont moins élevés. Par contre, la proportion de conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue est pour sa part inférieure à la moyenne québécoise.

État de santé

Dans la Chaudière-Appalaches, le taux particulièrement élevé de mortalité par suicide inquiète. Il en est de même pour le taux de lésions professionnelles, qui dépasse aussi largement la moyenne québécoise.

D'autres points, plus avantageux, ressortent également. La population de la Chaudière-Appalaches déclare moins de problèmes de santé; elle est aussi moins touchée par le cancer et moins affectée par la chlamydie.

Conséquences des problèmes de santé

Les lésions professionnelles sont nombreuses dans la Chaudière-Appalaches. Par contre, leur durée moyenne d'indemnisation est courte. On constate aussi que la région excède la moyenne québécoise pour le taux de césarienne et pour le nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologique		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 58,4	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 77,4	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 48,4	[42,7]
Social		
Démographique		
4. Population (1991)	◆ 377 051	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 22,4	[19,8]
15-64 ans %	◆ 66,6	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 10,9	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ 2,8	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,74	[1,65]
Sociodémographique		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 0,1	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 0,9	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 12,4	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 9,1	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 30,5	[43,6]
Socioéconomique		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 25,0	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 13,8(-)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 41,6	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 9,3	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 14,1	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 8,1	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ 27,7	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ 5,9	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ 72,1	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ 23,6	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 87,9(-)	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 5,5	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 19,3(-)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ 64,8	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ 42,8	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ 26,5	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ 3,9	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ 11,8	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 306,6(-)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 2,7	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 9,4	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 668	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 1 478	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 8,2	[8,2]
Tumeurs	◆ 13,2	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 11,3	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 6,3	[6,9]
Appareil digestif	◆ 6,1	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 6,0	[5,8]
Traumatismes	◆ 10,0	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 58,8	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ 11,7	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ 49,1(-)	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 8,9	[10,0]
Maux de tête	◆ 6,2	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 6,1(-)	[7,9]
Maux de dos	◆ 6,4	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 6,2	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ *4,5(-)	[6,5]
Hypertension	◆ *5,3	[6,3]
Rhume des foins	◆ *3,7(-)	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ *4,0	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ *4,3	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 5,7(+)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 628(-)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 60,4(-)	[109,0]
Coqueluche	◆ 58,8	[60,9]
Campylobactériose	◆ 25,3(-)	[33,4]
Scarlatine	◆ 24,6(+)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ *3,4(-)	[16,8]
Salmonellose	◆ 15,9	[16,6]
Infection gonococcique	◆ *4,2(-)	[10,3]
Giardiase	◆ *6,3(-)	[9,8]
Sida	◆ **1,0	[5,7]
Tuberculose	◆ **0,8	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 105,2	[100,1]
Tumeurs	◆ 7,4	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 18,1	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 12,7	[10,6]
Appareil digestif	◆ 12,7	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 7,4	[7,6]
Traumatismes	◆ 10,4	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer¹ (1990-92) p. 100 000

Total	◆ 360(-)	[391]
Côlon-rectum	◆ 52	[53]
Poumon	◆ 64	[70]
Sein chez la femme	◆ 83	[93]
Prostate	◆ 74(-)	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 77,4	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances vivantes	◆ 6,2	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances	◆ 8,2	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 685	[691]
Tumeurs	◆ 198	[209]
Appareil circulatoire	◆ 257	[261]
Appareil respiratoire	◆ 57	[56]
Traumatismes	◆ 66(+)	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ 23,6(+)	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 65,9	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 6 627(+)	[6 523]
Tumeurs	◆ 1 718(-)	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 169(-)	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 220	[221]
Traumatismes	◆ 2 259(+)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 2 658	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 3	[2]
Blessures graves %	◆ 16	[13]
Blessures légères %	◆ 81	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 33	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ 7,6	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,45	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 82,7	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 853,3	[824,8]
Tumeurs	◆ 99,6	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 210,1	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 81,6	[74,0]
Appareil digestif	◆ 78,2	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 44,2	[45,3]
Traumatismes	◆ 105,2	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 26,5(+)	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 64,7	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ 9,5	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 32,1	[28,4]

- Notes :
1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 - ** Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - * Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

13 RÉGION DE LAVAL

Déterminants de la santé

Au cours de la période 1986-1991, la population de la région de Laval s'est accrue deux fois plus rapidement que celle du Québec, soit de 10,1 % comparativement à 5,2 %. En 1991, la population de Laval était de 322 444 personnes.

Après Montréal-Centre, la région de Laval est celle qui accueille le plus d'immigrants (13,4 %). De plus, près de 10 % de sa population utilise à la maison une langue autre que le français ou l'anglais.

Dans l'ensemble, Laval bénéficie d'une situation socioéconomique favorable. Comparativement à l'ensemble du Québec, peu de personnes ont moins de neuf ans de scolarité, la proportion de personnes inoccupées est faible, le taux de chômage est bas et les assistés sociaux sont moins nombreux.

Du côté des comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, peu d'indicateurs différencient la population de Laval de celle du Québec. Seuls le taux de grossesses à l'adolescence et le taux de crimes contre la personne sont significativement inférieurs.

Le développement récent de la région et la proximité de Montréal font en sorte que Laval dispose d'un faible nombre de lits de courte durée, d'un nombre restreint de lits et places de longue durée et d'un nombre limité de médecins. Par ailleurs, les dépenses *per capita* consacrées au domaine de la santé et des services sociaux dans la région de Laval sont inférieures à la moyenne québécoise.

État de santé

L'état de santé de la population de Laval est parmi les meilleurs. Ainsi, comparativement à l'ensemble du Québec, l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie en bonne santé sont significativement supérieures. De plus, dans la région de Laval, le taux d'intoxication, le taux d'incidence de la chlamydie, le taux d'hospitalisation et le taux de mortalité sont tous significativement inférieurs aux valeurs québécoises.

Conséquences des problèmes de santé

Dans l'ensemble, la région de Laval a une faible proportion de personnes ayant une incapacité à long terme, un taux inférieur de journées d'hospitalisation et un plus petit nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus. Par contre, la population de Laval affiche un taux de consultations médicales et un taux de pontages coronariens supérieurs à la moyenne québécoise.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 27,3	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 19,0	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 45,0	[42,7]
Social		
Démographique		
4. Population (1991)	◆ 322 444	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 19,8	[19,8]
15-64 ans %	◆ 71,3	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 9,0	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ 10,1	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,69	[1,65]
Sociodémographique		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 9,1	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 13,4	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 16,3	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 8,5	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 44,8	[43,6]
Socioéconomique		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 16,3	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 9,9(-)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 37,7	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 10,1	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 16,2	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 8,2	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ 30,2	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ 7,8	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ 72,0	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ 27,0	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 90,2	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 5,6	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 32,7(-)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ 66,6	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ 45,1	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ 26,6	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ 2,9	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ 10,8	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 460,5(-)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 1,3	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 4,5	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 828	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 1 211	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 7,4	[8,2]
Tumeurs	◆ 11,4	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 10,4	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 6,3	[6,9]
Appareil digestif	◆ 6,1	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 5,5	[5,8]
Traumatismes	◆ 8,3	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 81,7(+)	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ 10,9	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ 50,7	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ *8,1	[10,0]
Maux de tête	◆ *7,0	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ *7,7	[7,9]
Maux de dos	◆ *6,8	[7,7]
Troubles mentaux	◆ **5,0	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ **4,1	[6,5]
Hypertension	◆ *5,5	[6,3]
Rhume des foins	◆ *7,2	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ **3,9	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ **4,1	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 3,8(-)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 552(-)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 83,8(-)	[109,0]
Coqueluche	◆ 81,7(+)	[60,9]
Campylobactériose	◆ 28,4	[33,4]
Scarlatine	◆ 19,0	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ 15,4	[16,8]
Salmonellose	◆ 11,8(-)	[16,6]
Infection gonococcique	◆ *5,9(-)	[10,3]
Giardiase	◆ *4,4(-)	[9,8]
Sida	◆ *3,3(-)	[5,7]
Tuberculose	◆ *3,6	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 80,5	[100,1]
Tumeurs	◆ 7,7	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 12,0	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 6,4	[10,6]
Appareil digestif	◆ 9,9	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 6,0	[7,6]
Traumatismes	◆ 5,5	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 405	[391]
Côlon-rectum	◆ 57	[53]
Poumon	◆ 71	[70]
Sein chez la femme	◆ 106	[93]
Prostate	◆ 95	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 78,2(+)	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances vivantes	◆ 5,1	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances	◆ 7,3	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 658(-)	[691]
Tumeurs	◆ 211	[209]
Appareil circulatoire	◆ 254	[261]
Appareil respiratoire	◆ 47(-)	[56]
Traumatismes	◆ 40(-)	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ 13,3	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 69,3	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 5 441(-)	[6 523]
Tumeurs	◆ 1 905	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 057(-)	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 156(-)	[221]
Traumatismes	◆ 1 197(-)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 2 137	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 1	[2]
Blessures graves %	◆ 5	[13]
Blessures légères %	◆ 94	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 41	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ 5,4(-)	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,32	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 83,3	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 576,4	[824,8]
Tumeurs	◆ 87,8	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 121,9	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 39,1	[74,0]
Appareil digestif	◆ 60,4	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 32,8	[45,3]
Traumatismes	◆ 44,1	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 23,8	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 67,5(+)	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ 7,0	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 25,5	[28,4]

- Notes :
1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 - * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

14 RÉGION DE LANAUDIÈRE

Déterminants de la santé

La région de Lanaudière connaît, depuis 1976, une croissance démographique marquée. De 219 573 personnes en 1976, la population est passée à 344 052 en 1991. Dans l'ensemble, les résidents de Lanaudière sont jeunes et la région a un taux de fécondité qui dépasse largement la moyenne québécoise.

Comparativement à l'ensemble du Québec, on retrouve dans Lanaudière moins de familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans, moins de personnes seules, moins de naissances de mères faiblement scolarisées et aussi moins de personnes vivant sous le seuil de faible revenu.

En ce qui a trait aux comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, on ne dénote aucune tendance précise. Dans la région de Lanaudière, les proportions de fumeurs réguliers et de personnes prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine excèdent de façon significative la moyenne québécoise. Par contre, le taux de crimes contre la personne, le taux de grossesses à l'adolescence et la proportion de personnes insatisfaites de leur vie sociale sont significativement inférieurs à la moyenne québécoise. De plus, la proportion de conducteurs utilisant un dispositif de retenue est significativement supérieure.

Dans Lanaudière, les sommes consacrées au domaine de la santé et des services sociaux sont moindres que la moyenne québécoise, tout comme le nombre de lits de courte durée et le nombre de médecins.

État de santé

L'état de santé de la population de Lanaudière semble moins favorable que celui de l'ensemble du Québec. Ainsi, l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie en bonne santé sont plus faibles. De plus, comparativement à l'ensemble du Québec, les taux de lésions professionnelles, d'intoxication et de mortalité sont significativement supérieurs. À l'inverse, on constate que les taux d'incidence de la chlamydie et de la mortalité infantile sont inférieurs à ceux du Québec.

Conséquences des problèmes de santé

Seuls la proportion d'enfants handicapés (plus élevée) et le taux de journées d'hospitalisation (plus faible) distinguent la région de Lanaudière de l'ensemble du Québec.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 68,1	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 17,4	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 46,9	[42,7]
Social		
<i>Démographique</i>		
4. Population (1991)	◆ 344 052	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 23,1	[19,8]
15-64 ans %	◆ 68,5	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 8,4	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ 19,9	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,93	[1,65]
<i>Sociodémographique</i>		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 0,8	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 2,0	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 13,5	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 7,7	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 45,1	[43,6]
<i>Socioéconomique</i>		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 20,6	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 13,7(-)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 40,5	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 10,9	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 14,5	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 10,5	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ 36,2(+)	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ 8,8(+)	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ 67,2	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ 22,9	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 92,9(+)	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 5,6	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 32,2(-)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ 71,0	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ 47,0	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ 25,5	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ 4,1	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ 8,1(-)	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 499,6(-)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 1,8	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 6,5	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 913	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 1 078	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 7,4	[8,2]
Tumeurs	◆ 11,7	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 9,9	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 6,6	[6,9]
Appareil digestif	◆ 6,8	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 5,6	[5,8]
Traumatismes	◆ 9,3	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 141,9(+)	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ 9,6	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ 54,3	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 9,6	[10,0]
Maux de tête	◆ 8,4	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 7,5	[7,9]
Maux de dos	◆ 8,3	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 8,1	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ 7,8	[6,5]
Hypertension	◆ *3,8(-)	[6,3]
Rhume des foins	◆ *6,8	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ *5,2	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ *4,1	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 5,5(+)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 753(+)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 87,5(-)	[109,0]
Coqueluche	◆ 141,9(+)	[60,9]
Campylobactériose	◆ 24,0(-)	[33,4]
Scarlatine	◆ 18,3	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ *7,5	[16,8]
Salmonellose	◆ 12,1(-)	[16,6]
Infection gonococcique	◆ *4,6(-)	[10,3]
Giardiase	◆ 13,5	[9,8]
Sida	◆ **1,6	[5,7]
Tuberculose	◆ **1,3	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 99,7	[100,1]
Tumeurs	◆ 8,6	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 16,5	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 10,9	[10,6]
Appareil digestif	◆ 11,7	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 7,0	[7,6]
Traumatismes	◆ 8,5	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 408	[391]
Côlon-rectum	◆ 58	[53]
Poumon	◆ 79	[70]
Sein chez la femme	◆ 89	[93]
Prostate	◆ 92	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 76,8(-)	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances vivantes	◆ 4,6(-)	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances	◆ 8,2	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 736(+)	[691]
Tumeurs	◆ 226(+)	[209]
Appareil circulatoire	◆ 275	[261]
Appareil respiratoire	◆ 66(+)	[56]
Traumatismes	◆ 59(+)	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ 18,3	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 64,1	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 6 354(-)	[6 523]
Tumeurs	◆ 2 026(+)	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 282	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 209	[221]
Traumatismes	◆ 1 689(+)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 3 133	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 2	[2]
Blessures graves %	◆ 14	[13]
Blessures légères %	◆ 84	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 47	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ 7,5	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,49(+)	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 81,8	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 683,0	[824,8]
Tumeurs	◆ 91,1	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 143,1	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 67,8	[74,0]
Appareil digestif	◆ 74,9	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 38,5	[45,3]
Traumatismes	◆ 75,9	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 23,3	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 63,0	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ 6,7	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 29,5	[28,4]

- Notes :
1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 - * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 - (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 - [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

15 RÉGION DES LAURENTIDES

Déterminants de la santé

La région des Laurentides connaît une importante poussée démographique. Entre 1986 et 1991, la population s'est accrue de 18,5 %. Cette population était de 274 605 personnes en 1976; elle atteignait 391 195 personnes en 1991.

Comparativement à l'ensemble du Québec, la population des Laurentides est légèrement plus jeune et l'indice synthétique de fécondité de la population féminine des Laurentides est nettement plus élevé que celui du Québec.

Au point de vue socioéconomique, hormis le fait que la proportion de naissances vivantes de mères faiblement scolarisées est inférieure dans la région, rien ne distingue la population des Laurentides de celle du Québec.

Du côté des comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, mis à part une plus grande proportion de fumeurs et un plus faible taux de criminalité, aucun autre indicateur ne différencie les Laurentides du Québec.

Pour ce qui est de l'organisation des soins, il est clair que la région des Laurentides est affectée par la proximité de Montréal. Le ratio du nombre de lits de courte durée pour 1 000 habitants des Laurentides est faible, tout comme le ratio du nombre d'habitants par médecin. De plus, les dépenses *per capita* consacrées au domaine de la santé et des services sociaux dans les Laurentides sont très en deçà de la moyenne québécoise.

État de santé

L'état de santé de la population des Laurentides est légèrement inférieur à celui de l'ensemble du Québec. L'espérance de vie à la naissance est légèrement plus faible : 76,9 ans pour la population des Laurentides comparativement à 77,3 ans pour celle du Québec. Les taux de mortalité, de lésions professionnelles et d'intoxication sont également plus élevés dans les Laurentides qu'au Québec.

Conséquences des problèmes de santé

Trois indicateurs ressortent. Le taux de journées d'hospitalisation, le taux de césariennes et le taux de pontages coronariens sont plus faibles dans les Laurentides que dans l'ensemble du Québec.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 79,9	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 35,8	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 48,9	[42,7]
Social		
Démographique		
4. Population (1991)	◆ 391 195	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 21,9	[19,8]
15-64 ans %	◆ 68,8	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 9,3	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ 18,5	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,89	[1,65]
Sociodémographique		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 0,9	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 3,1	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 15,8	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 9,3	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 48,1	[43,6]
Socioéconomique		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 20,0	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 13,5(-)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 41,1	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 12,2	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 15,9	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 11,2	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992-93) %	◆ 34,7(+)	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ 7,8	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ 66,7	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ 23,5	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 89,2	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 6,1	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 35,9	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-93) %	◆ 67,8	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ 43,2	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ 28,2	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-93) %	◆ 4,3	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-93) %	◆ 12,4	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 513,1(-)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 2,0	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 5,5	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 831	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 1 210	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 7,3	[8,2]
Tumeurs	◆ 12,0	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 10,7	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 6,1	[6,9]
Appareil digestif	◆ 5,8	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 5,3	[5,8]
Traumatismes	◆ 8,4	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 76,2(+)	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-93) %	◆ 10,2	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) %	◆ 57,5	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 11,0	[10,0]
Maux de tête	◆ 8,6	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 7,6	[7,9]
Maux de dos	◆ 10,2	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 6,7	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ 6,6	[6,5]
Hypertension	◆ 7,9	[6,3]
Rhume des foins	◆ *5,3	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ *5,3	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ *4,6	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 5,2(+)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 789(+)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 116,6	[109,0]
Coqueluche	◆ 76,2(+)	[60,9]
Campylobactériose	◆ 39,3	[33,4]
Scarlatine	◆ 23,3(+)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ 13,2(-)	[16,8]
Salmonellose	◆ 28,9(+)	[16,6]
Giardiase	◆ *6,6(-)	[9,8]
Infection gonococcique non NGPP	◆ *2,4(-)	[9,4]
Sida	◆ *4,0	[5,7]
Tuberculose	◆ **2,1	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 94,7	[100,1]
Tumeurs	◆ 8,6	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 14,3	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 8,8	[10,6]
Appareil digestif	◆ 11,6	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 7,0	[7,6]
Traumatismes	◆ 8,0	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 400	[391]
Côlon-rectum	◆ 56	[53]
Poumon	◆ 71	[70]
Sein chez la femme	◆ 96	[93]
Prostate	◆ 107	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 76,9(-)	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances vivantes	◆ 5,8	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances	◆ 6,8	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 724(+)	[691]
Tumeurs	◆ 211	[209]
Appareil circulatoire	◆ 278(+)	[261]
Appareil respiratoire	◆ 57	[56]
Traumatismes	◆ 55	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ 19,9	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 66,7	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 6 595(+)	[6 523]
Tumeurs	◆ 1 930	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 298	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 188(-)	[221]
Traumatismes	◆ 1 768(+)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 3 328	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 2	[2]
Blessures graves %	◆ 14	[13]
Blessures légères %	◆ 84	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 45	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-93) %	◆ 7,6	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,44	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 82,7	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 650,0	[824,8]
Tumeurs	◆ 96,9	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 140,5	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 52,0	[74,0]
Appareil digestif	◆ 65,2	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 35,9	[45,3]
Traumatismes	◆ 65,1	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 19,7(-)	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 53,0(-)	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-93) %	◆ 7,5	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 27,6	[28,4]

- Notes :
1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 - * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

16 RÉGION DE LA MONTÉRÉGIE

Déterminants de la santé

Avec 1 236 013 personnes en 1991, la Montérégie constitue, après Montréal-Centre, la deuxième région la plus peuplée du Québec. Au cours des dernières années, le taux d'accroissement de la population fut particulièrement élevé. Ainsi, entre 1986 et 1991, la population de la Montérégie s'est accrue deux fois plus rapidement que celle de l'ensemble du Québec, soit de 9,6 % comparativement à 5,2 %.

La population de la Montérégie est dans l'ensemble légèrement plus jeune que celle du Québec. De plus, une proportion relativement importante d'immigrants habite la région.

La situation socioéconomique de la Montérégie semble meilleure que celle de l'ensemble du Québec. La proportion de la population ayant moins de neuf ans de scolarité, la proportion de la population inoccupée, la proportion d'assistés sociaux de même que le taux de chômage sont tous inférieurs aux valeurs québécoises.

Du côté des comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, la région de la Montérégie enregistre des taux significativement plus faibles de grossesses à l'adolescence et de crimes contre la personne. La proportion de la population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine est aussi significativement inférieure à la moyenne québécoise.

En Montérégie, à l'instar des autres régions périphériques de Montréal, on retrouve moins de lits de courte durée pour 1 000 habitants, moins de médecins par habitant, et les dépenses *per capita* consacrées au domaine de la santé et des services sociaux sont moins importantes.

État de santé

L'état de santé de la population de la Montérégie apparaît somme toute meilleur que celui de l'ensemble du Québec. Le taux d'intoxication, le taux d'incidence de la chlamydie, le taux de mortalité périnatale et le taux d'années potentielles de vie perdues sont tous significativement inférieurs aux taux québécois.

Conséquences des problèmes de santé

Les conséquences des problèmes de santé sont dans l'ensemble moins importantes en Montérégie qu'au Québec. Ainsi, la proportion d'enfants handicapés et la proportion de la population ayant consommé trois classes de médicaments ou plus sont significativement inférieures. De plus, le taux de journées d'hospitalisation est, comparativement à l'ensemble du Québec, plus faible. Par contre, le taux de césarienne est significativement plus élevé.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 72,0	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ 81,5	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ 45,9	[42,7]
Social		
Démographique		
4. Population (1991)	◆ 1 236 013	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 21,5	[19,8]
15-64 ans %	◆ 69,3	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 9,2	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ 9,6	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 1,77	[1,65]
Sociodémographique		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 2,2	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 5,9	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 16,1	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 9,4	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 44,6	[43,6]
Socioéconomique		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 18,1	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 12,9(-)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 38,6	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 10,3	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 14,6	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 9,0	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ² (1992-93) %	◆ 29,9	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ² (1992-93) %	◆ 5,0(-)	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ² (1992-93) %	◆ 71,0	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ² (1992-93) %	◆ 27,1	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ 90,8	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ 5,8	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 33,1(-)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ² (1992-93) %	◆ 66,5	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ² (1992-93) %	◆ 43,7	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ² (1992-93) %	◆ 25,3	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ² (1992-93) %	◆ 4,1	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ² (1992-93) %	◆ 10,3	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ 476,9(-)	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 2,0	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 5,2	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ 772	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 1 098	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 7,6	[8,2]
Tumeurs	◆ 12,0	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 10,8	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 6,0	[6,9]
Appareil digestif	◆ 6,6	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 5,6	[5,8]
Traumatismes	◆ 9,4	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 52,5(-)	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ² (1992-93) %	◆ 10,1	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ² (1987) %	◆ 51,7	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ² (1987) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 8,3	[10,0]
Maux de tête	◆ 7,4	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 6,2(-)	[7,9]
Maux de dos	◆ 7,0	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 5,8(-)	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ 6,6	[6,5]
Hypertension	◆ 6,5	[6,3]
Rhume des foins	◆ 6,8	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ 4,5	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ 3,8	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ 4,3(+)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 612(-)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 79,9(-)	[109,0]
Coqueluche	◆ 52,5(-)	[60,9]
Campylobactériose	◆ 33,0	[33,4]
Scarlatine	◆ 12,8(-)	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ 11,1(-)	[16,8]
Salmonellose	◆ 14,4	[16,6]
Infection gonococcique	◆ 3,8(-)	[10,3]
Giardiase	◆ 8,0(-)	[9,8]
Sida	◆ *1,8(-)	[5,7]
Tuberculose	◆ *2,5(-)	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 95,5	[100,1]
Tumeurs	◆ 8,1	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 14,4	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 9,4	[10,6]
Appareil digestif	◆ 11,9	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 7,8	[7,6]
Traumatismes	◆ 6,8	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 390	[391]
Côlon-rectum	◆ 53	[53]
Poumon	◆ 67	[70]
Sein chez la femme	◆ 92	[93]
Prostate	◆ 112(+)	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 77,5	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances vivantes	◆ 5,4	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92)		
p. 1 000 naissances	◆ 6,7(-)	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 695	[691]
Tumeurs	◆ 210	[209]
Appareil circulatoire	◆ 272(+)	[261]
Appareil respiratoire	◆ 53	[56]
Traumatismes	◆ 47	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ 14,3	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 67,6	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 6 063(-)	[6 523]
Tumeurs	◆ 1 874(-)	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 241(-)	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 213	[221]
Traumatismes	◆ 1 475(-)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ 8 723	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ 2	[2]
Blessures graves %	◆ 14	[13]
Blessures légères %	◆ 85	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 37	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ² (1992-93) %	◆ 6,1	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,33(-)	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ 82,1	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 697,9	[824,8]
Tumeurs	◆ 92,8	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 146,0	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 55,0	[74,0]
Appareil digestif	◆ 75,7	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 42,4	[45,3]
Traumatismes	◆ 63,1	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 23,6(+)	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 59,8	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ² (1992-93) %	◆ 7,2(-)	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ 28,1	[28,4]

- Notes :
1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 2. Lors du calcul des tests statistiques au seuil alpha 0,05, la région est comparée au reste du Québec.
- * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
- [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec.

17 RÉGION DU NUNAVIK

Déterminants de la santé

Depuis 1976, la population du Nunavik a plus que doublé. Ainsi, elle est passée de 3 059 personnes en 1976 à 7 794 en 1991. Par ailleurs, le Nunavik a une population très jeune : 39,5 % de ces résidents ont moins de 15 ans comparativement à 19,8 % pour le Québec. De plus, l'indice synthétique de fécondité est phénoménal, le nombre moyen d'enfants par femme au Nunavik étant de 3,9 comparativement à 1,7 pour le Québec. Par contre, une proportion élevée de familles avec enfants de moins de 18 ans sont monoparentales.

Au Nunavik, la situation socioéconomique est difficile. Dans l'ensemble, les gens sont peu scolarisés, la proportion de personnes inoccupées est élevée et près de 20 % de la population vit de prestations d'assistance sociale.

Concernant les comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, les indications sont partagées. Tout d'abord, certains indicateurs présentent des valeurs inquiétantes : près des deux tiers de la population du Nunavik fume, les grossesses à l'adolescence sont fréquentes et les idées suicidaires sont, comparativement à l'ensemble du Québec, largement répandues. Par contre, la proportion de naissances vivantes de faible poids est inférieure à la moyenne québécoise tandis que la proportion de femmes de 15 ans et plus ayant subi un test de Pap est supérieure.

Pour l'organisation des soins, on retient surtout que c'est au Nunavik qu'on retrouve les dépenses *per capita* consacrées au domaine de la santé et des services sociaux les plus élevées au Québec.

État de santé

L'état de santé de la population du Nunavik est particulièrement défavorable. L'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie en bonne santé sont de près de dix ans inférieures à celles du Québec. De plus, le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité périnatale et le taux ajusté de mortalité dépassent largement les valeurs québécoises. Le taux d'hospitalisation, le taux d'années potentielles de vie perdues et le taux d'incidence de la chlamydie excèdent aussi de beaucoup les moyennes québécoises. Enfin, ajoutons qu'une part importante des habitants du Nunavik ne se perçoit pas en bonne santé.

Conséquences des problèmes de santé

La région du Nunavik enregistre une proportion de personnes ayant une incapacité à long terme et une proportion d'enfants handicapés plus basses que celles du Québec. Au Nunavik, les césariennes sont aussi moins nombreuses. Par contre, le taux de journées d'hospitalisation est plus élevé que dans l'ensemble du Québec.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 0,0	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ n.a.	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ n.d.	[42,7]
Social		
Démographique		
4. Population (1991)	◆ 7 794	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 39,5	[19,8]
15-64 ans %	◆ 58,4	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 2,1	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ 33,0	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 3,92	[1,65]
Sociodémographique		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 83,5	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ 1,2	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 24,3	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 7,5	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 64,2	[43,6]
Socioéconomique		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 41,7	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 59,1(+)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 48,9	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 14,7	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 16,8	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 19,8	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1992) %	◆ 68,9(+)	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ n.d.	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ *4,3(-)	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 179,5(+)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992) %	◆ 73,1(+)	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992) %	◆ *8,3(+)	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992) %	◆ 9,4	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ n.d.	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 6,1	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 2,0	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ n.d.	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 4 579	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 5,7	[8,2]
Tumeurs	◆ 14,6	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 8,7	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 5,7	[6,9]
Appareil digestif	◆ 4,0	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 5,8	[5,8]
Traumatismes	◆ 5,6	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)		
Coqueluche p. 100 000	◆ 0,0	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992) %	◆ 51,1(+)	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1992) %	◆ 51,8	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1992) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 4,0	[10,0]
Maux de tête	◆ 7,7	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 4,7	[7,9]
Maux de dos	◆ 4,3	[7,7]
Troubles mentaux	◆ 3,2	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foies et cutanées)	◆ 5,3	[6,5]
Hypertension	◆ 5,2	[6,3]
Rhume des foies	◆ **0,1	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ **0,9	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ *1,9	[4,1]

État de santé objectif**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ *0,6(-)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 766	[711]
41. Taux d'incidence des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 3 037,5(+)	[109,0]
Coqueluche	◆ 0,0	[60,9]
Campylobactériose	◆ 0,0	[33,4]
Scarlatine	◆ 0,0	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ 0,0	[16,8]
Salmonellose	◆ **11,3	[16,6]
Infection gonococcique	◆ 646,0(+)	[10,3]
Giardiase	◆ **11,3	[9,8]
Sida	◆ 0,0	[5,7]
Tuberculose	◆ **56,7	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 250,3	[100,1]
Tumeurs	◆ 8,1	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 21,7	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 53,0	[10,6]
Appareil digestif	◆ 28,9	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 12,4	[7,6]
Traumatismes	◆ 21,9	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ *490	[391]
Côlon-rectum	◆ **62	[53]
Poumon	◆ **177	[70]
Sein chez la femme	◆ **95	[93]
Prostate	◆ 0	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 63,6(-)	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances vivantes	◆ *32,4(+)	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances	◆ *16,7(+)	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 1 454(+)	[691]
Tumeurs	◆ **322	[209]
Appareil circulatoire	◆ *415	[261]
Appareil respiratoire	◆ **329	[56]
Traumatismes	◆ *274(+)	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ **73,1	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ 57,7	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 22 001(+)	[6 523]
Tumeurs	◆ 2 931(+)	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 3 264(+)	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ 2 041(+)	[221]
Traumatismes	◆ 9 382(+)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ n.d.	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ n.d.	[2]
Blessures graves %	◆ n.d.	[13]
Blessures légères %	◆ n.d.	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 14	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992) %	◆ *1,4(-)	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,02(-)	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ n.d.	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 1 123,9	[824,8]
Tumeurs	◆ 58,9	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 66,9	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 227,9	[74,0]
Appareil digestif	◆ 100,8	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 53,8	[45,3]
Traumatismes	◆ 113,2	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ *3,9(-)	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ 0,0	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992) %	◆ **1,7	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ n.d.	[28,4]

Notes :

1. La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
- * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
- ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
- n.a. Non applicable.
- n.d. Non disponible.
- [] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec. Pour certains indicateurs, l'année de référence de l'ensemble du Québec diffère de celle de la région : 1987 pour les indicateurs 37 et 38; 1992-1993 pour les indicateurs 18, 25, 28, 29, 36, 53 et 59.

18 RÉGION DES TERRES-CRIES-DE-LA-BAIE-JAMES

Déterminants de la santé

En 1991, 8 725 personnes habitaient la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James. Entre 1976 et 1986, la population des Terres-Cries-de-la-Baie-James s'est accrue de façon importante; toutefois, au cours de la période 1986-1991, les données montrent une légère décroissance.

Comparativement à l'ensemble du Québec, la population des Terres-Cries-de-la-Baie-James est jeune. De plus, l'indice synthétique de fécondité est très élevé dans la région. Le nombre moyen d'enfants par femme est de 3,5 comparativement à 1,7 pour le Québec. Dans la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James, on dénombre aussi peu de familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans et à peine 3 % de la population de 15 ans et plus vit seule.

Les Terres-Cries-de-la-Baie-James connaissent une situation socioéconomique précaire. La population est peu scolarisée (45 % n'ont pas atteint la dixième année), la proportion de personnes inoccupées dépasse les 55 % et tout près de 20 % de la population est en chômage.

Pour ce qui est des comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, deux tendances ressortent. Tout d'abord, le tabagisme, l'excès de poids et les grossesses à l'adolescence sont tous des problèmes importants chez les Cris. De plus, la proportion de femmes de la région à recourir au test de Pap est moins grande que celle de l'ensemble du Québec. Dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James, on retrouve toutefois moins de naissances de faible poids et une plus faible proportion de personnes insatisfaites de leur vie sociale.

Par ailleurs, mentionnons que comparativement à la moyenne québécoise, les dépenses consacrées au domaine de la santé et des services sociaux sont deux fois plus importantes dans la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

État de santé

La proportion de la population à ne pas se percevoir en bonne santé est plus grande dans les Terres-Cries-de-la-Baie-James qu'au Québec. De plus, comparativement à l'ensemble du Québec, l'espérance de vie à la naissance de la population cri est significativement plus faible. Enfin, les taux d'intoxication, d'hospitalisation, d'années potentielles de vie perdues et d'incidence de la chlamydie sont tous significativement plus élevés dans la région.

Conséquences des problèmes de santé

La proportion de personnes ayant une incapacité à long terme est significativement moins grande et la proportion de personnes ayant consommé trois classes de médicaments ou plus est significativement plus faible dans la région que dans l'ensemble du Québec. Par contre, le taux des journées d'hospitalisation et le taux de césarienne sont particulièrement élevés dans la région des Terres-Cries-de-la-Baie-James.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

Environnement	Région	Québec
Physique et écologie		
1. Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	◆ 0,0	[66,7]
2. Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	◆ n.a.	[76,6]
3. Taux de véhicules automobiles (1995) %	◆ n.d.	[42,7]
Social		
Démographique		
4. Population (1991)	◆ 8 725	[7 081 233]
0-14 ans %	◆ 35,0	[19,8]
15-64 ans %	◆ 60,2	[69,2]
65 ans et plus %	◆ 4,7	[11,0]
5. Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	◆ -0,8	[5,2]
6. Indice synthétique de fécondité (1990-92) enfants par femme	◆ 3,50	[1,65]
Sociodémographique		
7. Population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	◆ 92,5	[5,4]
8. Immigrants (1991) %	◆ n.d.	[8,7]
9. Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	◆ 12,7	[17,9]
10. Population vivant seule (1991) %	◆ 2,6	[12,1]
11. Population ayant déménagé (1991) %	◆ 32,6	[43,6]
Socioéconomique		
12. Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	◆ 44,5	[20,1]

13. Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ¹ (1990-92) %	◆ 65,8(+)	[15,1]
14. Population inoccupée (1991) %	◆ 57,0	[42,7]
15. Taux de chômage (1991) %	◆ 19,3	[12,1]
16. Pop. sous le seuil de faible revenu (1990) %	◆ 16,6	[19,2]
17. Assistés sociaux (1996) %	◆ 9,9	[12,5]

Comportements, habitudes de vie et facteurs de risque

18. Fumeurs réguliers ¹ (1991) %	◆ 41,7(+)	[30,4]
19. Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[6,4]
20. Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[68,9]
21. Population présentant un excès de poids ¹ (1991) %	◆ 60,6(+)	[24,7]
22. Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995) %	◆ n.d.	[90,2]
23. Naissances de faible poids ¹ (1990-92) %	◆ *1,2(-)	[5,9]
24. Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-94) p. 1 000	◆ 174,2(+)	[35,8]
25. Femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1991) %	◆ 44,6(-)	[66,2]
26. Femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-93) %	◆ n.d.	[42,8]
27. Population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1991) %	◆ 25,2	[26,3]
28. Population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1991) %	◆ *3,3	[3,9]
29. Population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1991) %	◆ 4,3(-)	[11,4]
30. Taux de crimes contre la personne ¹ (1995) p. 100 000	◆ n.d.	[670,5]

Organisation des soins

31. Lits de courte durée (1994) p. 1 000	◆ 2,9	[4,0]
Lits et places de longue durée (1994) p. 1 000	◆ 0,8	[8,1]
32. Nombre d'habitants par médecin (1994)	◆ n.d.	[505]
33. Dépenses per capita (1994-95) \$ courants	◆ 4 413	[2 028]
34. Durée moyenne d'hospitalisation (1993-95) jours		
Total	◆ 6,5	[8,2]
Tumeurs	◆ 13,5	[12,8]
Appareil circulatoire	◆ 9,6	[11,4]
Appareil respiratoire	◆ 4,9	[6,9]
Appareil digestif	◆ 5,3	[6,7]
Organes génito-urinaires	◆ 5,5	[5,8]
Traumatismes	◆ 6,3	[9,9]
35. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994) Coqueluche p. 100 000	◆ **23,4	[60,9]

ÉTAT DE SANTÉ**État de santé subjectif**

36. Population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1991) %	◆ 23,1(+)	[10,7]
37. Population ayant au moins un problème de santé ¹ (1991) %	◆ 43,9	[54,5]
38. Principaux problèmes de santé ¹ (1991) %		
Arthrite ou rhumatisme	◆ 6,3	[10,0]
Maux de tête	◆ 6,6	[8,4]
Allergies cutanées et affections de la peau	◆ 4,1	[7,9]
Maux de dos	◆ 5,0	[7,7]
Troubles mentaux	◆ *1,9	[7,4]
Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	◆ 6,5	[6,5]
Hypertension	◆ 4,5	[6,3]
Rhume des foins	◆ *1,1	[6,0]
Lésions (accidents et blessures)	◆ *2,5	[5,0]
Maladies cardiaques	◆ *2,3	[4,1]

État de santé objectivé**Morbidité extra-hospitalière**

39. Taux de lésions professionnelles ¹ (1993) %	◆ *1,2(-)	[4,0]
40. Taux d'intoxication (1995) p. 100 000	◆ 1 451(+)	[711]
41. Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire ¹ (1994) p. 100 000		
Chlamydie	◆ 1 206,7(+)	[109,0]
Coqueluche	◆ **23,4	[60,9]
Campylobactériose	◆ **11,7	[33,4]
Scarlatine	◆ 0,0	[17,9]
Hépatite B porteur	◆ 0,0	[16,8]
Salmonellose	◆ **35,1	[16,6]
Infection gonococcique	◆ *117,2(+)	[10,3]
Giardiase	◆ 0,0	[9,8]
Sida	◆ 0,0	[5,7]
Tuberculose	◆ **35,1	[5,0]

Morbidité hospitalière

42. Taux d'hospitalisation (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 212,8	[100,1]
Tumeurs	◆ 8,2	[8,3]
Appareil circulatoire	◆ 17,2	[14,6]
Appareil respiratoire	◆ 35,4	[10,6]
Appareil digestif	◆ 25,3	[12,6]
Organes génito-urinaires	◆ 12,1	[7,6]
Traumatismes	◆ 15,9	[8,0]

43. Taux d'incidence du cancer ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ *308	[391]
Côlon-rectum	◆ **59	[53]
Poumon	◆ **29	[70]
Sein chez la femme	◆ **115	[93]
Prostate	◆ **43	[92]

Mortalité

44. Espérance de vie ¹ (1990-92) ans	◆ 73,3(-)	[77,3]
45. Taux de mortalité infantile ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances vivantes	◆ *10,8	[5,9]
46. Taux de mortalité périnatale ¹ (1990-92) p. 1 000 naissances	◆ **3,6	[7,7]
47. Taux de mortalité ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 855	[691]
Tumeurs	◆ **199	[209]
Appareil circulatoire	◆ *269	[261]
Appareil respiratoire	◆ **140	[56]
Traumatismes	◆ *129	[49]
48. Taux de mortalité par suicide ¹ (1990-92) p. 100 000	◆ **26,0	[16,3]
49. Espérance de vie en bonne santé (1992-93) ans	◆ n.d.	[66,8]
50. Taux des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-92) p. 100 000		
Total	◆ 10 746(+)	[6 523]
Tumeurs	◆ 1 127(-)	[1 922]
Appareil circulatoire	◆ 1 993(+)	[1 270]
Appareil respiratoire	◆ *582(+)	[221]
Traumatismes	◆ 5 486(+)	[1 589]
51. Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers (1992-94)		
Total moyenne annuelle	◆ n.d.	[50 615]
Blessures mortelles %	◆ n.d.	[2]
Blessures graves %	◆ n.d.	[13]
Blessures légères %	◆ n.d.	[85]

CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ**Incapacité**

52. Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993) jours	◆ 55	[41]
53. Population ayant une incapacité à long terme ¹ (1991) %	◆ 4,7(-)	[7,2]
54. Enfants handicapés ¹ (1995) %	◆ 1,08	[1,39]

Utilisation des services

55. Taux de consultations médicales (1994) %	◆ n.d.	[81,4]
56. Taux des journées d'hospitalisation selon le diagnostic (1993-95) p. 1 000		
Total	◆ 1 187,2	[824,8]
Tumeurs	◆ 65,5	[110,5]
Appareil circulatoire	◆ 76,0	[174,1]
Appareil respiratoire	◆ 158,9	[74,0]
Appareil digestif	◆ 103,4	[86,2]
Organes génito-urinaires	◆ 53,4	[45,3]
Traumatismes	◆ 95,5	[79,8]
57. Taux de césarienne ¹ (1993-95) % accouchements	◆ 28,5(+)	[22,7]
58. Taux de pontages coronariens ¹ (1993-95) p. 100 000	◆ **5,9	[61,1]

Consommation de médicaments

59. Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1991) %	◆ *2,5(-)	[8,7]
60. Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994) ordonnances	◆ n.d.	[28,4]

- Notes :
- La différence avec l'ensemble du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 - Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
n.a. Non applicable.
n.d. Non disponible.
[] Les données présentées à l'intérieur des crochets se rapportent à l'ensemble du Québec. Pour certains indicateurs, l'année de référence de l'ensemble du Québec diffère de celle de la région : 1987 pour les indicateurs 37 et 38; 1992-1993 pour les indicateurs 18, 21, 25, 27, 28, 29, 36, 53 et 59.

PARTIE **4**

TABLEAU DE BORD

LE QUÉBEC ET LES 18 RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES • DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ :

A) ENVIRONNEMENT

		ENSEMBLE DU QUÉBEC	01 BAS-SAINT-LAURENT	02 SAGUENAY— LAC-SAINT-JEAN	03 QUÉBEC	04 MAURICIE— BOIS-FRANCS	05 ESTRIE	06 MONTREAL-CENTRE	07 OUTAOUAIS	08 ABITIBI- TEMISCAMINGUE	09 CÔTE-NORD
ENVIRONNEMENT											
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET ÉCOLOGIE											
1	Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995) %	66,7	36,8	78,9	89,3	87,4	74,0	60,9	66,8	53,8	25,3
	Porte-à-porte	48,2	5,3	77,8	67,1	43,3	35,4	51,9	62,4	0,0	0,0
	Apport volontaire	18,5	31,4	1,1	22,2	44,1	38,6	8,9	4,3	53,8	25,3
2	Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994) %	76,6	67,5	67,0	93,1	60,8	95,5	100,0	89,0	48,2	38,8
3	Taux de véhicules automobiles (1995) %	42,7	47,0	43,2	44,5	48,0	46,9	31,7	45,2	45,4	43,2
ENVIRONNEMENT SOCIAL											
DÉMOGRAPHIQUE											
4	Population (1991) N	7 081 233	210 036	293 273	632 815	477 596	275 092	1 822 516	291 556	155 886	105 904
	0-14 ans %	19,8	21,1	23,3	17,7	20,5	20,9	15,7	21,1	23,6	22,7
	15-64 ans %	69,2	66,0	67,9	70,9	67,0	66,7	70,2	70,5	67,8	71,3
	65 ans et plus %	11,0	12,9	8,8	11,4	12,6	12,4	14,0	8,4	8,7	6,0
5	Taux d'accroissement (1986 à 1991) %	5,2	-3,1	-0,3	4,8	2,3	3,7	0,9	10,3	3,2	-1,9
6	Indice synthétique de fécondité ¹ (1990-1992) ent/terme	1,65	1,58	1,70	1,40	1,67	1,73	1,52	1,76	1,86	1,64
	Taux de fécondité ^{1,2} 15-19 ans ‰	17,7	11,9 (-)	12,6 (-)	10,8 (-)	19,3 (+)	20,9 (+)	20,4 (+)	28,5 (+)	28,8 (+)	28,2 (+)
	20-24 ans	79,2	81,1	97,5 (+)	54,5 (-)	92,4 (+)	99,6 (+)	59,8 (-)	94,6 (+)	126,0 (+)	94,8 (+)
	25-29 ans	128,6	131,4	147,8 (+)	113,8 (-)	137,5 (+)	138,7 (+)	99,1 (-)	129,9	140,0 (+)	126,0
	30-34 ans	77,7	71,1 (-)	64,6 (-)	76,1	67,4 (-)	66,8 (-)	83,3 (+)	73,9 (-)	60,8 (-)	62,2 (-)
	35-49 ans	9,8	8,0 (-)	6,5 (-)	8,7 (-)	6,2 (-)	7,5 (-)	14,6 (+)	9,3	6,6 (-)	6,3 (-)
SOCIODÉMOGRAPHIQUE											
7	Proportion de la population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991) %	5,4	0,1	0,2	0,7	0,7	0,8	15,9	2,3	0,6	6,2
8	Proportion d'immigrants (1991) %	8,7	0,5	0,6	2,2	1,2	3,2	23,6	4,6	1,3	1,0
9	Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991) %	17,9	14,2	14,0	18,3	17,0	13,9	24,9	18,2	15,1	15,7
10	Population vivant seule (1991) %	12,1	10,2	8,1	13,4	12,1	12,7	17,6	9,9	10,6	8,1
11	Population ayant déménagé (1991) %	43,6	32,2	35,8	42,3	37,9	42,7	49,6	47,5	43,4	36,5
SOCIOÉCONOMIQUE											
12	Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991) %	20,1	25,5	19,2	16,6	24,1	22,1	19,5	18,3	24,9	23,2
13	Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ^{1,2} (1990-1992) %	15,1	16,3 (+)	13,2 (-)	9,3 (-)	15,3	14,3 (-)	17,5 (+)	18,2 (+)	20,2 (+)	27,2 (+)
14	Population inoccupée (1991) %	42,7	49,9	48,7	40,9	46,7	43,3	44,5	37,5	46,8	45,6
15	Taux de chômage (1991) %	12,1	16,1	15,5	9,9	12,7	11,1	13,2	9,9	17,4	17,3
16	Population sous le seuil de faible revenu (1990) %	19,2	18,1	15,7	19,2	18,2	17,8	27,8	16,5	15,0	15,3
17	Proportion d'assistés sociaux (1996) %	12,5	13,0	12,2	11,0	13,4	12,7	17,5	12,6	10,8	10,5

1. Les valeurs obtenues pour l'Outaouais représentent des estimations.

2. La différence avec le Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

n.d. Non disponible.

Symboles : % = pour 100; ‰ = pour 1 000; N = nombre.

LE QUÉBEC ET LES 18 RÉGIONS SOCIOSANITAIRES • DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ :

A) ENVIRONNEMENT

10	11	12	13	14	15	16	17	18			
NORD-DU-QUÉBEC	GASPÉSIE—ÎLES-DE-LA-MADELINE	CHAUDIÈRE-APPALACHES	LAVAL	LANAUDIÈRE	LAURENTIDES	MONTRÉGIE	NUNAVIK	TERRES-CRIS-DE-LA-BAIE-JAMES	ENSEMBLE DU QUÉBEC		
ENVIRONNEMENT											
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET ÉCOLOGIE											
0,0	58,8	58,4	27,3	68,1	79,9	72,0	0,0	0,0	66,7	% Population desservie par des équipements de collecte sélective (1995)	1
0,0	8,3	52,5	15,4	53,1	17,6	65,6	0,0	0,0	48,2	Porte-à-porte	
0,0	50,5	5,9	11,9	15,0	62,3	0,0	0,0	0,0	18,5	Apport volontaire	
78,9	37,6	77,4	19,0	17,4	35,8	81,5	n.a.	n.a.	76,6	% Population desservie par des installations d'épuration des eaux usées (1994)	2
n.d.	47,6	48,4	45,0	46,9	48,9	45,9	n.d.	n.d.	42,7	% Taux de véhicules automobiles (1995)	3
ENVIRONNEMENT SOCIAL											
DÉMOGRAPHIQUE											
20 778	108 507	377 051	322 444	344 052	391 195	1 236 013	7 794	8 725	7 081 233	N Population (1991)	4
27,7	20,4	22,4	19,8	23,1	21,9	21,5	39,5	35,0	19,8	% 0-14 ans	
69,8	67,8	66,6	71,3	68,5	68,8	69,3	58,4	60,2	69,2	% 15-64 ans	
2,5	11,8	10,9	9,0	8,4	9,3	9,2	2,1	4,7	11,0	% 65 ans et plus	
-7,7	-6,3	2,8	10,1	19,9	18,5	9,6	33,0	-0,8	5,2	% Taux d'accroissement (1986 à 1991)	5
1,86	1,59	1,74	1,69	1,93	1,89	1,77	3,92	3,50	1,65	^{ent./} _{terme} Indice synthétique de fécondité ¹ (1990-1992)	6
19,8	17,1	9,3 (-)	11,3 (-)	16,7	17,6	15,5 (-)	194,1 (+)	142,5 (+)	17,7	% Taux de fécondité ^{1,2} 15-19 ans	
144,4 (+)	88,7 (+)	80,2	68,7 (-)	107,4 (+)	107,9 (+)	87,1 (+)	239,6 (+)	215,7 (+)	79,2	20-24 ans	
139,5	132,3	153,9 (+)	139,0 (+)	161,5 (+)	153,1 (+)	145,4 (+)	192,8 (+)	179,0 (+)	128,6	25-29 ans	
53,5 (-)	62,8 (-)	82,0 (+)	89,7 (+)	79,8	77,4	81,7 (+)	94,9	121,1 (+)	77,7	30-34 ans	
5,7 (-)	6,6 (-)	8,1 (-)	10,3	7,8 (-)	8,4 (-)	8,8 (-)	*24,8 (+)	*13,6	9,8	35-49 ans	
SOCIODÉMOGRAPHIQUE											
1,2	0,4	0,1	9,1	0,8	0,9	2,2	83,5	92,5	5,4	% Proportion de la population dont la langue parlée à la maison n'est ni le français ni l'anglais (1991)	7
0,9	0,3	0,9	13,4	2,0	3,1	5,9	1,2	n.d.	8,7	% Proportion d'immigrants (1991)	8
9,5	14,3	12,4	16,3	13,5	15,8	16,1	24,3	12,7	17,9	% Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (1991)	9
7,5	7,4	9,1	8,5	7,7	9,3	9,4	7,5	2,6	12,1	% Population vivant seule (1991)	10
43,2	24,6	30,5	44,8	45,1	48,1	44,6	64,2	32,6	43,6	% Population ayant déménagé (1991)	11
SOCIOÉCONOMIQUE											
18,3	31,4	25,0	16,3	20,6	20,0	18,1	41,7	44,5	20,1	% Population ayant moins de neuf ans de scolarité (1991)	12
19,7 (+)	24,5 (+)	13,8 (-)	9,9 (-)	13,7 (-)	13,5 (-)	12,9 (-)	59,1 (+)	65,8 (+)	15,1	% Naissances vivantes de mères faiblement scolarisées ^{1,2} (1990-1992)	13
39,3	56,6	41,6	37,7	40,5	41,1	38,6	48,9	57,0	42,7	% Population inoccupée (1991)	14
13,5	25,1	9,3	10,1	10,9	12,2	10,3	14,7	19,3	12,1	% Taux de chômage (1991)	15
9,7	19,5	14,1	16,2	14,5	15,9	14,6	16,8	16,6	19,2	% Population sous le seuil de faible revenu (1990)	16
6,1	19,1	8,1	8,2	10,5	11,2	9,0	19,8	9,9	12,5	% Proportion d'assistés sociaux (1996)	17

1. Les valeurs obtenues pour l'Outaouais représentent des estimations.

2. La différence avec le Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.

Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.

n.d. Non disponible.

n.a. Non applicable.

Symboles : % = pour 100; ‰ = pour 1 000; N = nombre.

LE QUÉBEC ET LES 18 RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES • DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ :

B) COMPORTEMENTS, HABITUDES DE VIE ET FACTEURS DE RISQUE et ORGANISATION DES SOINS

		ENSEMBLE DU QUÉBEC	01 BAS-SAINT-LAURENT	02 SAGUENAY— LAC-SAINTE-JEAN	03 QUÉBEC	04 MAURICIE— BOIS-FRANCS	05 ESTRIE	06 MONTREAL-CENTRE	07 OUTAOUAIS	08 ABITIBI- TEMISCAMINGUE	09 COTE-NORD	
COMPORTEMENTS, HABITUDES DE VIE ET FACTEURS DE RISQUE												
18	Proportion de fumeurs réguliers ¹ (1992-1993) ²	%	30,4	30,0	32,2	27,2	31,7	30,5	28,6	34,5	33,9	35,5 (+)
19	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-1993)	%	6,4	6,8	8,2	7,3	6,0	6,7	5,8	6,7	6,8	7,9
20	Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-1993)	%	68,9	72,7 (+)	70,4	65,8	71,8	68,4	68,1	63,9 (-)	67,4	63,8 (-)
21	Population présentant un excès de poids ¹ (1992-1993) ²	%	24,7	23,6	23,7	21,5	25,3	24,6	23,3	29,4 (+)	28,1	28,1
22	Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995)	%	90,2	86,5 (-)	83,2 (-)	90,4	92,4 (+)	86,7 (-)	90,4	94,6 (+)	87,3 (-)	89,0
	Passagers avant de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995)	%	87,8	86,2	82,5 (-)	90,0	89,8	84,8 (-)	88,3	91,3 (+)	84,5 (-)	86,8
23	Proportion de naissances de faible poids ^{1,3} (1990-1992)	%	5,9	5,5	5,7	5,4 (-)	6,1	5,3 (-)	6,2 (+)	6,5 (+)	6,0	5,9
24	Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-1994)	‰	35,8	21,9 (-)	29,4 (-)	26,9 (-)	31,0 (-)	36,8	48,6 (+)	42,1 (+)	42,1 (+)	40,9 (+)
	Moins de 18 ans		19,4	11,4 (-)	14,6 (-)	14,9 (-)	16,7 (-)	20,1	27,4 (+)	22,1 (+)	20,8	24,4 (+)
	18-19 ans		69,2	45,3 (-)	63,0 (-)	50,1 (-)	62,6 (-)	71,4	87,0 (+)	81,5 (+)	88,2 (+)	73,6
25	Proportion de femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-1993) ²	%	66,2	63,4	64,3	66,5	63,3	67,2	64,0	74,3 (+)	72,0 (+)	70,7
26	Proportion de femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-1993)	%	42,8	38,7	39,9	39,4	32,4 (-)	41,6	44,0	48,3	48,4	56,1 (+)
	Femmes de 50-69 ans		49,4	48,5	46,1	41,3	37,4 (-)	48,3	50,8	53,3	56,3	62,4 (+)
27	Proportion de la population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-1993) ²	%	26,3	24,6	24,8	26,4	26,8	24,8	26,9	26,5	30,5 (+)	25,5
28	Proportion de la population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-1993) ²	%	3,9	*3,8	*4,0	*4,2	*4,3	5,6	*3,5	*3,8	5,2	*3,6
29	Proportion de la population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-1993) ²	%	11,4	10,3	8,3 (-)	12,4	10,3	10,8	13,2 (+)	12,4	10,9	11,1
30	Taux de crimes contre la personne ¹ (1995)	‰	670,5	441,5 (-)	520,2 (-)	597,7 (-)	429,7 (-)	388,3 (-)	1164,9 (+)	696,6	598,6 (-)	618,0 (-)
	Homicides		1,9	**2,4	**0,3	**1,2	**1,4	**0,4	3,3 (+)	**1,3	**3,2	0,0
	Voies de fait : agressions sexuelles		45,2	45,2	42,0	46,1	31,7 (-)	32,7 (-)	55,4 (+)	72,0 (+)	73,3 (+)	50,5
	Voies de fait : autres agressions		478,0	348,1 (-)	437,3 (-)	426,9 (-)	338,2 (-)	298,3 (-)	759,4 (+)	546,6 (+)	468,3	532,1 (+)
	Vois qualifiés		126,5	27,7 (-)	28,6 (-)	110,0 (-)	41,7 (-)	44,1 (-)	327,3 (+)	59,2 (-)	32,2 (-)	**12,4 (-)
	Autres infractions		18,9	18,0	*12,1 (-)	13,5 (-)	16,7	*12,8 (-)	19,5	17,6	*21,5	*22,9
ORGANISATION DES SOINS												
31	Taux de lits de courte durée (1994)	‰	4,0	4,7	4,9	5,9	3,5	4,3	6,3	3,2	3,6	4,4
	Taux de lits et places de longue durée (1994)		8,1	12,5	6,3	9,4	9,5	9,4	11,0	4,9	6,9	3,9
32	Habitants par professionnel de la santé (1994)	N										
	Médecin		505	553	623	364	695	436	324	621	611	565
	Omni-praticien et résident		1 017	949	1 134	850	1 230	874	875	997	1 005	791
	Spécialiste		1 003	1 326	1 381	636	1 599	871	515	1 643	1 562	1 984
	Dentiste		1 867	2 687	2 174	1 703	2 341	2 237	1 289	2 603	2 354	2 922
	Optométriste		6 688	5 444	6 776	7 924	6 212	6 354	6 408	7 492	6 572	5 536
33	Dépenses per capita consacrées au domaine de la santé et des services sociaux (1994-1995)	\$ courants	2 028	2 101	1 815	2 577	1 708	2 062	2 843	1 478	1 996	2 062
34	Durée moyenne d'hospitalisation (1993-1995)	jours	8,2	8,1	8,3	9,2	8,3	8,3	8,9	7,4	7,0	7,4
	Tumeurs		12,8	12,4	13,4	14,5	13,1	12,0	13,7	12,0	12,3	11,7
	Appareil circulatoire		11,4	10,4	11,6	11,8	11,7	11,7	12,3	11,8	10,0	10,0
	Appareil respiratoire		6,9	6,7	6,8	8,1	6,9	7,0	8,1	6,2	6,1	6,0
	Appareil digestif		6,7	6,3	6,7	7,0	6,5	6,9	7,6	5,9	5,7	6,0
	Organes génito-urinaires		5,8	6,2	6,4	6,5	5,6	5,7	6,2	4,9	5,3	6,0
	Traumatismes		9,9	9,6	9,7	11,2	11,1	11,0	10,8	8,8	8,3	8,0
35	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)	‰										
	Coqueluche		60,9	66,7	39,8 (-)	76,0 (+)	86,5 (+)	57,6	29,4 (-)	43,6 (-)	74,8 (+)	237,7 (+)
	Hépatite B aigüe		4,8	**1,0	**0,7	6,5	*2,1 (-)	**2,9	8,0 (+)	**2,9	**0,6	0,0
	Rougeole		1,8	0,0	0,0	**0,5	**0,2	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
	Infection à méningocoque		1,3	**1,9	**1,0	**1,4	**0,6	**1,8	*1,4	**2,0	**2,5	**3,8
	Oreillons		1,1	**0,5	**1,4	*1,7	**0,8	**2,5	*1,0	**1,3	0,0	0,0
	Rubéole		0,9	0,0	**0,3	*1,7	0,0	**0,4	**0,4	*3,3 (+)	**0,6	**1,0
	<i>Hæmophilus influenzae</i> (toutes formes)		*0,4	**0,5	**0,7	*0,2	**0,4	**0,4	**0,2	**0,7	**0,6	0,0

1. La différence avec le Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.

2. L'année de référence est différente pour les régions Nunavik (1992) et Terres-Cries-de-la-Baie-James (1991).

3. Les valeurs obtenues pour l'Outaouais représentent des estimations.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec (régions 06 et 16 comparées au reste du Québec aux numéros 18 à 21 et 25 à 29).

n.d. Non disponible.

Symboles : % = pour 100, ‰ = pour 1 000, ‰‰ = pour 100 000; N = nombre.

LE QUÉBEC ET LES 18 RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES • DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ :

B) COMPORTEMENTS, HABITUDES DE VIE ET FACTEURS DE RISQUE ET ORGANISATION DES SOINS

10	11	12	13	14	15	16	17	18				
NORD-DU QUÉBEC	GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE	CHAUDIÈRE-APPALACHES	LAVAL	LANAUDIÈRE	LAURENTIDES	MONTÉRÉGIE	NUUNAVIK	TERRES-CRIES-DE-LA-BAIE-JAMES	ENSEMBLE DU QUÉBEC			
COMPORTEMENTS, HABITUDES DE VIE ET FACTEURS DE RISQUE												
n.d.	32,3	27,7	30,2	36,2 (+)	34,7 (+)	29,9	68,9 (+)	41,7 (+)	30,4	%	Proportion de tumeurs régulières ¹ (1992-1993) ²	18
n.d.	6,1	5,9	7,8	8,8 (+)	7,8	5,0 (-)	n.d.	n.d.	6,4	%	Population prenant 14 consommations d'alcool et plus par semaine ¹ (1992-1993)	19
n.d.	70,9	72,1	72,0	67,2	66,7	71,0	n.d.	n.d.	68,9	%	Population n'ayant jamais consommé de drogues illicites ¹ (1992-1993)	20
n.d.	31,5 (+)	23,6	27,0	22,9	23,5	27,1	n.d.	60,6 (+)	24,7	%	Population présentant un excès de poids ¹ (1992-1993) ²	21
n.d.	92,8 (+)	87,9 (-)	90,2	92,9 (+)	89,2	90,8	n.d.	n.d.	90,2	%	Conducteurs de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995)	22
n.d.	89,7	87,6	87,4	90,5 (+)	87,0	86,1	n.d.	n.d.	87,8	%	Passagers avant de véhicules automobiles utilisant un dispositif de retenue ¹ (1995)	22
5,1	5,5	5,5	5,6	5,6	6,1	5,8	*4,3 (-)	*1,2 (-)	5,9	%	Proportion de naissances de faible poids ^{1,3} (1990-1992)	23
20,6 (-)	32,3	19,3 (-)	32,7 (-)	32,2 (-)	35,9	33,1 (-)	179,5 (+)	174,2 (+)	35,8	‰	Taux de grossesses à l'adolescence ¹ (1993-1994)	24
*11,1 (-)	17,9	10,2 (-)	16,6 (-)	16,9 (-)	18,2	18,5	138,1 (+)	103,5 (+)	19,4	%	Moins de 18 ans	24
*40,3 (-)	60,7	39,3 (-)	65,6	66,1	74,0	64,2 (-)	261,1 (+)	305,4 (+)	69,2	%	18-19 ans	24
n.d.	67,1	64,8	66,6	71,0	67,8	66,5	73,1 (+)	44,6 (-)	66,2	%	Proportion de femmes ayant subi un test de Pap ¹ (1992-1993) ²	25
n.d.	50,8	42,8	45,1	47,0	43,2	43,7	n.d.	n.d.	42,8	%	Proportion de femmes de 50 ans et plus ayant subi une mammographie ¹ (1992-1993)	26
n.d.	61,8 (+)	53,5	51,5	57,0	50,8	50,0	n.d.	n.d.	49,4	%	Femmes de 50-69 ans	26
n.d.	25,2	26,5	26,6	25,5	28,2	25,3	n.d.	25,2	26,3	%	Proportion de la population présentant un niveau élevé de détresse psychologique ¹ (1992-1993) ²	27
n.d.	*3,7	*3,9	*2,9	*4,1	*4,3	*4,1	*8,3 (+)	*3,3	3,9	%	Proportion de la population présentant des idées suicidaires sérieuses ¹ (1992-1993) ²	28
n.d.	9,2	11,8	10,8	8,1 (-)	12,4	10,3	9,4	4,3 (-)	11,4	%	Proportion de la population insatisfaite de sa vie sociale ¹ (1992-1993) ²	29
n.d.	473,5 (-)	306,6 (-)	460,5 (-)	499,6 (-)	513,1 (-)	476,9 (-)	n.d.	n.d.	670,5	‰	Taux de crimes contre la personne ¹ (1995)	30
n.d.	**2,9	**1,3	**1,5	**0,5	**0,9	*1,8	n.d.	n.d.	1,9	%	Homicides	30
n.d.	*29,5 (-)	23,4 (-)	34,2 (-)	34,7 (-)	48,1	36,1 (-)	n.d.	n.d.	45,2	%	Voies de fait : agressions sexuelles	30
n.d.	404,0 (-)	247,8 (-)	293,5 (-)	391,4 (-)	388,4 (-)	351,0 (-)	n.d.	n.d.	478,0	%	Voies de fait : autres agressions	30
n.d.	*19,1 (-)	18,0 (-)	117,1	50,0 (-)	53,9 (-)	67,5 (-)	n.d.	n.d.	126,5	%	Vols qualifiés	30
n.d.	*18,1	16,1	14,3 (-)	22,9	21,8	20,6	n.d.	n.d.	18,9	%	Autres infractions	30
ORGANISATION DES SOINS												
4,8	4,9	2,7	1,3	1,8	2,0	2,0	6,1	2,9	4,0	‰	Taux de lits de courte durée (1994)	31
0,7	8,7	9,4	4,5	6,5	5,5	5,2	2,0	0,8	8,1	‰	Taux de lits et places de longue durée (1994)	31
n.d.	532	668	828	913	831	772	n.d.	n.d.	505	N	Habitants par professionnel de la santé (1994)	32
n.d.	710	1 015	1 284	1 371	1 192	1 259	n.d.	n.d.	1 017		Médecin	32
n.d.	2 117	1 953	2 329	2 731	2 745	1 994	n.d.	n.d.	1 003		Omnipraticien et résident	32
n.d.	2 714	2 695	1 759	2 476	2 149	2 166	n.d.	n.d.	1 867		Spécialiste	32
n.d.	7 561	8 699	5 822	7 738	5 828	6 642	n.d.	n.d.	6 688		Dentiste	32
n.d.											Optométriste	32
1 662	2 285	1 478	1 211	1 078	1 210	1 098	4 579	4 413	2 028	\$ courants	Dépenses per capita consacrées au domaine de la santé et des services sociaux (1994-1995)	33
5,2	8,0	8,2	7,4	7,4	7,3	7,6	5,7	6,5	8,2	jours	Durée moyenne d'hospitalisation (1993-1995)	34
11,6	12,2	13,2	11,4	11,7	12,0	12,0	14,6	13,5	12,8	%	Tumeurs	34
8,4	11,6	11,3	10,4	9,9	10,7	10,8	8,7	9,6	11,4	%	Appareil circulatoire	34
4,0	6,4	6,3	6,3	6,6	6,1	6,0	5,7	4,9	6,9	%	Appareil respiratoire	34
4,4	6,1	6,1	6,1	6,8	5,8	6,6	4,0	5,3	6,7	%	Appareil digestif	34
4,6	5,2	6,0	5,5	5,6	5,3	5,6	5,8	5,5	5,8	%	Organes génito-urinaires	34
5,5	8,6	10,0	8,3	9,3	8,4	9,4	5,6	6,3	9,9	%	Traumatismes	34
n.d.										‰	Taux d'incidence des maladies à déclaration obligatoire évitables par la vaccination ¹ (1994)	35
*33,4	*12,3 (-)	58,8	81,7 (+)	141,9 (+)	76,2 (+)	52,5 (-)	0,0	**23,4	60,9	%	Coqueluche	35
*4,9	0,0	**2,1	*6,5	**2,4	*8,0 (+)	3,8	0,0	0,0	4,8	%	Hépatite B aiguë	35
0,0	0,0	14,9 (+)	**0,9	*3,8 (+)	0,0	**0,5	0,0	**11,7	1,8	%	Rougeole	35
*4,9	0,0	**1,0	*0,6	*2,7	**0,9	*0,8	0,0	0,0	1,3	%	Infection à méningocoque	35
0,0	**1,9	**1,3	*0,9	**1,1	**1,4	*1,0	0,0	0,0	1,1	%	Oreillons	35
0,0	**3,8	*0,3	**2,7	**1,9	**0,9	**0,5	0,0	0,0	0,9	%	Rubéole	35
0,0	**1,9	**1,0	*0,6	0,0	0,0	**0,2	**11,3	0,0	*0,4	%	Haemophilus influenzae (toutes formes)	35

1. La différence avec le Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
2. L'année de référence est différente pour les régions Nunavik (1992) et Terres-Cries-de-la-Baie-James (1991).
3. Les valeurs obtenues pour l'Outaouais représentent des estimations.
4. Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
5. Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
- (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec (régions 06 et 16 comparées au reste du Québec aux numéros 18 à 21 et 25 à 29).
- n.d. Non disponible.
- Symboles : % = pour 100; ‰ = pour 1 000; ‰‰ = pour 100 000; N = nombre.

LE QUÉBEC ET LES 18 RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES • ÉTAT DE SANTÉ :

A) ÉTAT DE SANTÉ SUBJECTIF et ÉTAT DE SANTÉ OBJECTIVÉ (Morbidité)

			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
		ENSEMBLE DU QUÉBEC	BAS-SAINT-LAURENT	SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN	QUÉBEC	MAURICIE—BOIS-FRANCS	ESTRIE	MONTREAL-CENTRE	OUTAOUAIS	ABITIBI-TEMISCAMINGUE	CÔTE-NORD	
ÉTAT DE SANTÉ SUBJECTIF												
36	Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-1993) ²	%	10,7	11,6	11,0	8,7	10,7	11,2	10,9	10,6	13,1	12,4
37	Proportion de la population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) ^{2,3}	%	54,5	54,6	53,0	51,5 (-)	53,7	50,3 (-)	59,4 (+)	58,9 (+)	49,5 (-)	51,3
	Hommes		49,4	47,3	47,1	44,3 (-)	51,5	46,9	53,8 (+)	54,4 (+)	45,1	45,5
	Femmes		59,4	61,9	59,0	58,2	55,8	53,7 (-)	64,5 (+)	63,3	54,1	57,4
38	Principaux problèmes de santé ¹ (1987) ^{2,3}	%										
	Arthrite ou rhumatisme		10,0	11,0	8,6	7,4 (-)	8,7	9,0	12,8 (+)	12,4	7,4 (-)	8,5
	Maux de tête		8,4	8,7	9,0	7,6	7,1	8,2	10,0 (+)	10,4	9,0	8,2
	Allergies cutanées et affections de la peau		7,9	7,7	8,0	6,1 (-)	8,3	6,4	10,0 (+)	9,8	7,8	8,9
	Maux de dos		7,7	8,1	6,2 (-)	5,9 (-)	6,9	6,5	9,1 (+)	9,0	7,6	6,9
	Troubles mentaux		7,4	8,2	5,5 (-)	7,7	8,1	6,5	9,1 (+)	8,9	5,3 (-)	5,1 (-)
	Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)		6,5	6,0	5,1 (-)	4,4 (-)	5,5	5,6	8,1 (+)	8,8 (+)	4,9	5,9
	Hypertension		6,3	7,3	6,5	5,6	5,2	6,6	7,2	6,9	4,5 (-)	5,0
	Rhume des foins		6,0	4,9	4,5 (-)	*3,6 (-)	5,0	4,8	8,1 (+)	6,4	*2,5 (-)	*2,8 (-)
	Lésions (accidents et blessures)		5,0	4,9	4,4	4,4	5,4	3,8	5,6	6,6 (+)	*4,1	5,3
	Maladies cardiaques		4,1	4,1	4,1	*3,1	3,6	4,4	4,7	4,1	*3,7	*2,7
ÉTAT DE SANTÉ OBJECTIVÉ												
MORBIDITÉ EXTRA-HOSPITALIÈRE												
39	Taux des lésions professionnelles ¹ (1993)	%	4,0	3,8 (-)	3,2 (-)	4,1 (+)	4,3 (+)	4,4 (+)	3,3 (-)	2,5 (-)	3,7 (-)	4,7 (+)
	Secteur primaire		4,4	5,5 (+)	6,4 (+)	3,4 (-)	2,8 (-)	4,2	1,2 (-)	6,1 (+)	6,3 (+)	7,1 (+)
	Secteur manufacturier		7,6	9,1 (+)	4,6 (-)	9,8 (+)	8,8 (+)	8,9 (+)	5,4 (-)	3,5 (-)	3,1 (-)	7,8
	Construction		3,2	2,9	2,5 (-)	4,6 (+)	2,6 (-)	2,8 (-)	2,7 (-)	3,0	3,4	4,5 (+)
	Transport et communication		3,8	2,9 (-)	3,7	5,3 (+)	4,4 (+)	3,1 (-)	3,0 (-)	2,4 (-)	3,9	4,4
	Commerce		3,8	3,3 (-)	3,4 (-)	5,0 (+)	3,2 (-)	3,4 (-)	3,4 (-)	2,9 (-)	3,6	3,9
	Services		2,6	2,4 (-)	2,1 (-)	2,7 (+)	2,5 (-)	2,7	2,4 (-)	1,8 (-)	2,7	3,1 (+)
40	Taux d'intoxication ¹ (1995)	‰	711	601 (-)	669 (-)	774 (+)	592 (-)	656 (-)	604 (-)	575 (-)	674	650 (-)
41	Taux des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994)	‰										
	Chlamydie		109,0	105,4	142,8 (+)	116,8	102,8	106,6	98,7 (-)	123,1 (+)	230,2 (+)	285,2 (+)
	Coqueluche		60,9	66,7	39,8 (-)	76,0 (+)	86,5 (+)	57,6	29,4 (-)	43,6 (-)	74,8 (+)	237,7 (+)
	Campylobactériose		33,4	44,0 (+)	35,4	59,4 (+)	35,9	46,1 (+)	24,0 (-)	46,9 (+)	*15,2 (-)	*20,9 (-)
	Scarlatine		17,9	*12,6 (-)	30,9 (+)	22,4 (+)	35,5 (+)	*9,3 (-)	4,7 (-)	32,2 (+)	41,2 (+)	41,8 (+)
	Hépatite B porteur		16,8	**3,4	**2,4	9,3 (-)	*6,8 (-)	*11,8 (-)	40,9 (+)	*6,8 (-)	**2,5	**5,7
	Salmonellose		16,6	39,2 (+)	12,7	25,1 (+)	13,4	15,7	15,0	*11,4 (-)	*9,5 (-)	*11,4
	Infection gonococcique		10,3	**2,9	*4,1 (-)	8,6	*3,9 (-)	*4,3 (-)	23,9 (+)	24,2 (+)	**3,2	**5,7
	Giardiase		9,8	*8,2	13,4	*5,5 (-)	8,3	16,1 (+)	11,9 (+)	24,4 (+)	*7,0	**2,9
	Sida		5,7	0,0	**1,4	*3,1 (-)	*2,3 (-)	**1,8	16,1 (+)	*3,9	**1,3	**1,0
	Tuberculose		5,0	*5,8	*3,8	*3,7	*2,7 (-)	**1,1	11,4 (+)	**2,9	**1,3	**5,7
MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE												
42	Taux ajusté ⁴ d'hospitalisation ^{1,5} (1993-1995)	‰	100,1	125,5	125,8	96,4	110,4	108,1	89,7	98,6	129,0	159,5
	Tumeurs		8,3	9,6	8,8	7,8	8,3	9,0	8,2	8,4	8,8	11,5
	Appareil circulatoire		14,6	17,1	17,2	15,4	15,9	18,2	11,9	12,8	19,2	25,0
	Appareil respiratoire		10,6	14,8	15,1	10,6	12,7	10,9	8,5	12,4	16,2	20,3
	Appareil digestif		12,6	16,0	16,1	13,0	14,4	13,9	11,1	13,6	16,1	19,6
	Organes génito-urinaires		7,6	9,5	10,0	6,8	8,9	7,8	6,9	8,2	9,7	10,1
	Traumatismes		8,0	12,5	10,8	7,0	9,0	7,8	6,6	8,9	10,9	11,8
43	Taux ajusté ⁴ d'incidence du cancer ^{1,5} (1990-1992)	‰	391	388	421 (+)	384	381	385	394	355	435 (+)	493 (+)
	Côlon-rectum		53	55	55	52	52	53	53	50	57	47
	Poumon		70	71	86 (+)	70	67	68	68	77	93 (+)	108 (+)
	Sein chez la femme		93	106	103	93	84	93	94	87	87	99
	Prostate		92	76 (-)	70 (-)	90	102	99	85	76	97	127

1. La différence avec le Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.

2. L'année de référence est différente pour les régions Nunavik (1992) et Terres-Cries-de-la-Baie-James (1991).

3. La différence entre le Québec et les régions Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James n'a pas été testée puisque les enquêtes sont trop éloignées dans le temps.

4. Ajusté selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 1991.

5. Sous-estimation pour les régions limitrophes, en particulier la région 07, puisque les fichiers ne comprennent que les événements enregistrés au Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec (régions 06 et 16 comparées au reste du Québec aux numéros 36, 37 et 38).

n.d. Non disponible.

Symboles : % = pour 100; ‰ = pour 1 000; ‰‰ = pour 100 000.

LE QUÉBEC ET LES 18 RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES • ÉTAT DE SANTÉ :

A) ÉTAT DE SANTÉ SUBJECTIF et ÉTAT DE SANTÉ OBJECTIVE (Morbidité)

10	11	12	13	14	15	16	17	18				
NORD-DU-QUÉBEC	CASPÉSIE—LES-DE-LA-MADELEINE	CHAUDIÈRE-APPALACHES	LAVAL	LANAUDIÈRE	LAURENTIDES	MONTÉRIÉ	NUNAVIK	TERRES-CRIES-DE-LA-BAIE-JAMES	ENSEMBLE DU QUÉBEC			
ÉTAT DE SANTÉ SUBJECTIF												
n.d.	16,2 (+)	11,7	10,9	9,6	10,2	10,1	51,1 (+)	23,1 (+)	10,7	%	Proportion de la population ne se percevant pas en bonne santé ¹ (1992-1993) ²	36
n.d.	52,8	49,1 (-)	50,7	54,3	57,5	51,7	51,8	43,9	54,5	%	Proportion de la population ayant au moins un problème de santé ¹ (1987) ^{2,3}	37
n.d.	45,9	46,1	48,0	47,0	54,8	46,4	47,0	39,2	49,4		Hommes	
n.d.	59,9	52,1 (-)	53,3	61,6	60,1	56,9	56,9	48,6	59,4		Femmes	
n.d.	9,4	8,9	*8,1	9,6	11,0	8,3	4,0	6,3	10,0	%	Principaux problèmes de santé ¹ (1987) ^{2,3}	38
n.d.	8,1	6,2	*7,0	8,4	8,6	7,4	7,7	6,6	8,4		Arthrite ou rhumatisme	
n.d.	7,9	6,1 (-)	*7,7	7,5	7,6	6,2 (-)	4,7	4,1	7,9		Maux de tête	
n.d.	6,8	6,4	*6,8	8,3	10,2	7,0	4,3	5,0	7,7		Allergies cutanées et affections de la peau	
n.d.	9,1	6,2	**5,0	8,1	6,7	5,8 (-)	3,2	*1,9	7,4		Maux de dos	
n.d.	6,0	*4,5 (-)	**4,1	7,8	6,6	6,6	5,3	6,5	6,5		Troubles mentaux	
n.d.	5,7	*5,3	*5,5	*3,8 (-)	7,9	6,5	5,2	4,5	6,3		Allergies (autres que rhume des foins et cutanées)	
n.d.	*3,2 (-)	*3,7 (-)	*7,2	*6,8	*5,3	6,8	**0,1	*1,1	6,0		Hypertension	
n.d.	5,4	*4,0	**3,9	*5,2	*5,3	4,5	**0,9	*2,5	5,0		Rhume des foins	
n.d.	*3,2	*4,3	**4,1	*4,1	*4,6	3,8	*1,9	*2,3	4,1		Lésions (accidents et blessures)	
											Maladies cardiaques	
ÉTAT DE SANTÉ OBJECTIVE												
MORBIDITÉ EXTRA-HOSPITALIÈRE												
6,0 (+)	3,0 (-)	5,7 (+)	3,8 (-)	5,5 (+)	5,2 (+)	4,3 (+)	*0,6 (-)	*1,2 (-)	4,0	%	Taux des lésions professionnelles ¹ (1993)	39
14,7 (+)	5,7 (+)	4,4	*2,3 (-)	3,0 (-)	5,0 (+)	2,0 (-)	0,0	*4,3	4,4		Secteur primaire	
3,0 (-)	2,7 (-)	14,4 (+)	5,9 (-)	9,5 (+)	9,6 (+)	8,3 (+)	**10,0	0,0	7,6		Secteur manufacturier	
*7,1 (+)	2,7	3,9 (+)	3,2	3,7 (+)	3,6 (+)	3,2	**1,3	**3,6	3,2		Construction	
*3,3	3,0 (-)	4,8 (+)	3,5 (-)	5,7 (+)	4,7 (+)	3,8	0,0	**1,1	3,8		Transport et communication	
4,1	3,3 (-)	4,1 (+)	4,0	5,2 (+)	4,4 (+)	3,9	**0,3	**1,0	3,8		Commerce	
2,4	2,2 (-)	2,6	2,8 (+)	4,2 (+)	3,7 (+)	2,7 (+)	0,7 (-)	0,6 (-)	2,6		Services	
795	509 (-)	628 (-)	552 (-)	753 (+)	789 (+)	612 (-)	766	1 451,0 (+)	711	‰	Taux d'intoxication ¹ (1995)	40
206,0 (+)	103,0	60,4 (-)	83,8 (-)	87,5 (-)	116,6	79,9 (-)	3 037,5 (+)	1 206,7 (+)	109,0	‰	Taux des maladies infectieuses à déclaration obligatoire ¹ (1994)	41
*83,4	*12,3 (-)	58,8	81,7 (+)	141,9 (+)	76,2 (+)	52,5 (-)	0,0	**23,4	60,9		Chlamydie	
0,0	41,6	25,3 (-)	28,4	24,0 (-)	39,3	33,0	0,0	**11,7	33,4		Coqueluche	
*103,0 (+)	39,7 (+)	24,6 (+)	19,0	18,3	23,3 (+)	12,8 (-)	0,0	0,0	17,9		Campylobactériose	
**9,8	0,0	*3,4 (-)	15,4	*7,5 (-)	13,2 (-)	11,1 (-)	0,0	0,0	16,8		Scarlatine	
**14,7	*17,9	15,9	11,8 (-)	12,1 (-)	28,9 (+)	14,4	**11,3	**35,1	16,6		Hépatite B porteur	
**9,8	**0,9	*4,2 (-)	*5,9 (-)	*4,6 (-)	*2,6 (-)	3,8 (-)	646,0 (+)	*117,2 (+)	10,3		Salmonellose	
**4,9	**7,6	*6,3 (-)	*4,4 (-)	13,5	*6,6 (-)	8,0 (-)	**11,3	0,0	9,8		Infection gonococcique	
0,0	0,0	**1,0	*3,3 (-)	**1,8	*4,0	*1,8 (-)	0,0	0,0	5,7		Giardiase	
**9,8	**2,8	**0,8	*3,6	**1,3	**2,1	*2,5 (-)	**56,7	**35,1	5,0		Sida	
											Tuberculose	
MORBIDITÉ HOSPITALIÈRE												
195,4	144,0	105,2	80,5	99,7	94,7	95,5	250,3	212,8	100,1	‰	Taux ajusté ⁴ d'hospitalisation ^{1,5} (1993-1995)	42
11,9	10,8	7,4	7,7	8,6	8,6	8,1	8,1	8,2	8,3		Tumeurs	
28,0	20,2	18,1	12,0	16,5	14,3	14,4	21,7	17,2	14,6		Appareil circulatoire	
26,8	17,0	12,7	6,4	10,9	8,8	9,4	53,0	35,4	10,6		Appareil respiratoire	
21,3	17,3	12,7	9,9	11,7	11,6	11,9	28,9	25,3	12,6		Appareil digestif	
14,0	10,8	7,4	6,0	7,0	7,0	7,8	12,4	12,1	7,6		Organes génito-urinaires	
15,8	13,1	10,4	5,5	8,5	8,0	6,8	21,9	15,9	8,0		Traumatismes	
*480	396	360 (-)	405	408	400	390	*490	*308	391	‰	Taux ajusté ⁴ d'incidence du cancer ^{1,5} (1990-1992)	43
**59	44	52	57	58	56	53	**62	**59	53		Côlon-rectum	
**94	84	64	71	79	71	67	**177	**29	70		Poumon	
**59	94	83	106	89	96	92	**95	**115	93		Sein chez la femme	
**131	83	74 (-)	95	92	107	112 (+)	0	**43	92		Prostate	

1. La différence avec le Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.

2. L'année de référence est différente pour les régions Nunavik (1992) et Terres-Cries-de-la-Baie-James (1991).

3. La différence entre le Québec et les régions Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baie-James n'a pas été testée puisque les enquêtes sont trop éloignées dans le temps.

4. Ajusté selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 1991.

5. Sous-estimation pour les régions limitrophes, en particulier la région 07, puisque les fichiers consultés ne comprennent que les événements enregistrés au Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec (régions 06 et 16 comparées au reste du Québec aux numéros 36, 37 et 38).

n.d. Non disponible.

Symboles : % = pour 100; ‰ = pour 1 000; ‰‰ = pour 100 000.

LE QUÉBEC ET LES 18 RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES • ÉTAT DE SANTÉ :

B) ÉTAT DE SANTÉ OBJECTIF (Mortalité)

			01	02	03	04	05	06	07	08	09	
		ENSEMBLE DU QUÉBEC	BAS-SAINT-LAURENT	SAGUENAY—LAC-SAINT-JEAN	QUÉBEC	MAURICIE—BOIS-FRANCS	ESTRIE	MONTREAL-CENTRE	OUTAOUAIS	ABITIBI-TÉMISCAMINGUE	CÔTE-NORD	
ÉTAT DE SANTÉ OBJECTIF (suite)												
MORTALITÉ												
44	Espérance de vie ¹ (1990-1992)	ans	77,3	77,3	75,9 (-)	77,5 (+)	77,1	77,6	77,5 (+)	76,5 (-)	76,4 (-)	76,4 (-)
	Hommes		73,7	73,7	72,3 (-)	73,6	73,3 (-)	74,1	73,7	72,9 (-)	72,9 (-)	73,0
	Femmes		80,8	81,1	79,7 (-)	81,1	80,9	81,0	81,0	80,3 (-)	80,3	80,4
45	Taux de mortalité infantile ^{1,2} (1990-1992)	‰	5,9	6,1	8,1 (+)	5,3	5,5	6,2	6,3	5,0	5,8	5,8
46	Taux de mortalité périnatale ^{1,2} (1990-1992)	‰	7,7	8,1	8,6	7,0	7,8	7,3	8,4	7,6	6,2	9,5
47	Taux ajusté ³ de mortalité ¹ (1990-1992)	‰	691	697	771 (+)	684	696	676	674 (-)	741 (+)	740 (+)	740
	Tumeurs		209	199	238 (+)	211	203	193 (-)	206	211	225	251 (+)
	Appareil circulatoire		261	261	273	255	264	264	251 (-)	285 (+)	284	235
	Appareil respiratoire		56	63	66 (+)	59	60	52	52 (-)	62	61	66
	Traumatismes		49	60	61 (+)	44	57 (+)	53	40 (-)	46	66 (+)	72 (+)
48	Taux ajusté ³ de mortalité par suicide ¹ (1990-1992)	‰	16,3	16,5	18,7	16,9	20,1	17,7	13,0 (-)	16,6	23,3	19,9
49	Espérance de vie en bonne santé (1992-1993)	ans	66,8	65,4	64,7	67,1	66,0	65,7	68,0	64,4	65,5	63,3
50	Taux ajusté ³ des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-1992)	‰	6 523	6 591	7 535 (+)	6 245 (-)	6 903 (+)	6 259 (-)	6 656 (+)	6 765 (+)	7 219 (+)	7 453 (+)
	Tumeurs		1 922	1 807 (-)	2 134 (+)	1 999 (+)	1 919	1 773 (-)	1 931	1 875	2 093 (+)	2 352 (+)
	Appareil circulatoire		1 270	1 225	1 445 (+)	1 279	1 327 (+)	1 221 (-)	1 274	1 476 (+)	1 456 (+)	1 016 (-)
	Appareil respiratoire		221	276 (+)	227	209	252 (+)	225	231 (+)	216	246	224
	Traumatismes		1 589	1 911 (+)	2 000 (+)	1 371 (-)	2 028 (+)	1 652 (+)	1 224 (-)	1 543 (-)	2 124 (+)	2 507 (+)
51	Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers, moyenne annuelle (1992-1994)	N	50 615	1 675	2 076	3 916	3 563	2 163	11 870	2 401	1 169	790
	Blessures mortelles	%	2	3	3	2	3	2	1	2	4	3
	Blessures graves	%	13	18	16	14	16	14	9	12	16	17
	Blessures légères	%	85	79	81	85	82	83	90	86	80	80

1. La différence avec le Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 2. Les valeurs obtenues pour l'Outaouais représentent des estimations.
 3. Ajusté selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 1991.
 - * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 - (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 - n.d. Non disponible.
- Symboles : ‰ = pour 1 000; ‰‰ = pour 100 000; N = nombre.

LE QUÉBEC ET LES 18 RÉGIONS SOCIOSANITAIRES • ÉTAT DE SANTÉ :

B) ÉTAT DE SANTÉ OBJECTIVÉ (Mortalité)

10	11	12	13	14	15	16	17	18				
NORD-DU QUÉBEC	GASPÉSIE—ÎLES-DE-LA-MADELEINE	CHAUDIÈRE-APPALACHES	LAVAL	LANAUDIÈRE	LAURENTIDES	MONTÉRÉGIE	NUNAVIK	TERRES-CRIÉES-DE-LA-BAIE-JAMES	ENSEMBLE DU QUÉBEC	ÉTAT DE SANTÉ OBJECTIVÉ (suite)		
MORTALITÉ												
75,1 (-)	77,1	77,4	78,2 (+)	76,8 (-)	76,9 (-)	77,5	63,6 (-)	73,3 (-)	77,3	ans	Espérance de vie ¹ (1990-1992)	44
70,8 (-)	73,5	73,6	75,2 (+)	73,8	73,6	74,1 (+)	60,5 (-)	70,8	73,7		Hommes	
76,6 (-)	81,1	81,5 (+)	81,1	80,0 (-)	80,5	80,8	65,4 (-)	75,6 (-)	80,8		Femmes	
**5,9	*7,1	6,2	5,1	4,6 (-)	5,8	5,4	*32,4 (+)	*10,8	5,9	%	Taux de mortalité infantile ^{1,2} (1990-1992)	45
*8,9	10,3	8,2	7,3	8,2	6,8	6,7 (-)	*16,7 (+)	**3,6	7,7	%	Taux de mortalité périnatale ^{1,2} (1990-1992)	46
823	692	685	658 (-)	736 (+)	724 (+)	695	1 454 (+)	855	691	% ₀₀₀	Taux ajusté ³ de mortalité ¹ (1990-1992)	47
*333	213	198	211	226 (+)	211	210	**322	**199	209		Tumeurs	
*299	249	257	254	275	278 (+)	272 (+)	*415	*269	261		Appareil circulatoire	
**61	47	57	47 (-)	66 (+)	57	53	**329	**140	56		Appareil respiratoire	
**38	55	66 (+)	40 (-)	59 (+)	55	47	*274 (+)	*129	49		Traumatismes	
**14,6	*14,4	23,6 (+)	13,3	18,3	19,9	14,3	**73,1	**26,0	16,3	% ₀₀₀	Taux ajusté ³ de mortalité par suicide ¹ (1990-1992)	48
n.d.	64,9	65,9	69,3	64,1	66,7	67,6	57,7	n.d.	66,8	ans	Espérance de vie en bonne santé (1992-1993)	49
6 610	7 032 (+)	6 627 (+)	5 441 (-)	6 354 (-)	6 595 (+)	6 063 (-)	22 001 (+)	10 746 (+)	6 523	% ₀₀₀	Taux ajusté ³ des années potentielles de vie perdues ¹ (1990-1992)	50
2 077	2 025 (+)	1 718 (-)	1 905	2 026 (+)	1 930	1 874 (-)	2 931 (+)	1 127 (-)	1 922		Tumeurs	
1 213	1 263	1 169 (-)	1 057 (-)	1 282	1 298	1 241 (-)	3 264 (+)	1 993 (+)	1 270		Appareil circulatoire	
264	188 (-)	220	156 (-)	209	188 (-)	213	2 041 (+)	*582 (+)	221		Appareil respiratoire	
1 657	1 827 (+)	2 259 (+)	1 197 (-)	1 689 (+)	1 768 (+)	1 475 (-)	9 382 (+)	5 486 (+)	1 589		Traumatismes	
n.d.	793	2 658	2 137	3 133	3 328	8 723	n.d.	n.d.	50 615	N	Répartition des victimes d'accidents de véhicules routiers, moyenne annuelle (1992-1994)	51
n.d.	3	3	1	2	2	2	n.d.	n.d.	2	%	Blessures mortelles	
n.d.	18	16	5	14	14	14	n.d.	n.d.	13	%	Blessures graves	
n.d.	79	81	94	84	84	85	n.d.	n.d.	85	%	Blessures légères	

1. La différence avec le Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 2. Les valeurs obtenues pour l'Outaouais représentent des estimations.
 3. Ajusté selon la structure par âge, sexes réunis, de la population corrigée de l'ensemble du Québec en 1991.
 * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec.
 n.d. Non disponible.
 Symboles : ‰ = pour 1 000; ‰₀₀₀ = pour 100 000; N = nombre.

LE QUÉBEC ET LES 18 RÉGIONS SOCIOSANITAIRES • CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ : INCAPACITÉ, UTILISATION DES SERVICES et CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS

		ENSEMBLE DU QUÉBEC	01 BAS-SAINT-LAURENT	02 SAGUENAY— LAC-SAINT-JEAN	03 QUÉBEC	04 MAURICIE— BOIS-FRANCS	05 ESTRIE	06 MONTREAL-CENTRE	07 OUTAOUAIS	08 ABITIBI- TEMISCAMINGUE	09 CÔTE-NORD	
INCAPACITÉ												
52	Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993)	jours	41	44	39	35	37	35	42	62	71	43
	Secteur primaire		55	54	51	48	46	43	75	85	71	36
	Secteur manufacturier		33	26	34	29	29	29	40	51	43	29
	Construction		71	80	60	69	66	56	72	101	91	86
	Transport et communication		44	57	44	37	52	42	37	64	93	46
	Commerce		43	53	36	35	39	39	44	60	57	47
	Services		41	40	37	33	42	39	41	54	77	49
53	Proportion de la population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-1993) ²	%	7,2	9,0	8,2	6,3	8,3	8,9	7,2	8,0	7,1	9,4 (+)
54	Proportion d'enfants handicapés ¹ (1995)	%	1,39	1,43	1,90 (+)	1,46 (+)	1,36	1,35	1,26 (-)	1,28 (-)	1,45	1,46
UTILISATION DES SERVICES												
55	Taux de consultations médicales (1994)	%	81,4	78,4	81,7	83,9	80,5	81,2	81,8	81,2	74,9	71,4
56	Taux des journées d'hospitalisation ³ (1993-1995)	‰	824,8	1 054,7	977,4	908,8	949,7	932,3	879,9	683,0	850,3	1 051,1
	Tumeurs		110,5	134,1	112,7	123,1	121,4	117,0	129,9	82,6	96,9	112,7
	Appareil circulatoire		174,1	206,3	186,9	197,8	212,8	237,4	179,3	130,3	166,7	198,4
	Appareil respiratoire		74,0	104,0	98,0	86,0	91,4	81,8	74,5	72,1	94,4	108,9
	Appareil digestif		86,2	104,9	104,4	94,6	97,9	99,7	93,3	76,5	86,1	106,5
	Organes génito-urinaires		45,3	60,5	62,6	46,2	52,6	45,5	45,8	39,5	49,4	56,2
	Traumatismes		79,8	124,7	102,1	81,5	103,2	89,2	77,5	74,9	88,2	90,1
57	Taux de césarienne ¹ (1993-1995)	%	22,7	22,4	20,6 (-)	23,9 (+)	23,0	15,6 (-)	24,7 (+)	18,4 (-)	19,5 (-)	19,0 (-)
58	Taux de pontages coronariens ^{1,3} (1993-1995)	‰	61,1	70,3 (+)	55,6	59,3	61,2	89,2 (+)	67,3 (+)	*2,3 #	51,4 (-)	91,3 (+)
CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS												
59	Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-1993) ²	%	8,7	9,1	9,9	9,8	7,7	10,0	10,0 (+)	10,1	8,2	8,8
60	Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994)	N	28,4	30,0	33,4	31,8	28,5	28,0	26,6	28,7	28,6	30,7

1. La différence avec le Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.
 2. L'année de référence est différente pour les régions Nunavik (1992) et Terres-Cries-de-la-Baie-James (1991).
 3. Sous-estimation pour les régions limitrophes, en particulier la région 07, puisque les fichiers ne comprennent que les événements enregistrés au Québec.
 - * Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.
 - ** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.
 - (-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec (régions 06 et 16 comparées au reste du Québec aux numéros 53 et 59).
 - # Le test statistique n'a pas été fait étant donné qu'une grande partie des pontages coronariens des résidents de l'Outaouais ont lieu dans des hôpitaux ontariens.
 - n.d. Non disponible.
- Symboles : % = pour 100; ‰ = pour 1 000; ‰‰ = pour 100 000; N = nombre.

LE QUÉBEC ET LES 18 RÉGIONS SOCIO-SANITAIRES • CONSÉQUENCES DES PROBLÈMES DE SANTÉ : INCAPACITÉ, UTILISATION DES SERVICES et CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS

10	11	12	13	14	15	16	17	18			
NORD-DU-QUÉBEC	GASPÉSIE—ÎLES-DE-LA-MADELEINE	CHAUDIÈRE-APPALACHES	LAVAL	LANAUDIÈRE	LAURENTIDES	MONTÉRÉGIE	NUNAVIK	TERRES-CRIES-DE-LA-BAIE-JAMES	ENSEMBLE DU QUÉBEC		
INCAPACITÉ											
45	72	33	41	47	45	37	14	55	41	jours Durée moyenne d'indemnisation par lésion professionnelle (1993)	52
50	75	45	38	64	60	53	0	101	55	Secteur primaire	
33	58	25	34	43	38	31	6	0	33	Secteur manufacturier	
42	135	55	94	71	69	62	0	53	71	Construction	
44	91	46	33	46	44	40	0	69	44	Transport et communication	
32	58	38	45	48	48	38	10	96	43	Commerce	
40	68	39	37	45	44	40	16	6	41	Services	
n.d.	9,2	7,6	5,4 (-)	7,5	7,6	6,1	*1,4 (-)	4,7 (-)	7,2	% Proportion de la population ayant une incapacité à long terme ¹ (1992-1993) ²	53
1,06 (-)	1,78 (+)	1,45	1,32	1,49 (+)	1,44	1,33 (-)	1,02 (-)	1,08	1,39	% Proportion d'enfants handicapés ¹ (1995)	54
UTILISATION DES SERVICES											
n.d.	72,2	82,7	83,3	81,8	82,7	82,1	n.d.	n.d.	81,4	% Taux de consultations médicales (1994)	55
759,5	1 191,7	853,3	576,4	683,0	650,0	697,9	1 123,9	1 187,2	824,8	‰ Taux des journées d'hospitalisation ³ (1993-1995)	56
71,0	143,6	99,6	87,8	91,1	96,9	92,8	58,9	65,5	110,5	Tumeurs	
112,6	263,0	210,1	121,9	143,1	140,5	146,0	66,9	76,0	174,1	Appareil circulatoire	
82,3	112,3	81,6	39,1	67,8	52,0	55,0	227,9	158,9	74,0	Appareil respiratoire	
70,5	108,4	78,2	60,4	74,9	65,2	75,7	100,8	103,4	86,2	Appareil digestif	
50,3	57,4	44,2	32,8	38,5	35,9	42,4	53,8	53,4	45,3	Organes génito-urinaires	
78,0	116,0	105,2	44,1	75,9	65,1	63,1	113,2	95,5	79,8	Traumatismes	
21,2	16,8 (-)	26,5 (+)	23,8	23,3	19,7 (-)	23,6 (+)	*3,9 (-)	28,5 (+)	22,7	% Taux de césarienne ¹ (1993-1995)	57
*31,9 (-)	68,5	64,7	67,5 (+)	63,0	53,0 (-)	59,8	0,0	**5,9	61,1	‰ Taux de pontages coronariens ^{1,3} (1993-1995)	58
CONSOMMATION DE MÉDICAMENTS											
n.d.	8,1	9,5	7,0	6,7	7,5	7,2 (-)	**1,7	*2,5 (-)	8,7	% Population ayant consommé trois classes de médicaments et plus ¹ (1992-1993) ²	59
n.d.	28,2	32,1	25,5	29,5	27,6	28,1	n.d.	n.d.	28,4	N Nombre d'ordonnances par personne de 65 ans et plus (1994)	60

1. La différence avec le Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil alpha de 0,05.

2. L'année de référence est différente pour les régions Nunavik (1992) et Terres-Cries-de-la-Baie-James (1991).

3. Sous-estimation pour les régions limitrophes, en particulier la région 07, puisque les fichiers ne comprennent que les événements enregistrés au Québec.

* Coefficient de variation supérieur à 16,5 % et inférieur ou égal à 33,3 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** Coefficient de variation supérieur à 33,3 %. La valeur n'est présentée qu'à titre indicatif.

(-) (+) Valeur significativement plus faible ou plus élevée que celle de l'ensemble du Québec (régions 06 et 16 comparées au reste du Québec aux numéros 53 et 59).

n.d. Non disponible.

Symboles : % = pour 100; ‰ = pour 1 000; ‰‰ = pour 100 000; N = nombre.

BIBLIOGRAPHIE

- AUDET, N. (1996). *Cahier technique et méthodologique; Enquête sociale et de santé 1992-1993*, vol. 2, Montréal, Santé Québec, 270 p.
- BEAUPRÉ, M. (1995). *Rapport annuel des nouveaux cas de cancer déclarés au fichier des tumeurs du Québec, année 1992*, Québec, MSSS, Direction générale de la planification et de l'évaluation, Collection Données statistiques et indicateurs, 102 p.
- BERNARD, P.M., LAPOINTE, C. (1987). *Mesures statistiques en épidémiologie*, Sillery, Presses de l'Université du Québec, 314 p.
- BLALOCK, H. (1972). *Social Statistics*, 2^e édition, McGraw-Hill, 583 p.
- BLONDEAU, M., MECTEAU, M. (1996). *Codes et noms des territoires de RSS, DSC, CLSC (et MRC correspondantes) et des établissements CLSC*, Québec, MSSS, Direction générale de la planification et de l'évaluation.
- BRASSARD, D. (1987). « Les Indiens sont-ils pauvres ? Les cas des Attikameks et des Montagnais », dans Gauthier, M. (sous la direction de), *Les nouveaux visages de la pauvreté*, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, p. 79-94.
- BUREAU DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (1996). *Rapport sur la qualité des fichiers du Registre des événements démographiques, Québec, 1994*, Québec, BSQ.
- CENTRE ANTI-POISON DU QUÉBEC (1996). *Rapport annuel 1995*, Québec, Centre Anti-Poison du Québec.
- CHEVALIER, S., CHOINIÈRE, R., FERLAND, M., PAGEAU, M., SAUVAGEAU, Y. (1995). *Indicateurs sociosanitaires. Définitions et interprétations*, Ottawa, Institut canadien d'information sur la santé, 230 p.
- CHEVALIER, S., CHOINIÈRE, R., BERNIER, L., SAUVAGEAU, Y., MASSON, I., CADIEUX, É. (1993). *Guide d'utilisation de 40 indicateurs sociosanitaires*, Ottawa, Santé et Bien-être social Canada, 161 p.
- CHIANG, C.L. (1961). *Standard Error of the Age-Adjusted Death Rate*, Washington, U.S. Department of Health, Education and Welfare, Vital Statistics—Special Reports, vol. 47, n^o 9, p. 273-285.
- CHIANG, C.L. (1984). *The Life Table and Its Applications*, Florida, Robert E. Krieger Publishing Company.
- CHOINIÈRE, R., ROBITAILLE, Y., DORVAL, D., SAUVAGEAU, Y. (1993). *Profil des traumatismes au Québec : Disparités régionales et tendances de la mortalité (1976 à 1990) et des hospitalisations (1981 à 1991)*, Québec, MSSS, 493 p.
- CHOINIÈRE, R., MALENFANT, R., SAUVAGEAU, Y. (1990). *Liste des indicateurs socio-sanitaires pour le réseau des DSC*, Comité provincial des CH-DSC, 81 p.
- CLARKSON, M. (1987). *Enquête canadienne sur la promotion de la santé 1985, Description des données québécoises*, Québec, MSSS, 174 p.
- COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC, ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC (1996). *Ordonnance de médicaments — modalité d'émission et d'exécution pour la clientèle hors établissement*, Montréal.
- COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (1996). *Statistiques sur les lésions professionnelles 1992*, Québec, CSST.
- COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (1995). *Statistiques sur les lésions professionnelles 1991*, Québec, CSST.
- COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (1994). *Statistiques sur les lésions professionnelles 1990*, Québec, CSST.
- COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (1993). *Statistiques sur les lésions professionnelles 1989*, Québec, CSST.
- COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (1992). *Statistiques sur les lésions professionnelles 1988*, Québec, CSST.
- COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (1991). *Statistiques sur les lésions professionnelles 1987*, Québec, CSST.
- COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (1990). *Statistiques sur les lésions professionnelles 1986*, Québec, CSST.
- CONSEIL NATIONAL DU BIEN-ÊTRE SOCIAL (1996). *Profil de la pauvreté, 1994*, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 95 p.
- FLEISS, J.L. (1981). *Statistical Methods for Rates and Proportions*, 2^e édition, New York, John Wiley & Sons, 321 p.
- GAGNÉ, P., DESLAURIERS, J., BERNIER, J. (1996). *De l'aide sociale à la sécurité du revenu : rapport statistique 1994-95*, Québec, Ministère de la Sécurité du revenu.

- LAFONTAINE, P. (1991). *La mortalité au Québec et dans les régions socio-sanitaires; évolution 1976 à 1986*, Québec, MSSS, Direction générale de la planification et de l'évaluation, 97 p.
- LAFONTAINE, P. (1987a). *Tables de mortalité et variations spatiales de la mortalité selon le sexe, par région sociosanitaire, département de santé communautaire et centre local de santé communautaire*, Québec, MSSS, Direction générale de la planification et de l'évaluation.
- LAFONTAINE, P. (1987b). *Taux bruts et taux standardisés de mortalité, causes de mortalité, mortalité par grand groupe d'âge, par région sociosanitaire, département de santé communautaire et centre local de santé communautaire*, Québec, MSSS, Direction générale de la planification et de l'évaluation.
- MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES (1996). *Répertoire des municipalités du Québec*, Québec, Les Publications du Québec.
- MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (1992). *État de l'environnement au Québec*, Montréal, Guérin.
- MINISTÈRE DE LA MAIN-D'ŒUVRE, DE LA SÉCURITÉ DU REVENU ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (1993). *De l'aide sociale à la sécurité du revenu. Rapport statistique 1991-1992*, Québec, Direction de l'évaluation et de la statistique, 217 p.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (1996). *Rapport financier annuel : établissements publics et privés conventionnés, année financière terminée le 31 mars 1996*, Québec, MSSS.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (1996). *SIFO Système d'information financière et opération. Méthodologie*, Québec, MSSS, Service des études opérationnelles et données statistiques.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (1996). *Surveillance des maladies infectieuses : maladies évitables par la vaccination, maladies d'origine hydrique ou alimentaire, tuberculose, et autres maladies, 1994*, Québec, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, Direction générale de la santé publique, 201 p.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (1996a). *Tableaux de données de Statistique Canada issus du géocodage. Document d'accompagnement*, Direction de la recherche et de l'évaluation, 26 p.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (1995). *Statistiques MED-ÉCHO 1989-1990 à 1993-1994 : les soins hospitaliers de courte durée au Québec*, Québec, MSSS, Collection Données statistiques et indicateurs, n° 29, 164 p.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (1995a). *Les indicateurs de la politique québécoise de la santé et du bien-être. Exercice de suivi 1995*, Québec, MSSS, Direction générale de la planification et de l'évaluation, 100 p.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (1995b). *Les fiches descriptives des indicateurs de la politique québécoise de la santé et du bien-être*, Québec, MSSS, Direction générale de la planification et de l'évaluation, 207 p.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (1993). *Plan d'action pour le dépistage du cancer du sein*, Québec, MSSS.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (1992). *La politique de la santé et du bien-être*, Québec, MSSS, 192 p.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (1991). *Lits CD. Bassins de desserte 1990*, Québec, MSSS, Direction de la santé physique, 89 p.
- MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (1988). *Et la santé, ça va ? Rapport de l'enquête Santé Québec 1987. Tome 1*, Québec, MSSS, 337 p.
- MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (1996). *Statistiques 1995. Criminalité et application des règlements de la circulation au Québec*, Direction des affaires policières et de la sécurité incendie.
- MIX, P. (1991). « Les hôpitaux généraux publics — Tendances chronologiques », *Rapport sur la santé*, vol. 3, n° 1, p. 59-78.
- O'CONNOR, A. (1993). « La prévention des cancers gynécologiques », dans Santé et Bien-être social Canada, STEPHENS, T., FOWLER, G.D. (sous la direction de). *Enquête Promotion de la santé Canada 1990 : Rapport technique*, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada (cat. H39-263/2-1990F), p. 181-194.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (1981). *Classification internationale des déficiences, incapacités et handicaps*, Genève, OMS, p. 143.
- ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (1946). *Actes officiels de l'Organisation mondiale de la santé. vol. 2 — Conférence internationale de la santé, New York 19 juin - 22 juillet 1946*, Nations-Unies, Genève, OMS, p. 100.
- PAMPALON, R. (1986). *La mortalité dans les régions socio-sanitaires, les divisions de recensement et les principales agglomérations urbaines du Québec; 1979-1983*, Québec, MSSS, 146 p.
- PAMPALON, R. (1985). *Géographie de la santé au Québec*, Québec, MSSS, 392 p.
- PAMPALON, R., GAUTHIER, D., RAYMOND, G., BEAUDRY, D. (1990). *La santé à la carte*, Québec, Les Publications du Québec, 60 p.

- PAMPALON, R., SAUCIER, A., BERTHIAUME, N., FERLAND, P., COUTURE, R., CARIS, P., FORTIN, L., LACROIX, D., KIROUAC, R. (1995). *Des indicateurs de besoins pour l'allocation interrégionale des ressources*, Québec, MSSS, Direction générale de la planification et de l'évaluation, 354 p.
- PELLETIER, G. (1995). *La population du Québec par territoire de CLSC, de DSC et de RSS, pour la période 1981 à 2016*, Québec, MSSS, Direction générale de la planification et de l'évaluation, 224 p.
- PÉRON, Y., STROMENGER, C. (1985). *Indices démographiques et indicateurs de santé des populations. Présentation et interprétation*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 82-543F), 265 p.
- PINEAULT, R., DAVELUY, C. (1986). *La planification de la santé*, Montréal, Les Éditions Agence d'Arc inc., 480 p.
- RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1996). *Statistiques annuelles 1995*, Québec, RAMQ.
- RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1995). *Statistiques annuelles 1994*, Québec, RAMQ.
- RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1994). *Statistiques annuelles 1993*, Québec, RAMQ.
- RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1993). *Statistiques annuelles 1992*, Québec, RAMQ.
- RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1992). *Statistiques annuelles 1991*, Québec, RAMQ.
- RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1991). *Statistiques annuelles 1990*, Québec, RAMQ.
- RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1990). *Statistiques annuelles 1989*, Québec, RAMQ.
- RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1989). *Statistiques annuelles 1988*, Québec, RAMQ.
- RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1988). *Statistiques annuelles 1987*, Québec, RAMQ.
- RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1987). *Statistiques annuelles 1986*, Québec, RAMQ.
- RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1986). *Statistiques annuelles 1985*, Québec, RAMQ.
- RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1985). *Statistiques annuelles 1984*, Québec, RAMQ.
- RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC (1996). *Les allocations d'aide aux familles. Statistiques 1995*, Québec, RRQ.
- RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC (1995). *Les allocations d'aide aux familles. Statistiques 1994*, Québec, RRQ.
- RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC (1994). *Les allocations d'aide aux familles. Statistiques 1993*, Québec, RRQ.
- RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC (1993). *Les allocations d'aide aux familles. Statistiques 1992*, Québec, RRQ.
- RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC (1992). *Les allocations d'aide aux familles. Statistiques 1991*, Québec, RRQ.
- RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC (1991). *Les allocations d'aide aux familles. Statistiques 1990*, Québec, RRQ.
- RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC (1990). *Les allocations d'aide aux familles. Statistiques 1989*, Québec, RRQ.
- RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC (1989). *Les allocations d'aide aux familles. Statistiques 1988*, Québec, RRQ.
- ROCHON, M. (1992). *Taux de grossesse des adolescentes de moins de 18 ans selon l'issue et la région socio-sanitaire de résidence en 1990 — Données préliminaires*, Québec, MSSS, Service des études socio-sanitaires, 8 p.
- ROY, L. (1985). *Le point sur les habitudes de vie : le tabac*, Québec, Conseil des affaires sociales et de la famille, 120 p.
- SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA, STEPHENS T., FOWLER G.D. (sous la direction de) (1993). *Enquête Promotion de la Santé Canada 1990 : Rapport technique*, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada (cat. H39-263/2-1990F), p. 34.
- SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA (1988). *Rapport technique : Enquête Promotion Santé Canada (1985)*, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada.
- SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA (1988). *L'usage du tabac au Canada en 1986*, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada (cat. H39-66/1988F), 71 p.
- SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA (1985). *L'usage du tabac au Canada en 1983*, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada (cat. H39-66/1985F), 54 p.

- SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA (1983). *L'usage du tabac chez les Canadiens en 1981*, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada (cat. H39-66/1983F), 78 p.
- SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA (1981). *La santé des Canadiens, Rapport de l'enquête Santé Canada de 1978-1979*, Ottawa, Santé et Bien-être social Canada, 245 p.
- SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA (1980). *Usage du tabac au Canada 1965-1979*, Rapports techniques, n° 9, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada, 45 p.
- SANTÉ QUÉBEC (1996). *Cahier technique et méthodologique. Enquête sociale et de santé 1992-1993*, 2 tomes, Montréal.
- SANTÉ QUÉBEC (1995). *Et la santé, ça va en 1992-1993 ? Rapport de l'enquête sociale et de santé 1992-1993*, 3 volumes, Québec, Santé Québec.
- SANTÉ QUÉBEC (1994). *Et votre cœur, ça va ? Rapport de l'enquête québécoise sur la santé cardio-vasculaire 1990*, Montréal, Santé Québec.
- SANTÉ QUÉBEC (1994a). *Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik, 1992*, Cahier technique 92-01 (première version), Montréal.
- SANTÉ QUÉBEC (1994b). *Et la santé des Cris, ça va ? Rapport de l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James, 1991*, Montréal, MSSS, Gouvernement du Québec.
- SANTÉ QUÉBEC (1994c). *Et la santé des Inuits, ça va ? Rapport de l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik, 1992*, 2 tomes, Montréal, MSSS, Gouvernement du Québec.
- SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1996). *Dossier statistique bilan 1995, Accidents, Parc automobile, Permis de conduire*, Québec, SAAQ.
- SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1995). *Dossier statistique bilan 1994, Accidents, Parc automobile, Permis de conduire*, Québec, SAAQ.
- SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1995a). *Évolution du taux d'utilisation des dispositifs de retenue dans les véhicules routiers au Québec, 1995*, Québec, SAAQ, Direction de la planification.
- SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1994). *Dossier statistique bilan 1993, Accidents, Parc automobile, Permis de conduire*, Québec, SAAQ.
- SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1993). *Dossier statistique bilan 1992, Accidents, Parc automobile, Permis de conduire*, Québec, SAAQ.
- SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1992). *Dossier statistique bilan 1991, Accidents, Parc automobile, Permis de conduire*, Québec, SAAQ.
- SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1991). *Dossier statistique bilan 1990, Accidents, Parc automobile, Permis de conduire*, Québec, SAAQ.
- SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1990). *Dossier statistique bilan 1989, Accidents, Parc automobile, Permis de conduire*, Québec, SAAQ.
- SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1990). *Évolution du taux d'utilisation des dispositifs de retenue dans les véhicules routiers au Québec, 1990*, Québec, SAAQ, Direction de la planification.
- STATISTIQUE CANADA (1996). *Moyennes annuelles de la population active, 1995*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 71-220).
- STATISTIQUE CANADA (1995). *Moyennes annuelles de la population active, 1989-1994*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 71-529).
- STATISTIQUE CANADA (1995a). *Enquête nationale sur la santé de la population 1994-1995, Fichiers microdonnées à grande diffusion*, Ottawa, produit électronique (cat. 82F0001XDB).
- STATISTIQUE CANADA (1994). *Couverture. Rapport technique du recensement de 1991; Série des produits de référence*, Ottawa, Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (cat. 92-341F).
- STATISTIQUE CANADA (1994). *Échantillonnage et pondération. Rapport technique du recensement de 1991, Série des produits de référence*, Ottawa, Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie (cat. 92-342F).
- STATISTIQUE CANADA (1994a). *Statistiques chronologiques sur la population active, 1993*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 71-201).
- STATISTIQUE CANADA (1994b). *L'état de santé des Canadiens, Rapport de l'enquête sociale générale de 1991, série analytique*, Ottawa (cat. 11-612F, n° 8).

- STATISTIQUE CANADA (1994c). *Revenu, Rapports techniques du recensement 1991*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-342F).
- STATISTIQUE CANADA (1993). *Activité. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-324).
- STATISTIQUE CANADA (1993). *Langue parlée à la maison et langue maternelle. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-317).
- STATISTIQUE CANADA (1993). *Mobilité et migration. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-322).
- STATISTIQUE CANADA (1993). *Niveau de scolarité et fréquentation scolaire. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-328).
- STATISTIQUE CANADA (1993a). *Documentation sur les données, Série des profils – Partie B*, Ottawa, Approvisionnement et Services Canada, Recensement du Canada de 1991.
- STATISTIQUE CANADA (1992). *Familles : Nombre, genre et structure. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-312).
- STATISTIQUE CANADA (1992). *Immigration et citoyenneté. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-316).
- STATISTIQUE CANADA (1992a). *Dictionnaire du recensement de 1991*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-310F).
- STATISTIQUE CANADA (1989). *Caractéristiques de la population et des logements. Activité. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-111).
- STATISTIQUE CANADA (1989). *Langue : Partie 2. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-103).
- STATISTIQUE CANADA (1989). *Mobilité et migration interprovinciale. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-108).
- STATISTIQUE CANADA (1989). *Origine ethnique, immigration et citoyenneté. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-109).
- STATISTIQUE CANADA (1989). *Scolarité et principal domaine d'études. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-110).
- STATISTIQUE CANADA (1987). *Méthodologie de l'enquête sur la population active du Canada, 1984-1990*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 71-526).
- STATISTIQUE CANADA (1987). *Caractéristiques de la population et des logements. Familles : Partie 1. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-106).
- STATISTIQUE CANADA (1987). *Familles : Partie 1. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-106).
- STATISTIQUE CANADA (1987a). *Santé et aide du milieu, Rapport de l'Enquête sociale générale de 1985, série analytique*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 11-612F, n° 1).
- STATISTIQUE CANADA (1984). *Recensement du Canada de 1981. Population. Activité*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-915).
- STATISTIQUE CANADA (1984). *Fréquentation scolaire et niveau de scolarité*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-914).
- STATISTIQUE CANADA (1984). *Lieu de naissance, citoyenneté et période d'immigration*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-913).
- STATISTIQUE CANADA (1983). *Mobilité*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-907).
- STATISTIQUE CANADA (1982). *Familles de recensement dans les ménages privés. Nombre de personnes, enfants à la maison, structure et genre, modalité de vie*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-905).
- ST-PIERRE, M.-A. (1996). *INFO-SIFO. Bulletin d'information concernant le Système d'Information Financière et Opérationnelle*, n° 3, mars 1996, Québec, MSSS, Direction des indicateurs de résultats et information statistique.
- ST-PIERRE, M.-H. (1995). *Mortalité de la population des huit villages cris de la Baie James, 1987-1992*, Montréal, RRSSS de Montréal-Centre, 108 p.
- SYSTÈME D'INFORMATION EN SANTÉ COMMUNAUTAIRE (1993). *Version 2.0 du contenu informationnel du système d'information en santé communautaire*, Québec, Centre de santé publique de la région de Québec et Direction de la santé communautaire de la Cité de la santé de Laval.
- TAMBAY, J.-L., CATLIN, G. (1995). « Plan d'échantillonnage de l'Enquête nationale sur la santé de la population », *Rapports sur la santé*, n° 7, p. 31-43.
- WILKINS, R. (1995). « Autonomie fonctionnelle et espérance de vie en santé », dans SANTÉ QUÉBEC, *Et la santé, ça va en 1992-1993 ? Rapport de l'enquête sociale et de santé 1992-1993*, vol. 1, Montréal, p. 279-311.
- WILKINS, R. (1991). « Espérance de vie en santé au Québec et au Canada en 1986 », *Cahiers québécois de démographie*, Vol. 20, n° 2, p. 367-382.
- WILKINS, R., ADAMS, O. (1983). *Healthfulness of Life*, Montréal, The Institute for Research on Public Policy, p. 122-135.

ANNEXE

Sources des données utilisées dans les graphiques et les tableaux

1• PROPORTION DE LA POPULATION DESSERVIE PAR DES ÉQUIPEMENTS DE COLLECTE SÉLECTIVE

Tous les éléments : Collecte Sélective Québec (données pour 1994 et 1995, compilations spéciales).

Ministère de l'Environnement et de la Faune du Québec, Direction de la récupération et du recyclage (données pour 1980 à 1993, compilations spéciales).

2• PROPORTION DE LA POPULATION DESSERVIE PAR DES INSTALLATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES

Tous les éléments : Ministère des Affaires municipales, Service du contrôle budgétaire (compilations spéciales).

3• TAUX DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Tous les éléments : SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1996). *Dossier statistique bilan 1995, Accidents, Parc automobile, Permis de conduire (idem pour les années 1989 à 1994)*, Québec, SAAQ.

MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

4• RÉPARTITION DE LA POPULATION SELON L'ÂGE ET LE SEXE

Tous les éléments : MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

5• TAUX D'ACCROISSEMENT DE LA POPULATION

Tous les éléments : MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

6• TAUX DE FÉCONDITÉ SELON L'ÂGE

Tous les éléments : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique).

MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

7• PROPORTION DE LA POPULATION DONT LA LANGUE PARLÉE À LA MAISON N'EST NI LE FRANÇAIS NI L'ANGLAIS

Éléments 1 et 2 : STATISTIQUE CANADA (1993). *Langue parlée à la maison et langue maternelle. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-317), p. 94-99.

STATISTIQUE CANADA (1989). *Langue : Partie 2. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-103), p. 4.1-4.2.

Éléments 3 et 4 : STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1991. Tableaux sommaires de base*, tableau L9102B (produit électronique).

STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1986. Tableaux sommaires de base*, tableau LA86B02 (produit électronique).

8• PROPORTION D'IMMIGRANTS

Éléments 1 et 2 : STATISTIQUE CANADA (1992). *Immigration et citoyenneté. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada, (cat. 93-316), p. 12-35.

STATISTIQUE CANADA (1989). *Origine ethnique, immigration et citoyenneté. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-109), p. 5B.1-5B.12.

STATISTIQUE CANADA (1984). *Lieu de naissance, citoyenneté et période d'immigration*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-913), p. 1B.1-1B.10.

Éléments 3 et 4 : STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1991. Tableaux sommaires de base*, tableau i9101B (produit électronique).

STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1986. Tableaux sommaires de base*, tableaux EC86B02 et EC86B03 (produit électronique).

9• PROPORTION DE FAMILLES MONOPARENTALES AVEC ENFANTS DE MOINS DE 18 ANS

- Éléments 1 et 2 : STATISTIQUE CANADA (1992). *Familles : Nombre, genre et structure. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-312), p. 28-29.
- STATISTIQUE CANADA (1987). *Familles : Partie 1. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-106), p. 4.1-4.4.
- Éléments 3 et 4 : STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1991. Tableaux sommaires de base*, tableau F9102A (produit électronique).
- STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1986. Tableaux sommaires de base*, tableau CF86A03 (produit électronique).
- STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1981. Tableaux sommaires de base*, tableau EAF81A13 (produit électronique).

10• PROPORTION DE LA POPULATION VIVANT SEULE

- Éléments 1 et 2 : STATISTIQUE CANADA (1992). *Familles : Nombre, genre et structure. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-312), p. 100 et 101.
- STATISTIQUE CANADA (1987). *Caractéristiques de la population et des logements. Familles : Partie 1. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-106), p. 7-9 à 7-11.
- STATISTIQUE CANADA (1982). *Familles de recensement dans les ménages privés. Nombre de personnes, enfants à la maison, structure et genre, modalité de vie*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-905), p. 6-7 et 6-8.
- Éléments 3 et 4 : STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1991. Tableaux sommaires de base*, tableau G9101 (produit électronique).
- STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1986. Tableaux sommaires de base*, tableau HH86A02 (produit électronique).

11• PROPORTION DE LA POPULATION AYANT DÉMÉNAGÉ

- Éléments 1 et 2 : STATISTIQUE CANADA (1993). *Mobilité et migration. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-322), p. 12-13.
- STATISTIQUE CANADA (1989). *Mobilité et migration interprovinciale. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-108), p. 2.3.
- STATISTIQUE CANADA (1983). *Mobilité*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-907), p. 1.17-1.18
- Éléments 3 et 4 : STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1991. Tableaux sommaires de base*, tableau M9102 (produit électronique).
- STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1986. Tableaux sommaires de base*, tableau MB86B01 (produit électronique).

12• PROPORTION DE LA POPULATION AYANT MOINS DE NEUF ANS DE SCOLARITÉ

- Éléments 1 et 2 : STATISTIQUE CANADA (1993). *Niveau de scolarité et fréquentation scolaire. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-328), p. 28-31.
- STATISTIQUE CANADA (1989). *Scolarité et principal domaine d'études. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-110), p. 2.7-2.8.
- STATISTIQUE CANADA (1984). *Fréquentation scolaire et niveau de scolarité*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-914), p. 3.5-3.6.
- Éléments 3 et 4 : STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1991. Tableaux sommaires de base*, tableau K9101 (produit électronique).
- STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1986. Tableaux sommaires de base*, tableau SC86B01 (produit électronique).
- STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1981. Tableaux sommaires de base*, tableau EAC81B31 (produit électronique).

13- PROPORTION DE NAISSANCES VIVANTES DE MÈRES FAIBLEMENT SCOLARISÉES

Tous les éléments : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique).

14- PROPORTION DE LA POPULATION INOCCUPÉE

Éléments 1 et 2 : STATISTIQUE CANADA (1996). *Moyennes annuelles de la population active, 1995*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 71-220), p. B-5.

STATISTIQUE CANADA (1995). *Moyennes annuelles de la population active, 1989-1994*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 71-529), p. B-10, B-15, B-20, B-25, B-30, B-35.

STATISTIQUE CANADA (1994). *Statistiques chronologiques sur la population active, 1993*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 71-201), p. 399-401.

STATISTIQUE CANADA (1993). *Activité. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-324), p. 30-33.

STATISTIQUE CANADA (1989). *Caractéristiques de la population et des logements. Activité. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-111), p. 3-11 et 3-12.

STATISTIQUE CANADA (1984). *Recensement du Canada de 1981. Population. Activité*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-915), p. 3-12 et 3-13.

Éléments 3 et 4 : STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1991. Tableaux sommaires de base*, tableau N9101 (produit électronique).

STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1986. Tableaux sommaires de base*, tableau LF86A01 (produit électronique).

15- TAUX DE CHÔMAGE

Éléments 1 et 2 : STATISTIQUE CANADA (1996). *Moyennes annuelles de la population active, 1995*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 71-220), p. B-5.

STATISTIQUE CANADA (1995). *Moyennes annuelles de la population active, 1989-1994*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 71-529), p. B-10, B-15, B-20, B-25, B-30, B-35.

STATISTIQUE CANADA (1994). *Statistiques chronologiques sur la population active, 1993*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 71-201), p. 399-401.

STATISTIQUE CANADA (1993). *Activité. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-324), p. 30-33.

STATISTIQUE CANADA (1989). *Caractéristiques de la population et des logements. Activité. Le pays*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 93-111), p. 3-11 et 3-12.

STATISTIQUE CANADA (1984). *Recensement du Canada de 1981. Population. Activité*, Ottawa, Statistique Canada (cat. 92-915), p. 3-12 et 3-13.

Éléments 3 et 4 : STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1991. Tableaux sommaires de base*, tableau N9101 (produit électronique).

STATISTIQUE CANADA. *Recensement Canada 1986. Tableaux sommaires de base*, tableau LF86A01 (produit électronique).

16- PROPORTION DE LA POPULATION VIVANT SOUS LE SEUIL DE FAIBLE REVENU

Élément 1 : CONSEIL NATIONAL DU BIEN-ÊTRE SOCIAL (1996). *Profil de la pauvreté, 1994*, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada, p. 28.

Statistique Canada (compilations spéciales des recensements de 1986 et de 1991, réalisées en 1996 pour le MSSS selon le géocodage), tableaux 0786 et 0791 (produit électronique).

Éléments 2 à 4 : Statistique Canada (compilations spéciales des recensements de 1986 et de 1991, réalisées en 1996 pour le MSSS selon le géocodage), tableaux 0786 et 0791 (produit électronique).

17• PROPORTION D'ASSISTÉS SOCIAUX

Éléments 1 et 2 : Ministère de la Sécurité du revenu, Direction de la recherche, de l'évaluation et de la statistique, Système d'informations mensuelles sur les prestataires d'aide sociale, bilans pour l'ensemble du Québec, tableaux pour 1991 et 1993 à 1996.

MINISTÈRE DE LA MAIN-D'ŒUVRE, DE LA SÉCURITÉ DU REVENU ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (1993). *De l'aide sociale à la sécurité du revenu. Rapport statistique 1991-1992*, Québec, Direction de l'évaluation et de la statistique, p. 13.

MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

Éléments 3 et 4 : Ministère de la Sécurité du revenu, Direction de la recherche, de l'évaluation et de la statistique, Système d'informations mensuelles sur les prestataires d'aide sociale, bilans par région et municipalité, tableaux pour 1991 à 1996.

MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

18• PROPORTION DE FUMEURS RÉGULIERS

Élément 1 : STATISTIQUE CANADA (1995). *Enquête nationale sur la santé de la population 1994-1995, Fichiers microdonnées à grande diffusion*, Ottawa, cat. 82F0001XDB, variable Smok-Q2 (produit électronique).

Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987 (compilations spéciales réalisées par Santé Québec en 1995, variable Tabac).

STATISTIQUE CANADA (1994). *L'état de santé des Canadiens, Rapport de l'enquête sociale générale de 1991, série analytique*, Ottawa (cat. 11-612F, n° 8), p. 154.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA (1988). *L'usage du tabac au Canada en 1986*, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada (cat. H39-66/1988F), p. 29.

CLARKSON, M. (1987). *Enquête canadienne sur la promotion de la santé 1985, Description des données québécoises*, Québec, MSSS, p. 52.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA (1985). *L'usage du tabac au Canada en 1983*, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada (cat. H39-66/1985F), p. 25.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA (1983). *L'usage du tabac chez les Canadiens en 1981*, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada (cat. H39-66/1983F), p. 29.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA (1980). *Usage du tabac au Canada 1965-1979, Rapports techniques, n° 9*, Ottawa, Ministre des Approvisionnements et Services Canada, p. 25.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA (1981). *La santé des Canadiens, Rapport de l'enquête Santé Canada de 1978-1979*, Ottawa, Santé et Bien-être social Canada, p. 52.

Éléments 2 à 4 : Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987, l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik 1992, l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James 1991 (compilations spéciales réalisées par Santé Québec en 1995, variable Tabac).

19• PROPORTION DE LA POPULATION PRENANT 14 CONSOMMATIONS D'ALCOOL ET PLUS PAR SEMAINE

Élément 1 : STATISTIQUE CANADA (1995). *Enquête nationale sur la santé de la population 1994-1995, Fichiers microdonnées à grande diffusion*, Ottawa, cat. 82F0001XDB, variable construite à partir de ALCO-Q5A (produit électronique).

Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987 (compilations spéciales réalisées par Santé Québec en 1996, variable Alcool92 appliquée à l'ensemble de la population au lieu des buveurs habituels).

STATISTIQUE CANADA (1994). *L'état de santé des Canadiens, Rapport de l'Enquête sociale générale de 1991, série analytique*, Ottawa (cat. 11-612F, n° 8), p. 140.

STATISTIQUE CANADA (1987). *Santé et aide du milieu, Rapport de l'Enquête sociale générale de 1985, série analytique*, Ottawa (cat. 11-612F, n° 1), p. 50.

Éléments 2 à 4 : Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987 (compilations spéciales réalisées par Santé Québec en 1996, variable Alcool92 appliquée à l'ensemble de la population au lieu des buveurs habituels).

20- PROPORTION DE LA POPULATION N'AYANT JAMAIS CONSOMMÉ DE DROGUES ILLICITES

Tous les éléments : Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993 (compilations spéciales réalisées par Santé Québec en 1995, variable Regdrog).

21- PROPORTION DE LA POPULATION PRÉSENTANT UN EXCÈS DE POIDS

Tous les éléments : Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987, l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James 1991 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variable Quecat92).

22- PROPORTION DES OCCUPANTS DE VÉHICULES AUTOMOBILES UTILISANT UN DISPOSITIF DE RETENUE

Éléments 1 et 2 : SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1995). *Évolution du taux d'utilisation des dispositifs de retenue dans les véhicules routiers au Québec, 1995*, Québec, SAAQ, Direction de la planification, p. 45-47 et 54.

Éléments 3 et 4 : SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1995). *Évolution du taux d'utilisation des dispositifs de retenue dans les véhicules routiers au Québec, 1995*, Québec, SAAQ, Direction de la planification, p. 52.

SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1990). *Évolution du taux d'utilisation des dispositifs de retenue dans les véhicules routiers au Québec, 1990*, Québec, SAAQ, Direction de la planification, p. 60.

Société de l'assurance automobile du Québec (compilations spéciales pour les intervalles de confiance des proportions pour l'ensemble du Québec en 1990 et 1995).

23- PROPORTION DE NAISSANCES DE FAIBLE POIDS

Tous les éléments : MSSS, Fichier des naissances (produit électronique).

24- TAUX DE GROSSESSES À L'ADOLESCENCE

Tous les éléments : MSSS, Direction générale de la planification et de l'évaluation (compilations spéciales de Madeleine Rochon).

MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

25- PROPORTION DE FEMMES AYANT SUBI UN TEST DE PAP

Tous les éléments : Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987, l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik 1992, l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James 1991 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variable Pap).

26- PROPORTION DE FEMMES AYANT SUBI UNE MAMMOGRAPHIE

Élément 1 : STATISTIQUE CANADA (1995). *Enquête nationale sur la santé de la population 1994-1995, Fichiers microdonnées à grande diffusion*, Ottawa, cat. 82F0001XDB, variable PHP-Q2A (produit électronique).

Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variable Mammo).

O'CONNOR, A. (1993). « La prévention des cancers gynécologiques », dans Santé et Bien-être social Canada, *Enquête promotion de la santé Canada 1990, rapport technique*, Ottawa, SBESC, p. 190.

Éléments 2 à 4 : Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variable Mammo).

27• PROPORTION DE LA POPULATION PRÉSENTANT UN NIVEAU ÉLEVÉ DE DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

Tous les éléments : Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987, l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James 1991 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variable Idpesq14).

28• PROPORTION DE LA POPULATION PRÉSENTANT DES IDÉES SUICIDAIRES SÉRIEUSES

Tous les éléments : Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987, l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik 1992, l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James 1991 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variable Ideat12).

29• PROPORTION DE LA POPULATION INSATISFAITE DE SA VIE SOCIALE

Tous les éléments : Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987, l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik 1992, l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James 1991 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variable Satif).

30• TAUX DE CRIMES CONTRE LA PERSONNE

Tous les éléments : Ministère de la Sécurité publique, Service des systèmes d'information (compilations spéciales).
MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

31• NOMBRE DE LITS ET DE PLACES SELON LES CATÉGORIES D'ÉTABLISSEMENT

Tous les éléments : MSSS, Fichier des établissements de santé et de services sociaux du Québec (compilations spéciales réalisées en août 1995 par le Service de l'analyse statistique).
MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

32• NOMBRE D'HABITANTS PAR PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ SELON LE TYPE

Tous les éléments : RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1995). *Statistiques annuelles 1994 (idem pour les années 1984 à 1993)*, Québec, RAMQ.
MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

33• DÉPENSES PER CAPITA CONSACRÉES AU DOMAINE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Tous les éléments : MSSS, Système d'information financière et opérationnelle (compilations spéciales réalisées en mars 1996 par le Service de l'analyse statistique).
MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

34• DURÉE MOYENNE D'HOSPITALISATION SELON LE DIAGNOSTIC

Tous les éléments : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique).

35• TAUX D'INCIDENCE DES MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE (MADO) ÉVITABLES PAR LA VACCINATION

Tous les éléments : MSSS (1996). *Surveillance des maladies infectieuses : maladies évitables par la vaccination, maladies d'origine hydrique ou alimentaire, tuberculose, et autres maladies, 1994*, Québec, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, Direction générale de la santé publique, annexe p. 140, 160, 198 et 199 (données du fichier central MADO du Laboratoire de santé publique du Québec, novembre 1995).
MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

36• PROPORTION DE LA POPULATION NE SE PERCEVANT PAS EN BONNE SANTÉ

- Élément 1 : STATISTIQUE CANADA (1995). *Enquête nationale sur la santé de la population 1994-1995, Fichiers microdonnées à grande diffusion*, Ottawa, cat. 82F0001XDB, variable GENHLT-Q1 (produit électronique).
- Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variable Regperc).
- Éléments 2 à 4 : Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec de 1987, l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik 1992, l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James 1991 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variable Regperc).

37• PROPORTION DE LA POPULATION AYANT AU MOINS UN PROBLÈME DE SANTÉ

- Élément 1 : Santé Québec, l'Enquête Santé Québec de 1987 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variable Nomsan).
- Statistique Canada, Division de la santé (compilations spéciales de l'Enquête Santé Canada 1978-1979).
- Éléments 2 à 4 : Santé Québec, l'Enquête Santé Québec de 1987, l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik 1992, l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James 1991 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variable Nomsan).

38• PRÉVALENCE DES PRINCIPAUX PROBLÈMES DE SANTÉ

- Tous les éléments : Santé Québec, l'Enquête Santé Québec 1987, l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik 1992, l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James 1991 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variables Cima 1, 5, 8, 9, 14, 15, 20, 21, 22, 24).

39• TAUX DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES DÉCLARÉES ET INDEMNISÉES

- Éléments 1 et 2 : COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (1996). *Statistiques sur les lésions professionnelles 1992 (idem pour 1986 à 1991)*, Québec, CSST.
- Commission de la santé et de la sécurité du travail. Fichier des lésions professionnelles (produit électronique).
- STATISTIQUE CANADA. *Recensement 1986. Données géocodées*, tableau P2B (produit électronique).
- STATISTIQUE CANADA. *Recensement 1991. Données géocodées*, tableau PB (produit électronique).
- Éléments 3 et 4 : Commission de la santé et de la sécurité du travail. Fichier des lésions professionnelles (produit électronique).
- STATISTIQUE CANADA. *Recensement 1991. Données géocodées*, tableau PB (produit électronique).

40• TAUX D'INTOXICATION

- Tous les éléments : Centre Anti-Poison du Québec (compilations spéciales).
- MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

41• TAUX D'INCIDENCE DES MALADIES INFECTIEUSES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

- Tous les éléments : MSSS (1996). *Surveillance des maladies infectieuses : maladies évitables par la vaccination, maladies d'origine hydrique ou alimentaire, tuberculose, et autres maladies, 1994*, Québec, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, Direction générale de la santé publique, annexe p. 140, 160, 198 et 199 (données du fichier central MAD0 du Laboratoire de santé publique du Québec, novembre 1995).
- MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

42• TAUX D'HOSPITALISATION SELON LE DIAGNOSTIC

Tous les éléments : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique).
MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

43• TAUX D'INCIDENCE DU CANCER

Tous les éléments : MSSS, Fichier des tumeurs du Québec (produit électronique, version mai 1996).
MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

44• ESPÉRANCE DE VIE

Tous les éléments : MSSS, Fichier des décès, fichier des naissances (produits électroniques).
MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

45• TAUX DE MORTALITÉ INFANTILE

Tous les éléments : MSSS, Fichier des naissances, fichier des décès (produits électroniques).

46• TAUX DE MORTALITÉ PÉRINATALE

Tous les éléments : MSSS, Fichier des naissances, fichier des décès, fichier des mortinaissances (produits électroniques).

47• TAUX DE MORTALITÉ SELON LA CAUSE

Tous les éléments : MSSS, Fichier des décès (produit électronique).
MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

48• TAUX DE MORTALITÉ PAR SUICIDE

Tous les éléments : MSSS, Fichier des décès (produit électronique).
MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

49• ESPÉRANCE DE VIE EN BONNE SANTÉ

Élément 1 : WILKINS, R. (1995). « Autonomie fonctionnelle et espérance de vie en santé », dans Santé Québec, *Et la santé, ça va en 1992-1993 ? Rapport de l'enquête sociale et de santé 1992-1993*, vol. 1, Montréal, p. 298.

WILKINS, R. (1991). « Espérance de vie en santé au Québec et au Canada en 1986 », *Cahiers québécois de démographie*, vol. 20, n° 2, p. 373.

WILKINS, R., ADAMS, O. (1983). *Healthfulness of Life*, Montréal, The Institute for Research on Public Policy, p. 122-135.

Élément 2 : WILKINS, R. (1995). « Autonomie fonctionnelle et espérance de vie en santé », dans Santé Québec, *Et la santé, ça va en 1992-1993 ? Rapport de l'enquête sociale et de santé 1992-1993*, vol. 1, Montréal, p. 298.

Éléments 3 et 4 : MSSS, Fichier des décès (produit électronique).
Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec de 1987, l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik 1992 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variables Autonf2 et Jitotpp).
MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

50• TAUX DES ANNÉES POTENTIELLES DE VIES PERDUES

Tous les éléments : MSSS, Fichier des décès (produit électronique).
 MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

51• TAUX DE VICTIMES D'ACCIDENTS DE VÉHICULES ROUTIERS

Éléments 1 et 2 : SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1995). *Bilan 1994. Accidents, parc automobile, permis de conduire (idem pour 1993)*, Québec, SAAQ.

MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

Éléments 3 et 4 : SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (1995). *Bilan 1994. Accidents, parc automobile, permis de conduire (idem pour 1993)*, Québec, SAAQ.

52• DURÉE MOYENNE D'INDEMNISATION PAR LÉSION PROFESSIONNELLE

Élément 1 : COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (1996). *Statistiques sur les lésions professionnelles 1992 (idem pour 1986 à 1991)*, Québec, CSST.

Commission de la santé et de la sécurité du travail, Fichier des lésions professionnelles (produit électronique).

Éléments 2 à 4 : Commission de la santé et de la sécurité du travail, Fichier des lésions professionnelles (produit électronique).

53• PROPORTION DE LA POPULATION AYANT UNE INCAPACITÉ À LONG TERME

Tous les éléments : Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987, l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik 1992, l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James 1991 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variable Actlim).

54• PROPORTION D'ENFANTS HANDICAPÉS

Éléments 1 et 2 : RÉGIE DES RENTES DU QUÉBEC (1996). *Les allocations d'aide aux familles. Statistiques 1995 (idem pour les années 1988 à 1995)*, Québec, RRRQ.

MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

Éléments 3 et 4 : Régie des rentes du Québec, Fichier de l'allocation pour enfants handicapés (produit électronique).

MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

55• TAUX DE CONSULTATIONS MÉDICALES

Tous les éléments : RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1995). *Statistiques annuelles 1994 (idem pour les années 1984 à 1993)*, Québec, RAMQ.

56• TAUX DES JOURNÉES D'HOSPITALISATION SELON LE DIAGNOSTIC

Tous les éléments : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique).

MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

57• TAUX DE CÉSARIENNE

Tous les éléments : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique).

58• TAUX DE PONTAGES CORONARIENS

Tous les éléments : MSSS, Fichier des hospitalisations MED-ÉCHO (produit électronique).

MSSS, Service de l'analyse statistique (population estimée par le Bureau de la statistique du Québec, version mai 1995, produit électronique).

59• PROPORTION DE LA POPULATION AYANT CONSOMMÉ TROIS CLASSES DE MÉDICAMENTS OU PLUS

Tous les éléments : Santé Québec, l'Enquête sociale et de santé 1992-1993, l'Enquête Santé Québec 1987, l'Enquête Santé Québec auprès des Inuits du Nunavik 1992, l'Enquête Santé Québec auprès des Cris de la Baie James 1991 (compilations spéciales réalisées en 1995 par Santé Québec, variable Class).

60• NOMBRE D'ORDONNANCES PAR PERSONNE DE 65 ANS ET PLUS

Tous les éléments : RÉGIE DE L'ASSURANCE-MALADIE DU QUÉBEC (1995). *Statistiques annuelles 1994* (*idem* pour les années 1984 à 1993), Québec, RAMQ.

COLLECTION ANALYSES ET SURVEILLANCE

DERNIERS TITRES PARUS

- (DGSP * #1) **Surveillance du cancer au Québec : Nouveaux cas déclarés au fichier des tumeurs et mortalité, Année 1993**
(M. Beaupré, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, 1996)
- (DGSP #2) **Surveillance de la mortalité au Québec : Année 1994**
(G. Bibeau et O. Laplante, Direction de l'analyse et de la surveillance de la santé et du bien-être, 1997)
- (DGSP #3) **L'accessibilité au condom en milieu scolaire québécois - Enquête auprès des CLSC et des Directions d'écoles secondaires**
(R. Cloutier, Centre de coordination sur le sida, 1997)

Autres publications du
Ministère de la Santé et des Services sociaux
**en vente dans le réseau des
Publications du Québec et dans les librairies**

Derrières les apparences, santé et conditions de vie des femmes
Drug Insurance – Possible Approaches
Gestion et suivi de la dialyse rénale
Guide de gestion du bloc opératoire
Health and Well-being : the Québec Perspective
L'adoption : un projet de vie
L'assurance médicaments : des voies de solution
L'hôpital de jour
L'usage de drogues et l'épidémie du VIH
L'utilisation rationnelle des médicaments chez les personnes âgées – Stratégies d'action
La chirurgie d'un jour et son organisation
La dialyse et son organisation
La politique de la santé et du bien-être
Le jeune enfant et ses parents...
Le Québec comparé : indicateurs sanitaires, démographiques et socio-économiques
Les agressions sexuelles : STOP
Les indicateurs de la politique québécoise de la santé et du bien-être – Exercice de suivi 1995
Maintenant et pour l'avenir... La jeunesse (Guide de soutien)
Naître égaux, grandir en santé
Nouvelles orientations des politiques sociales pour une société en mutation
Orientations ministérielles en matière de planification des naissances
Plan d'action ministériel pour le secteur des jeunes contrevenants
Pour une meilleure compréhension des besoins des personnes atteintes de cancer
Prévenir, dépister et contrer la violence conjugale
Problèmes de vie et distribution géographique des personnes dialysées
Santé et bien-être : la perspective québécoise
The Policy on Health and Well-being
The Rational Use of Drugs by the Elderly – A Strategy for Action
Un continuum intégré de services en déficience physique
Un Québec fou de ses enfants
La dialyse et son organisation (Dialyse 1)
Gestion et suivi de la dialyse rénale (Dialyse 3)
Politique d'intervention en matière de violence conjugale (prévenir, dépister, contrer)
Problème de vie et distribution géographique des personnes dialysées (Dialyse 2)
Protection des renseignements nominatifs-Guide à l'intention des directons de santé publique des RRSSS
The Québec Blood Supply System
Services requis pour personnes âgées en perte d'autonomie
Le système du sang au Québec

Vente et information : Internet: <http://doc.gouv.qc.ca>
Chez votre libraire habituel Télécopieur: (418) 643-6177
 1 800 561-3479
Commande postale: Les Publications du Québec
 C.P. 1005
 Québec (Québec)
 G1K 7B5
Téléphone : (418) 643-5150
1 800 463-2100



Vous désirez connaître le niveau socioéconomique, l'espérance de vie, les taux de natalité et de mortalité ou toute autre information relative à la santé et au bien-être de la population pour le Québec ou votre région? Consultez sans attendre le document intitulé **INDICATEURS SOCIO SANITAIRES : Le Québec et ses régions**.

INDICATEURS SOCIO SANITAIRES : Le Québec et ses régions s'adresse à toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la santé publique, quelles que soient ses connaissances sur le sujet et le type d'utilisation qu'elle entend faire de ces données. Le document a été conçu de façon à fournir des informations à la fois théoriques et pratiques sur un large éventail d'indicateurs à l'échelle du Québec et de ses régions.

Les indicateurs sont présentés selon trois grands axes : les *Déterminants*, l'*État de santé* et les *Conséquences des problèmes de santé*.

Les *Déterminants* présentent des informations relatives à l'environnement physique et social, des indicateurs sur les comportements, habitudes de vie et facteurs de risque, ainsi que sur l'organisation des soins.

L'*État de santé* traite de l'état de santé subjectif, de la morbidité extra-hospitalière, de la morbidité hospitalière ainsi que de la mortalité.

Les *Conséquences des problèmes de santé* décrivent des indicateurs d'incapacité, d'utilisation des services et de consommation de médicaments.

La particularité de ce document est de réunir des données provenant de plus de 25 sources différentes et de présenter des résultats pour l'ensemble du Québec et pour chacune de ses 18 régions sociosanitaires. **INDICATEURS SOCIO SANITAIRES : Le Québec et ses régions** constitue un ouvrage de référence et une mine de renseignements indispensables à tous ceux et celles qui se préoccupent de la santé publique.

