



.....

Analgésie ambulatoire par bloc périnerveux à l'aide d'un biberon (pompe à perfusion élastomérique)

Informations aux patients

En accord avec votre médecin et vous, l'anesthésiologiste a installé un cathéter (petit tube) permettant la perfusion d'un médicament de type anesthésique, le Naropin. Le cathéter est inséré dans une zone nerveuse (bras, jambe, épaule, etc.) à l'aide de l'échographie. Le médicament a pour effet de bloquer les signaux de douleur après la chirurgie ce qui favorisera votre repos, votre guérison et diminuera la prise de médication de type opioïde (morphine ou autre).



© Baxter, 2012

.....

Qu'est-ce le « biberon » ou pompe à perfusion élastométrique ?


Le « biberon » est un dispositif simple et sécuritaire permettant de vous administrer l'anesthésiant (le Naropin) à un débit prescrit par votre anesthésiologiste.

Au besoin, vous pourrez également vous donner des doses supplémentaires à l'aide de la manette intégrée. Le flacon du biberon contient un ballon, contenant la médication, qui s'écoule tranquillement au fil des heures. Il fonctionne par gravité et par mécanisme de contre-pression.

12 heures



24 heures



36 heures



© Baxter, 2012



La mise en place du biberon

Après la chirurgie, une infirmière de la salle de réveil connectera le biberon au cathéter préalablement installé par l'anesthésiologiste.

L'infirmière effectuera quelques surveillances afin de s'assurer vous êtes soulagé.

Puis, l'infirmière vous remettra la manette et vous expliquera son fonctionnement.

Avant votre départ de l'hôpital, une infirmière du SAPO (service d'analgésie postopératoire) vous rencontrera ainsi que les membres de votre famille afin de vous expliquer les mesures et les consignes pour le retour à domicile.

Consignes pour le retour à la maison

Gestion des médicaments par la bouche



- Prendre l'acétaminophène 1000 mg 4 fois par jour (2 comprimés de 500 mg ou « extra-fort ») selon les recommandations de votre médecin.
- Prendre l'anti-inflammatoire prescrit, s'il y a lieu, à la fréquence recommandée.

Sommeil



- Placer le biberon à la même hauteur que le connecteur afin de favoriser l'écoulement.

Activités physiques et conduite automobile



- Vous pouvez vaquer à vos occupations selon votre tolérance.
- Si vous avez un bloc des membres inférieurs (par exemple pour le genou), prenez garde à votre capacité de vous appuyer ou marcher. Le bloc diminue la force musculaire. Utilisez les béquilles ou la marchette.

Environnement



- Le biberon est sensible aux changements de température. Assurez-vous de l'avoir près de vous (par exemple : dans la poche de votre chemise).
- Protéger le système des rayons du soleil.

Bain / douche



- Le biberon ne doit pas être exposé à un jet d'eau direct. Vous devez recouvrir le biberon et le site à l'aide de sac plastique ou le mettre à l'extérieur de la baignoire ou de la douche.

- Si l'analgésie est insuffisante malgré les bolus (dose supplémentaire par le biberon), prendre l'analgésique opioïde prescrit par votre médecin - par exemple : Statex (morphine) Dilaudid (hydromorphone) ou Supeudol (oxycodone) - selon la posologie recommandée.

- Assurez-vous de supporter votre membre (bras, jambe) afin de réduire les risques reliés à une mauvaise position car vous ne ressentirez pas l'inconfort.

- Tant que le biberon est fonctionnel ou que vous ressentez les effets du bloc suite à son retrait, la conduite automobile est interdite.

- Ne pas utiliser de couverture chauffante, de bouillotte ou de « sac magique » durant la thérapie. Les risques de brûlures sont augmentés en raison de la diminution de sensation de la zone sous perfusion.

Une infirmière du service d'analgésie postopératoire (SAPO) ou l'un des médecins membres de l'équipe d'anesthésiologistes vous contactera à la maison tous les jours pour faire un suivi téléphonique de l'évolution de votre état.



Comment enlève-t-on le biberon ?

Au bout d'environ 48 heures le biberon sera vidé de toute la médication. Il sera alors temps de le retirer. Voici quelques étapes faciles pour le retirer :

1. Lavez vos mains.
2. Retirez les pansements qui retiennent le cathéter et le biberon sur votre peau. Il se peut que le pansement adhère très bien à la peau.
3. Ensuite, retirez délicatement le tube inséré dans votre peau. Il se peut que le cathéter soit long tout dépendamment de la zone d'insertion et de votre physique.
4. Une fois le retrait effectué, il se peut qu'il y ait un léger écoulement. Il s'agit du surplus de médication qui est sous la peau. Appliquez un petit pansement de type *Band-Aid*.
5. Jetez le biberon et le cathéter dans les ordures ménagères.
6. Et voilà, le tour est joué : il ne vous reste plus qu'à enlever le *Band-Aid* dans 24 heures.

.....

Quand dois-je appeler l'infirmière du SAPO ou l'anesthésiologiste ?

1. Si la douleur n'est pas soulagée par le biberon ni par les analgésiques oraux prescrits par votre médecin.
2. Des signes d'infection apparaissent au niveau du site d'insertion du cathéter (rougeur, sensibilité, induration/ présence de pus, fièvre de 38 degrés Celcius et plus (température buccale).
3. Si les effets secondaires suivants se présentent : engourdissement des lèvres, goût métallique dans la bouche, bourdonnement d'oreille, troubles visuels, somnolence, désorientation. Si cela se produit, clamez le biberon avec la clampe bleue et appelez l'anesthésiologiste de garde (voir page 8).
4. Difficulté à respirer : contactez les services d'urgence.

.....

Pour nous joindre

Pour les patients de l'Hôpital Maisonneuve Rosemont (HMR):

Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h

☎ Infirmière du SAPO : 438 349-4655

Vous pouvez lui laisser un message en tout temps en indiquant vos coordonnées et le but de votre appel. L'infirmière vous rappellera dans les meilleurs délais.

À tout autre moment (soir, nuit et week-end):

Renseignement des médecins au 514 252-3400, poste 4558, et demandez l'anesthésiologiste de garde.

Avisez la téléphoniste que vous avez un cathéter de bloc périmerveux et que vous devez parler au médecin.

Pour les patients de l'Hôpital Santa Cabrini Ospedale (HSCO):

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30 :

☎ Infirmière du SAPO : 514 252-6434

À tout autre moment (soir, nuit et week-end):

Composez le numéro 514 252-6000, poste 6444, et demandez l'anesthésiologiste de garde.

Avisez la téléphoniste que vous avez un cathéter de bloc périmerveux et que vous devez parler à l'anesthésiologiste.

.....

L'équipe du service d'analgésie postopératoire vous souhaite le meilleur rétablissement possible. Nous espérons que la mise en place d'un biberon facilitera votre récupération.

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question ou commentaire.

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

.....

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

5415, boul. de l'Assomption
Montréal (Québec) H1T 2M4

☎ 514 252-3400

Hôpital Santa-Cabrini

5655, rue St-Zotique Est
Montréal (Québec) H1T 1P7

☎ 514 252-6000

🌐 <https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca>

D'autres publications et ressources d'intérêt sur la santé
sont disponibles sur le site Internet du Centre d'information
pour l'utilisateur et ses proches (CIUP).

🌐 <https://biblio-hmr.ca/in/fr/ciup>

Tous droits réservés

© CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 2020

CP-CHR-107

.....

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal**

Québec 