Chirurgie de Mohs

Informations sur votre intervention

Québec

La chirurgie de Mohs

Il s'agit d'une intervention chirurgicale lors de laquelle on retire une tumeur par petites couches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cellules cancéreuses. Son objectif est d'enlever le cancer tout en laissant la plus grande quantité de tissu sain possible.

Pourquoi pratiquer une chirurgie de Mohs ?

On peut avoir recours à la chirurgie de Mohs pour traiter différents types de cancer de la peau. Cette chirurgie est utilisée pour traiter des tumeurs qui :

- Se trouvent dans des régions où il est important d'enlever le moins de tissu possible (comme les paupières, les oreilles, le nez, les lèvres, la peau à la naissance des cheveux, les organes génitaux, les doigts ou les orteils) ;
- Sont de grande taille (afin de laisser une plus petite cicatrice) ;
- Sont réapparues ou présentent un risque élevé de récidive ;
- Se trouvent dans des régions ayant déjà été traitées par radiothérapie ou comportant une cicatrice ;
- Croissent rapidement.

Comment se déroule une chirurgie de Mohs ?

On administre un anesthésique local pour geler la région qui sera opérée. Le chirurgien utilise un scalpel pour retirer la partie visible de la tumeur ainsi qu'une mince couche de tissu sous-jacent. Un pansement temporaire est ensuite placé sur la coupure (incision).

L'échantillon de tissu est envoyé au laboratoire où il est examiné au microscope pour déterminer s'il renferme des cellules cancéreuses.

Si c'est le cas, une autre mince couche de tissu est enlevée et examinée. Le prélèvement et l'évaluation de chaque couche prend environ 2 heures : la chirurgie dure de 10 à 15 minutes et l'examen du tissu au microscope dure environ 1 heure à 1 heure et demie.

On répète ces étapes jusqu'à ce que le tissu prélevé ne contienne plus de cellules cancéreuses et qu'il soit entouré d'une marge de tissu sain.

Lorsque tout le cancer est enlevé, on répare la plaie, ce qui peut être fait en :

- Laissant la plaie guérir d'elle-même ;
- Refermant la plaie à l'aide de points de suture ;
- Recouvrant la plaie avec de la peau provenant d'une greffe ou d'un lambeau cutané ;
- Consultant un chirurgien plasticien qui réparera la région opérée (si la chirurgie était importante).

Les suites de l'opération

Il est possible que des effets secondaires surviennent après l'intervention, mais chaque personne les ressent différemment. Les effets secondaires peuvent se manifester n'importe quand pendant, tout de suite après ou quelques jours voire quelques semaines après la chirurgie de Mohs. Ceux-ci peuvent comprendre :

- Douleur, sensibilité ou sensation de brûlure ;
- Enflure ;
- Saignements et ecchymoses ;
- Infection ;
- Cicatrices ;
- Lésions nerveuses pouvant provoquer un engourdissement.

Avisez les membres de votre équipe de soins si vous éprouvez ces effets secondaires ou d'autres problèmes que vous croyez liés à la chirurgie. Plus vite vous les informez de ces problèmes, plus rapidement ils pourront vous proposer des moyens de les prendre en charge.

Préparez-vous à une longue journée de 6-7 heures. 80 % de ce temps est passé à attendre. Vous pouvez prévoir des activités pour occuper ce temps (ex. : lecture, ordinateur portable, mots croisés, etc.)

Avant l'intervention

- Prenez vos médicaments habituels le jour de la chirurgie et apportez avec vous vos médicaments pour la journée. N'oubliez pas d'apporter vos médicaments à prendre au besoin comme votre vaporisateur de nitroglycérine ou les pompes à asthme.
- Si vous prenez des medicaments anticoagulants (Plavix, Coumadin, Asaphen, Eliquis, Xarelto) communiquez avec le médecin prescripteur afin de lui demander si vous pouvez cesser la prise des médicaments quelques jours avant votre chirurgie.
- Evitez les médicaments anti-inflammatoires (Advil®, Motrin®, Aleve®, Anaprox®, etc.) deux semaines avant l'intervention.
- Utilisez l'acétaminophène (Tylénol®) si vous avez des maux de têtes ou autres douleurs.
- Il n'est pas nécessaire d'être à jeun avant la chirurgie.
- Lavez-vous les cheveux la veille ou le matin de la chirurgie.
- Portez des vêtements confortables que vous n'aurez pas à enfiler par-dessus votre tête après la chirurgie.
- Évitez de vous maquiller et laissez vos bijoux à la maison.

Où se présenter le jour de votre chirurgie de Mohs ?

Présentez-vous au poste d'accueil du Pavillon Maisonneuve, 3e étage, aile C.

Apportez :

- Votre carte bleue de l'hôpital, si vous en avez une ;
- Votre carte d'assurance maladie ;
- Vos médicaments ;
- Votre liste de médicaments.

Date de la chirurgie :

Si vous désirez annuler la chirurgie, appelez le plus tôt possible entre 9 h et 16 h, au 514 252-3400, poste 7271.

Vous avez des questions concernant vos droits et intérêts ?

Les membres du Comité des usagers de l'HMR peuvent vous renseigner sur vos droits et intérêts.

Vous pouvez les joindre au 514 252-3925 ou au cusagers.hmr@ssss.gouv.qc.ca

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Hôpital Maisonneuve-Rosemont
5415, boul. de l'Assomption
Montréal (Québec) H1T 2M4

514 252-3400
ciusss-estmtl.gouv.qc.ca

D'autres publications et ressources d'intérêt sur la santé sont disponibles sur le site Internet du Centre d'information pour l'usager et ses proches (CIUP).

https://biblio-hmr.ca/in/fr/ciup

Tous droits réservés
© CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, HMR, 2019

CP-MED-119

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Québec