



.....

La dacryocystorhinostomie

Questions et réponses en vue d'une chirurgie

Cette brochure contient des informations générales sur la chirurgie que vous devrez subir.

Votre chirurgien pourra vous donner des informations plus précises. N'hésitez pas à lui poser vos questions.

.....

Qu'est-ce que la dacryosténose ?

- C'est une obstruction du sac lacrymal (réservoir des larmes) causant un larmoiement.
- Les causes proviennent soit d'une infection, d'un calcul (masse dure anormale) ou d'un rétrécissement des conduits.



.....

Qu'est-ce que la dacryocystorhinostomie ?

C'est l'intervention qui consiste à rétablir la circulation des larmes et à drainer le sac lacrymal (réservoir des larmes).

.....

Recommandations à suivre après la chirurgie

- Élevez la tête de lit avec deux oreillers.
- Appliquez des compresses glacées 10 à 15 minutes aux deux heures pendant deux jours.
- Puis, pendant trois autres jours, appliquez des compresses chaudes 10 à 15 minutes aux deux heures.

Pour faire une compresse glacée, utilisez une débarbouillette et un bol propre dans lequel vous mettrez de l'eau glacée.

- Appliquez du côté opéré les gouttes, l'onguent ophtalmique et le vaporisateur nasal tels que prescrits.
- Évitez le maquillage pendant une à deux semaines.
- Évitez de frotter le coin interne de l'oeil, de frotter la narine et de se moucher pendant un mois pour ne pas que le tube tombe.
- Si vous apercevez un fil dans le coin de l'œil opéré, ne le coupez pas mais fixez-le avec un diachylon puis appelez à la clinique d'ophtalmologie.

Le numéro de téléphone se trouve à la fin de la brochure.

Un écoulement de larmes peut persister après l'intervention jusqu'au retrait du fil par le médecin dans environ deux à trois mois.

.....

Quels sont les signes de complications à signaler ?



- Si un saignement de nez actif ou abondant apparaît ;
- S'il y a une augmentation de la douleur non soulagée par le Tylenol^{MD} ;
- S'il y a un changement dans l'aspect et la coloration de l'écoulement ;
- Si vous présentez une température buccale supérieure à 38 °C (100,4 °F) ;
- Ou toute autre inquiétude.

Si vous présentez l'un de ces signes, appelez l'infirmière. Votre œil doit être examiné le plus tôt possible par un ophtalmologiste.

.....

Pour nous joindre

Si vous présentez des signes de complications, appelez :

Clinique d'urgence d'ophtalmologie	De 8 h à 15 h30 lundi au vendredi	 514 252-3878 option 1
Info-Santé	24 h/24	 811

[illegible]

En quittant l'hôpital, vous aurez des rendez-vous à la clinique d'ophtalmologie, lesquels seront de plus en plus espacés selon l'évolution postopératoire.

Il sera important d'apporter les contenants de gouttes à chacune de vos visites à la clinique externe afin de bien comprendre les nouvelles indications qui vous seront données.

● ● ● ● ● ●

[illegible]

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

.....

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

5415, boul. de l'Assomption
Montréal (Québec) H1T 2M4

☎ 514 252-3400

🌐 ciusss-estmtl.gouv.qc.ca

D'autres publications et ressources d'intérêt sur la santé
sont disponibles sur le site Internet du Centre d'information
pour l'usager et ses proches (CIUP).

🌐 <https://biblio-hmr.ca/in/fr/ciup>

✉ ciup.cemtl@ssss.gouv.qc.ca

Tous droits réservés

© CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, 2024

CP-OPH-008

.....

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal**

Québec 